



Resúmenes para el área de
MEDIO AMBIENTE

Evaluación de la huella hídrica en sistemas de producción ganadera bovina

Emma Sofía Corredor Camargo¹, Edwin Manuel Páez Barón², Jorge Armando Fonseca Carreño³

¹Docente ocasional, Escuela de Ciencias Agrícolas Pecuarias y del Medio Ambiente, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, CEAD Tunja, emma.corredor@unad.edu.co. ²Docente asociado, Escuela de Ciencias Agrícolas Pecuarias y del Medio Ambiente, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, CEAD Tunja, edwin.paez@unad.edu.co. ³Docente asociado, Escuela de Ciencias Agrícolas Pecuarias y del Medio Ambiente, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, CEAD Tunja, jorge.fonseca@unad.edu.co

Resumen

La huella hídrica (HH) es un importante indicador que permite caracterizar el volumen o cantidad de agua utilizada en la obtención de un producto. Es un indicador útil para la toma de decisiones y acciones tendientes a disminuir el impacto negativo de las actividades productivas sobre el recurso hídrico. El objetivo de este proyecto es estimar la huella hídrica de la producción de leche, abarcando la trazabilidad del recurso en la fuente primaria de producción al cuantificar el agua consumida, azul y verde y el agua contaminada o gris, en predios bovinos tradicionales y silvopastoriles e identificar la relación entre la HH estimada y los procesos productivos, enfatizando en el relacionado con el componente arbóreo. Se realizará un análisis descriptivo y cuantitativo, como población objeto de estudio se considerarán unidades productivas cuyo principal ingreso económico es la producción de leche, ubicadas en los municipios de Tunja y Duitama, utilizando un muestreo no probabilístico discrecional, se estudiarán dos unidades productivas con manejo tradicional en monocultivo y dos unidades productivas en sistema silvopastoril. Se caracterizarán las unidades, realizando una agrupación según tamaño, área destinada a pastoreo, prácticas de manejo de potreros, área destinada al componente arbóreo, producción diaria de leche, número de vacas total, número de hembras en producción y demás componentes empleados en el desarrollo de sus actividades. A partir de la información obtenida se empleará el enfoque de la Water Footprint Network (2011) para la estimación de la

HH directa, utilizando para la estimación de la huella hídrica verde el programa CROPWAT (programa para el cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos y las necesidades de riego en base la información del suelo, el clima y las cosecha), para la azul, el agua bebida por los animales, la de servicio y la incorporada al producto y finalmente para la gris el nitrógeno lixiviado a partir de la concentración en excretas y el uso de fertilizantes, se espera de esta manera realizar un análisis correlacional entre los resultados de la estimación y el tipo de sistema productivo.

Palabras clave: Buenas prácticas, sostenibilidad, silvopastoril, agua.



Water footprint assessment in bovine livestock production systems

Abstract

The water footprint (WF) is an important indicator that allows characterizing the volume or quantity of water used in obtaining a product. It is a useful indicator for making decisions and actions tending to reduce the negative impact of productive activities on water resources. The objective of this project is to estimate the water footprint of milk production, including traceability of the resource in the primary source of production by quantifying the consumed water, blue and green and contaminated or gray water, in traditional bovine and silvopastoral farms and identify the relationship between the estimated WF and the productive processes, emphasizing in the one related to the arboreal component. A descriptive and quantitative analysis will be carried out, as the target population will be considered productive units whose main economic income is milk production, located in the municipalities of Tunja and Duitama, using a discretionary non-probabilistic sampling, two productive units will be studied with management traditional monoculture and two productive units in silvopastoral system. The units will be characterized, making a grouping according to size, area for grazing, pasture management practices, area for the tree component, daily milk production, total number of cows, number of females in production and other components used in the development of your activities. Based on the information obtained, the Water Footprint Network (2011) approach will be used to estimate direct WF, using the CROPWAT program for the estimation of the green water footprint (program for the calculation of crop water requirements), and irrigation needs based on soil, climate and crop information), for blue, water drunk by animals, service water and the water incorporated into the product and finally for gray nitrogen leached from water. Concentration in excreta and the use of fertilizers, it is expected in this way to perform a correlational analysis between the results of the estimation and the type of productive system.

Keywords: Good practices, sustainability, silvopasture, water.

Manejo de residuos sólidos urbanos orgánicos en el municipio de Paipa (Boyacá, Colombia)

José Francisco García Molano, Joel David Parra Alba

Grupo de investigación en Abonos Orgánicos Fermentados (AOF) de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, Tunja-Colombia. jgarcia@jdc.edu.co, jparra@jdc.edu.co.

Resumen

En el municipio de Paipa se recolectan 420 toneladas promedio mensuales de residuos sólidos urbanos, y según el histórico de disposiciones mensuales en el relleno sanitario, son 44,51% orgánico, 36,12% reciclable y 19,37% no aprovechable (PGIRS, 2016). Así, el material más representativo en peso es el orgánico, debido a sus condiciones de humedad, tamaño de las partículas, dureza, composición química y contenido de biomasa. Por esta razón, se requiere de un manejo adecuado, para la transformación de éstos, con trabajo mancomunado entre las comunidades y entidades gubernamentales, para evitar la proliferación de olores fuertes, roedores e insectos. Además, este material contiene entre 70-80% de humedad, que al descomponerse sufre una etapa de hidrólisis, en donde se liberan moléculas, que al contacto y escurrimiento contaminan el suelo y subsuelo, así como fuentes de agua; por lo cual se requiere metodologías de captación que permitan aprovechar este líquido, como potencial energético en forma de biogas y abono líquido. Por esta razón, se usará la metodología Indore que permite la descomposición del material y su deshidratación hasta el 50 %, de esta manera se evita la propagación de olores fuertes; para este fin, es necesario implementar protocolos de calidad, desde la sensibilización de los habitantes urbanos del municipio al separar residuos orgánicos de los aprovechables y los higiénicos, con el fin de mitigar el contenido de metales pesados como Cadmio, Plomo, Cromo y Níquel en los RSOU, a través de los parámetros de la Norma Técnica Colombiana 5167, para garantizar la inocuidad y efectividad del producto final con elementos como el Fosforo, Calcio, Carbono, Nitrógeno, Oxígeno, Magnesio, Manganese, Cobre, Zinc, Hierro, Azufre, Manganese y Boro, los cuales deben cuantificarse, además de conocer

su dinámica en suelo agrícola y posteriormente en la nutrición vegetal, convirtiéndose en una alternativa de implementación que contribuya a mejorar las condiciones físicas y químicas de los suelos, además se generan espacios para la investigación científica, y determinar la evolución de los diferentes procesos que respondan a una solución de tipo ambiental y con una producción de fertilizantes para la producción agrícola.

Palabras clave: Residuos sólidos, fertilizantes, suelo.

Management of organic urban solid waste in the municipality of Paipa (Boyacá, Colombia)**Abstract**

In the municipality of Paipa 420 monthly average tons of solid urban waste are collected, and according to the history of monthly disposals in the sanitary landfill, they are 44.51% organic, 36.12% recyclable and 19.37% unusable (PGIRS, 2016). Thus, the most representative material by weight is organic, due to its moisture conditions, particle size, hardness, chemical composition and biomass content. For this reason, proper management is required for the transformation of these, with joint work between communities and government entities, to prevent the proliferation of strong odors, rodents and insects. In addition, this material contains between 70-80% humidity, which decomposes undergoes a hydrolysis stage, where molecules are released, which contact the pollutant soil and subsoil, as well as water sources; Therefore, collection methodologies are required to take advantage of this liquid, as an energetic potential in the form of biogas and liquid fertilizer. For this reason, the Indore methodology will be used, which allows the decomposition of the material and its dehydration up to 50%, thus avoiding the propagation of strong odors; for this purpose, it is necessary to implement quality protocols, from the awareness of the urban inhabitants of the municipality to separate organic waste from the usable and hygienic, in order to mitigate the content of heavy metals such as cadmium, lead, chromium and nickel in the RSOU, through the parameters of Colombian Technical Standard 5167, to ensure the safety and effectiveness of the final product with elements such as Phosphorus, Calcium, Carbon, Nitrogen, Oxygen, Magnesium, Manganese, Copper, Zinc, Iron, Sulfur, Manganese and Boro, which must be quantified, in addition to knowing their dynamics in agricultural land and later in plant nutrition, becoming an alternative of implementation that contributes to improve the physical and chemical conditions of soils, in addition spaces for research are generated and determine the evolution of the different processes that respond to an environmental solution and with a production of fertilizers for agricultural production.

Keywords: Solid waste, fertilizers, soil.

Métodos de valoración de servicios ecosistémicos

Ivan David Pardo Nuñez, Jeemison Ivan Rozo Samuel

Estudiantes Investigadores Universidad de Cundinamarca.
david.pardo.nunez93@gmail.com, rozo.co85@gmail.com.

Resumen

La finalidad de esta ponencia es proveer conceptos y metodologías que contribuyan al sostenimiento del medio ambiente; dentro del aspecto de los servicios ecosistémicos, para ser más exactos: los servicios de provisión, en donde como principal objetivo se aplicará una investigación documental para obtener el método más completo y de esta manera lograr dar un valor a los recursos que proveen los ecosistemas. Las principales fuentes de la documentación implementada en la metodología de la investigación son; un documento exploratorio de la cuenta de ecosistemas publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) el cual aporta las bases conceptuales acerca de los servicios de provisión dados por el ecosistema y una parte acerca de metodologías para una clasificación contable de los mismos, por otra parte está el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible que establece algunos métodos de valorización de los recursos ambientales. Cabe resaltar que no solo se tendrán en cuenta conceptos nacionales, pues se reúnen teorías de países vecinos o aquellas establecidas por entidades internacionales que busquen el desarrollo sostenible. Finalmente, en un proyecto dedicado a lograr una contabilidad ambiental de ecosistemas para la provincia del Sumapaz se obtuvieron resultados que llevaron a esta nueva investigación, pues es necesario dar un valor a los recursos. Por ende, se espera obtener el mejor método para valorizar los recursos ambientales de provisión y contribuir al desarrollo sostenible en la provincia del Sumapaz.

Palabras clave: Ecosistemas, servicios de provisión, servicios del ecosistema.

Assessment methods of resources for ecosystems

Abstract

The purpose of this paper is to provide concepts and methodologies that contribute to the sustainability of the environment; within the aspect of ecosystem services, to be more exact: the provision services, where as the main objective a documentary research will be applied to obtain the most complete method and in this way to give a value to the resources provided by the ecosystems. The main sources of documentation implemented in the research methodology are; an exploratory document of the ecosystems account published by the National Administrative Department of Statistics (DANE, acronym in Spanish), which provides the conceptual bases about the provision services given by the ecosystem and a part about methodologies for an accounting classification of the same, by another part is the Ministry of Environment and Sustainable Development that establishes some methods of valorization of environmental resources. It should be noted that not only will national concepts be taken into account, since theories from neighboring countries or those established by international entities that seek sustainable development are gathered. Finally, in a project dedicated to achieving environmental accounting of ecosystems for the province of Sumapaz, results were obtained that led to this new investigation, since it is necessary to give a value to resources. Therefore, it is expected to obtain the best method to value the environmental resources of provision and contribute to sustainable development in the province of Sumapaz.

Keywords: Ecosystem, provision services, ecosystem services.

Determinación de la efectividad de la *Lemna minor* y *Eichhornia crassipes* para remover ácido acetilsalicílico

Jesús Antonio Quintero Cardozo¹, Sandra Nayivi Torres Alamrio², Álvaro Adrián Alfaro Forero³.

¹Instituto Universitario de la Paz – UNIPAZ. Investigador Grupo de Investigación en Ingeniería Ambiental.

jesus.quintero@unipaz.edu.co. ²Instituto Universitario de la Paz – UNIPAZ. Auxiliar de Investigación Semillero de Investigación Conciencia Verde.

sanacool_1718@hotmail.com. ³Instituto Universitario de la Paz – UNIPAZ. Auxiliar de Investigación Semillero de Investigación Conciencia Verde.

alvaroadrian92@gmail.com

Resumen

Actualmente existe un creciente interés por los contaminantes emergentes (CE), ya que son compuestos de distinto origen de naturaleza química, cuya presencia en el medio ambiente o las posibles consecuencias de la misma, han pasado inadvertidas, causando problemas ambientales y de riesgo para la salud. Estos compuestos se encuentran diseminados en el medio y se han detectado en fuentes de abastecimiento de aguas; son compuestos de los que relativamente se conoce poco, en cuanto a su presencia e impacto y tratamiento, en la mayoría de los casos son contaminantes no regulados, que pueden ser candidatos a regulaciones futuras (Gil, et al., 2012). Algunas plantas convencionales de tratamiento de aguas residuales o para uso potable no están diseñadas para eliminar estos tipos de contaminantes. Estos comprenden los productos farmacéuticos, del cuidado personal, surfactantes, aditivos industriales, plastificantes, plaguicidas y una gran variedad de compuestos químicos que aunque se encuentran en bajas concentraciones son capaces de alterar las funciones endocrinas, es por esa razón que han llegado a ser en la actualidad un serio problema (Gómez, Moroyoqui & Drogui, 2011); en ese contexto esta investigación busca determinar la efectividad que pueden tener las especies vegetales macrofitas *Lemna minor* y *Eichhornia crassipes* en la remoción de contaminantes emergentes, particularmente el ácido acetilsalicílico; a través del método propuesto por Quintero (2018), que describe las fases del proyecto la cual serían; 1. La recopilación de información primarias y

secundaria, 2. Identificación de las especies nativas, 3. Diseño del sistema experimental tipo batch y la puesta en marcha de la unidad, 4. La adaptación de las especies. 5. Descripción morfológica de las especies en el sistema, 6. Se realizará la toma de las muestras suficientes para determinar la eficiencia de las especies en la remoción del ácido acetilsalicílico (AAS). Se busca con esta investigación generar conocimiento clave sobre alternativas de tratamiento para reducción de contaminantes emergentes como una necesidad actual para abordar los posibles efectos que causan estos elementos en los ecosistemas y determinar índices de remoción de los patrones vegetales en función de las concentraciones del contaminante de origen farmacéutico ácido acetilsalicílico.

Palabras clave: Contaminantes emergentes, macrofitas, fitoremediaciòn.

Agradecimientos

Se agradece al Instituto Universitario de la Paz – UNIPAZ, al Semillero de Investigación Conciencia Verde y al Núcleo de Investigación en Biotecnología Ambiental – NIBA

Determination of the effectiveness of *Lemna minor* and *Eichhornia crassipes* to remove acetilsalicílico acid**Abstract**

Currently there is a growing interest in emerging pollutants (EP), since they are compounds of different origin of a chemical nature, whose presence in the environment or the possible consequences of it have gone unnoticed, causing environmental problems and risk to the environment and health. These compounds are scattered in the medium and have been detected in water supply sources; they are compounds of which relatively little is known, in terms of their presence and impact and treatment, in most cases they are unregulated pollutants, which may be candidates for future regulations (Gil, et al., 2012). Some conventional wastewater treatment or drinking water treatment plants are not designed to eliminate these types of contaminants. These include pharmaceutical products, personal care products, surfactants, industrial additives, plasticizers, pesticides and a wide variety of chemical compounds that, although found in low concentrations, are capable of altering endocrine functions, which is why they have become common currently a serious problem (Gómez, Moroyoqui & Drogui, 2011); In this context, this research seeks to determine the effectiveness of the macrophyte plant species *Lemna minor* and *Eichhornia crassipes* in the removal of emerging contaminants, particularly acetilsaliclyic acid; through the method proposed by Quintero (2018), which describes the phases of the project which would be; 1. Collect of primary and secondary information, 2. Identify of the native species, 3. Design the batch-type experimental system and the start-up of the unit, 4. Adaptation of the species. 5. Morphological description of the species in the system. 6. Sufficient sampling will be done to determine the efficiency of the species in the removal of acetilsaliclyic acid (ASA). The aim of this research is to generate key knowledge on treatment alternatives for the reduction of emerging pollutants as a current need to address the possible effects that these elements cause on ecosystems and to determine indices of removal of plant patterns based on the pollutant

concentrations of pharmaceutical origin acetilsaliclyic acid.

Keywords: Emerging contaminants, macrophytes, phytoremediation.

Remoción de ácido acetilsalicílico en humedales artificiales utilizando las especies *Cyperus papyrus* y *Pistia stratiotes*

Jesús Antonio Quintero Cardozo¹, Juan Diego Lozano Castro², Armando Aguilar Galeano³

¹Instituto Universitario de la Paz – UNIPAZ. Investigador Grupo de Investigación en Ingeniería Ambiental. jesus.quintero@unipaz.edu.co. ²Instituto Universitario de la Paz – UNIPAZ. Auxiliar de Investigación Semillero de Investigación Conciencia Verde. sanacool_1718@hotmail.com. ³Instituto Universitario de la Paz – UNIPAZ. Auxiliar de Investigación Semillero de Investigación Conciencia Verde. alvaroadrian92@gmail.com

Resumen

El desarrollo de tecnologías y métodos más sensibles de análisis ha permitido identificar la presencia de otros contaminantes potenciales, denominados globalmente como emergentes, entre ellos se destacan los fármacos por el alto consumo de estos, debido a la producción a gran escala de elementos que funcionan para preservar la salud de las personas y luego son vertidos en las aguas residuales a los cuerpos hídricos sin normatividad que los regule (Barceló, 2007). Jiménez (2011) menciona que por su composición analgésica el ácido acetilsalicílico (AAS) es uno de los productos fármacos más utilizados en el mundo. Gil, (2012) indica por ejemplo que en un estudio realizado en el hospital de la Universidad del Norte en Barranquilla, encontró que en los efluentes que descargan al sistema de alcantarillado hay presencia de estas sustancias. Los humedales artificiales como sistema depurador son eficientes en la reducción de contaminantes emergentes como el Ibuprofeno (Noche y Osorio, 2018), a través del uso de rasgos funcionales (sistema radicular) de las especies que permiten la fitorremediación. Esta investigación aborda la evaluación de las especies *Pistia stratiotes* y *Cyperus papyrus* para identificar índices de remoción del compuesto AAS disuelto en agua, a través de la implementación de humedales artificiales a escala piloto; la cual se desarrollara en unidades tipo batch donde se medirán variables de evaluación y control en determinados períodos de tiempo que definirán la eficiencia, el método utilizado es el propuesto por Quintero *et al.*, 2018, adaptado a

esta investigación el cual describe las fases para el análisis y corresponde: i). Identificación de las especies del área de estudio. ii). Definición de los factores de diseño del sistema biológico. iii). Puesta en marcha de la unidad experimental. iv). Descripción morfológica de las especies en el sistema v). Análisis experimental de los índices de efectividad de las especies utilizadas en el estudio. vi). Determinación de los índices de remoción. El resultado esperado busca definir los índices de remoción de concentraciones de AAS, y con ello generar una base de conocimiento que aporte a la generación de alternativas de manejo y tratamiento para la disminución de estos elementos contaminantes.

Palabras clave: Humedales, contaminación, macrofitas, contaminantes emergentes, alteración en la biota.

Agradecimientos

Se agradece al Instituto Universitario de la Paz – UNIPAZ, al Semillero de Investigación Conciencia Verde y al Núcleo de Investigación en Biotecnología Ambiental – NIBA



Removal of acid acetilsalicilic in artificial wetlands using the species *Cyperus papyrus* and *Pistia stratiotes*

Abstract

The development of more sensitive technologies and methods of analysis has made it possible to identify the presence of other potential contaminants, globally referred to as emerging, among them drugs stand out due to the high consumption of these, due to the large-scale production of elements that work for preserve the health of people and then they are discharged into the wastewater to the water bodies without regulations that regulate them (Barceló, 2007). Jiménez (2011) mentions that due to its analgesic composition, acetylsalicylic acid (ASA) is one of the most widely used pharmaceutical products in the world. Gil (2012) indicates, for example, that in a study conducted at the Universidad del Norte hospital in Barranquilla, he found that the presence of these substances is present in the effluents that discharge into the sewage system. Artificial wetlands as a purifying system are efficient in the reduction of emerging pollutants such as Ibuprofen (Noche and Osorio, 2018), through the use of functional features (root system) of the species that allow phytoremediation. This research deals with the evaluation of the species *Pistia stratiotes* and *Cyperus papyrus* to identify removal rates of the dissolved ASA compound in water, through the implementation of artificial wetlands on a pilot scale; which will be developed in batch units where evaluation and control variables will be measured in certain periods of time that will define the efficiency, the method used is the one proposed by Quintero et al., 2018, adapted to this investigation which describes the phases for the analysis and corresponds: i). Identification of the species in the study area. ii). Definition of the design factors of the biological system. iii). Start-up of the experimental unit. iv). Morphological description of the species in the system v). Experimental analysis of the effectiveness indices of the species used in the study. vi). Determination of removal rates. The expected result seeks to define the removal rates of ASA concentrations, and thereby generate a knowledge base that contributes to the generation of

management and treatment alternatives for the reduction of these contaminants.

Keywords: Wetlands, pollution, macrophytes, emerging pollutants, alteration in biota.

Análisis de las percepciones de la práctica de caza y consumo de carne de monte en los departamentos del Amazonas y Meta, Colombia

Josué Hernández Manzanera¹, José Manuel Martínez Alférez², Diego Soler-Tovar³

¹MV, Semillero de Investigación Una Salud, Programa de Medicina Veterinaria, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad de La Salle. Correo-e:

josuehernandez03@unisalle.edu.co.

²MV, Semillero de Investigación Una Salud, Programa de Medicina Veterinaria, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad de La Salle. Correo-e:
josemmartinez74@unisalle.edu.co.

³MSc, Grupo Epidemiología y Salud Pública, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad de La Salle. Correo-e:
diegosoler@unisalle.edu.co

Resumen

En Colombia, son escasos los estudios técnicos sobre las capacidades sustentables de aprovechamiento de poblaciones de la fauna silvestre. Las políticas de control y prohibición vigentes no se basan en objetivos de desarrollo sostenible que ayuden a las poblaciones humanas vulnerables a suplir sus necesidades en seguridad alimentaria, evitando la extinción de las especies silvestres y la transmisión de enfermedades zoonóticas. El objetivo de este estudio fue analizar la percepción frente al impacto ambiental, epidemiológico y en seguridad alimentaria de la práctica de caza y consumo de carne de monte en localidades específicas de los departamentos del Amazonas y Meta, Colombia. Se realizaron 246 encuestas en la ciudad de Leticia (Amazonas) y 246 encuestas en Cumaryl, Restrepo, Guacavía, Veracruz y Villavicencio (Meta), a mujeres entre 30 y 60 años de edad; se evaluó y clasificó la importancia sobre la seguridad alimentaria, epidemiología e impacto ambiental de esta práctica. Se encontró un alto índice de consumo de especies silvestres por parte de poblaciones vulnerables que no tienen fácil acceso a la canasta familiar, demostrando una alta dependencia a la carne de monte. Por otro lado, las especies que se consumen con mayor frecuencia se incluyen: *Dasypodidae* sp., *Hydrochoerus hydrochaeris*, *Tapirus terrestris*, y *Podocnemis unifilis*, especies reportadas en

categoria de riesgo ante la UICN y otras entidades nacionales. Por último, se dificulta el análisis epidemiológico en estas comunidades, por la falta de relación entre alimento (causa) y enfermedad (efecto), aunque existen reportes de patógenos que pueden ser un riesgo para la salud de estas comunidades, por el contacto con los animales silvestres o por el inadecuado manejo de su carne después de la caza. La práctica de caza y consumo de carne de monte es de importancia para la seguridad alimentaria en estas comunidades, pero a su vez genera un impacto ambiental sobre la fauna silvestre. Por ende, para ayudar a estas comunidades, es necesaria la implementación de marcos normativos basados en la identificación de especies aptas para esta práctica, volviéndola sostenible, y favoreciendo tanto la subsistencia de estas comunidades como la preservación de poblaciones silvestres que se encuentren bajo amenaza.

Palabras clave: Conservación, seguridad alimentaria, poblaciones vulnerables, salud pública, práctica sostenible, dependencia.

Analysis of perceptions of the practice of hunting and consumption of bushmeat in departments of the Amazon and Meta, Colombia

Abstract

In Colombia, there are few technical studies on the sustainable use of populations of wildlife. Current control and prohibition policies are not based on sustainable development objectives that help vulnerable human populations meet their needs in food security, avoiding the extinction of wild species and the transmission of zoonotic diseases. The objective of this study was to analyze the perception of the environmental, epidemiological and food security impact of hunting and consumption of bushmeat in specific localities of the departments of Amazonas and Meta, Colombia. There were 246 surveys in the city of Leticia (Amazonas) and 246 surveys in Cumaryl, Restrepo, Guacavía, Veracruz and Villavicencio (Meta), to women between 30 and 60 years of age; the importance of food safety, epidemiology and environmental impact of this practice was evaluated and classified. We found a high rate of consumption of wild species by vulnerable populations that do not have easy access to the family basket, demonstrating a high dependence on bushmeat. On the other hand, the most commonly consumed species include: *Dasypodidae* sp., *Hydrochoerus hydrochaeris*, *Tapirus terrestris*, and *Podocnemis unifilis*, species reported in risk category before the IUCN and other national entities. Finally, epidemiological analysis is difficult in these communities, due to the lack of relationship between food (cause) and disease (effect), although there are reports of pathogens that can be a risk to the health of these communities, by contact with the wild animals or the inadequate handling of their meat after hunting. The practice of hunt and consumption of bush meat is important for food security in these communities, but in turn generates an environmental impact on wildlife. Therefore, to help these communities, it is necessary to implement regulatory frameworks based on the identification of suitable species for this practice, making it sustainable, and favoring both the subsistence of these communities and the

preservation of wild populations that are under threat.

Keywords: Conservation, food security, vulnerable populations, epidemiological risk, sustainable practice, dependence.

Diagnóstico, análisis y monitoreo rápido de la gestión ambiental utilizando herramientas cartográficas en dos granjas avícolas

María Manuela Botero Rueda¹, Manuela Acero Ovalle², María Elena Belalcázar Zafra³, Carolina Bespalhok Jacometo⁴

¹Estudiante Medicina Veterinaria, Universidad de La Salle. Bogotá. [✉ mbotero20@unisalle.edu.co](mailto:mbotero20@unisalle.edu.co). ²Estudiante Medicina Veterinaria, Universidad de La Salle. Bogotá. [✉ macero32@unisalle.edu.co](mailto:macero32@unisalle.edu.co). ³Docente Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad de la Salle. Bogotá. [✉ mebelalcazar@unisalle.edu.co](mailto:mebelalcazar@unisalle.edu.co). ⁴Docente Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad de la Salle. Bogotá. [✉ cbespalhok@unisalle.edu.co](mailto:cbespalhok@unisalle.edu.co)

Resumen

La gestión ambiental resulta clave en el sector avícola colombiano para mejorar el rendimiento productivo de las granjas, implementando prácticas de manejo sostenibles que permiten reducir y prevenir los impactos ambientales. Con este proyecto se pretende dar una mirada rápida al componente ambiental de dos granjas avícolas en dos diferentes pisos térmicos, realizando un diagnóstico, análisis y monitoreo de la información, siendo útil para identificar las fallas que pueden comprometer el rendimiento productivo de la granja y así poder proceder a la toma de decisiones, mejora de procesos e implementación del componente ambiental de las granjas, aumentando la eficiencia y disminuyendo costos de producción. Este estudio se realizará mediante el uso de herramientas cartográficas online de bajo costo como *Google Earth Pro*, se diseñará una matriz que contenga los parámetros de las normativas en Colombia para implementar una granja avícola y la guía ambiental del subsector avícola, con el fin de realizar un diagnóstico territorial de las granjas evaluadas en los dos pisos térmicos. Se obtendrán mediciones tales como: las distancias mínimas a áreas urbanas, suburbanas, fuentes hídricas, otras granjas avícolas, vías primarias y secundarias, y el área mínima del predio aceptada para la producción de pollos de engorde. Los resultados esperados son la creación e implementación de una herramienta que facilite el diagnóstico territorial a distancia de una granja avícola, para determinar si se cumple o no con las normativas estipuladas en la guía ambiental.

Palabras claves: Vigilancia ambiental, cartografía, impacto ambiental.

Quick analysis, diagnosis and monitoring of the environmental management in two poultry farms**Abstract**

Environmental management is the key in the Colombian aviculture sector to improve the productive performance of farms, implementing sustainable management practices that reduce and prevent environmental impacts. This project aims to give a quick look at the environmental component of two poultry farms in two different thermal floors, making a diagnosis, analysis and monitoring of information, being useful to identify failures that can compromise the productive performance of the farm and thus to be able to make decisions, improve processes and implement the environmental component of the farms, increasing efficiency and decreasing production costs. This study will be carried out through the use of low cost online mapping tools such as Google Earth Pro, a matrix will be designed that contains the parameters of the regulations in Colombia to implement a poultry farm and the environmental guide of the poultry sub-sector, in order to carry out a territorial diagnosis of the farms evaluated in the two thermal floors. Measurements will be obtained such as: minimum distances to urban, suburban areas, water sources, other poultry farms, primary and secondary roads, and the minimum area of the farm accepted for the production of broiler chickens. The expected results are the creation and implementation of a tool that facilitates the territorial diagnosis at a distance of a poultry farm, to determine whether or not it meets the regulations stipulated in the environmental guide.

Keywords: Environmental monitoring, cartography, environmental impact.

Influencia del material de siembra sobre el desarrollo de plantas botón de oro (*Tithonia diversifolia*)

Melissa Arias Arroyave, Jhon Edison Campo, Jennifer Andrea Chacón Valencia, Luis Alberto Gallego Castro.

Universidad de Antioquia. jhon.campo@udea.edu.co, melissa.arias@udea.edu.co, jennyfer.chacon@udea.edu.co.

Resumen

El trabajo que se llevó a cabo, tuvo como objetivo analizar la influencia del material de siembra sobre el diámetro del tallo y el crecimiento de plantas botón de oro (*Tithonia diversifolia*) en el municipio de Guarne, Antioquia. Se realizó la preparación del terreno y la extracción manual del material vegetativo no benéfico para el proyecto, se dividió el terreno en seis parcelas de 21 m² cada una, con distancias entre parcelas de 1m y cinco surcos por parcela a una distancia de 1m entre estos; tres parcelas se sembraron con plántulas obtenidas de almácigos (T1) y tres parcelas con material vegetativo (T2). Se midieron la altura y el diámetro del tallo principal en el primer ciclo productivo, al día 60 después del corte de homogenización; bajo un diseño completamente aleatorizado se analizaron los datos. Los resultados parciales de este estudio muestran diferencia significativa ($p \leq 0.05$) entre los tratamientos para la altura, con resultados promedio para (T1) de 44,16cm y para (T2) de 34,71cm, lo que indica que la variable independiente influye en la variable dependiente; en cuanto al diámetro no se encontró diferencia significativa ($p \geq 0.05$) entre los tratamientos, con resultados promedios para (T1) de 1,071 y para (T2) de 1,004cm. esto quiere decir que la variable independiente no tiene influencia en la variable dependiente. De manera preliminar los resultados muestran que las plantas provenientes de almácigos a partir de semilla sexual presentan un crecimiento inicial más acelerado que las plantas obtenidas a partir de material vegetativo, esto posiblemente se deba al desarrollo de la raíz principal, contrario a lo que ocurre en las obtenidas de material vegetativo, que solo presentan raíces secundarias.

Palabras clave: Diámetro, crecimiento, material vegetativo, plántulas.

Agradecimientos

Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia. ASEAGRARIAS -Asociación de Egresados de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia.

Influence of planting material over the development the mexican sunflower (*Tithonia diversifolia*)**Abstract**

The objective of this work was to analyze the influence of planting material on the diameter of the stem and the growth of golden button plants (*Tithonia diversifolia*) in the municipality of Guarne, Antioquia. The preparation of the land and the manual extraction of non-beneficial vegetative material for the project were carried out. The plot was divided into six plots of 21 m² each, with distances between plots of 1m and five rows per plot at a distance of 1m between them.; three plots were planted with seedlings obtained from seedbeds (T1) and three plots with vegetative material (T2). The height and diameter of the main stem were measured in the first productive cycle, at day 60 after the homogenization cut; under a completely randomized design, the data were analyzed. The partial results of this study show significant difference ($p \leq 0.05$) among treatments for height, with average results for (T1) of 44.16cm and for (T2) of 34.71cm, which indicates that the variable independent influences the dependent variable; Regarding the diameter, no significant difference was found ($p \geq 0.05$) between the treatments, with average results for (T1) of 1.071 and for (T2) of 1.004cm. This means that the independent variable has no influence on the dependent variable. In a preliminary way, the results show that plants from seedbeds from sexual seed have a faster initial growth than plants obtained from vegetative material; this is possibly due to the development of the main root, contrary to what occurs in those obtained from vegetative material, which only have secondary roots.

Keywords: Diameter, growth, vegetative material, seedlings.



Resúmenes para el área de
NUTRICIÓN

Digestibilidad *in vitro* de dos arbustivas y un árbol forrajero, inoculando líquido ruminal de ovinos

Diego Fernando. Muñoz Carvajal¹, Dairo Alexander. Urrea Rengifo¹ y María Ligia. Roa Vega²*

¹Médicos Veterinarios Zootecnistas, Universidad de los Llanos: Email: diego.munoz.carvajal@unillanos.edu.co y dairo.urrea@unillanos.edu.co, ²Zootecnista Esp. MSc.

Docente Universidad de los Llanos de Investigación Agroforestería, Villavicencio-Meta, Colombia. Email: mroa@unillanos.edu.co

Resumen

Para optimizar la producción ovina en zonas tropicales, se requiere de forrajes que aporten nutrientes para el eficiente desarrollo de los animales, siendo necesario que los productores conozcan la gran variedad de arbóreas, arbustivas u otras forrajeras disponibles, que pueden ser fuente de proteína y energía para los ovinos. El objetivo fue determinar los componentes nutricionales y digestibilidad *in vitro* de tres forrajeras, botón de oro (*Tithonia diversifolia*) (TD), matarratón (*Gliricidia sepium*) (GP) y cratylia (*Cratylia argentea*) (CA), utilizando líquido ruminal de ovello como inoculo. Esta investigación se realizó en la granja de UNILLANOS, Villavicencio, las recolecciones de hojas de las forrajeras se hicieron a los 50 días después de una poda de cultivos de dos años de establecidos. El modelo estadístico utilizado fue completamente al azar tres tratamientos que fueron las forrajeras, seis repeticiones. En el laboratorio se determinó materia seca (MS), proteína cruda (PC) y fibra detergente neutra (FDN) y fibra detergente ácido (FDA). Para las pruebas *in vitro* se incubaron los forrajes a 6, 12, 24,48 y 72 horas a 38°C, el líquido ruminal fue mezclado con la solución de Mc Dougall, y se coloca en una jeringa llenándola totalmente para evitar la oxigenación del material. Las muestras se colocaron en incubadora heidolph®, (Modelo Plug & Play Unimax) con movimientos circulares y velocidad 113 revoluciones por minuto (RPM). CA presentó la mayor MS (30,4%) y PC (22,82%) frente a los otros forrajes, pero debido a sus altos valores de FDN (42,56%) y FDA (29,34%), su digestibilidad *in vitro* de MS

y FDN a 72 horas (48,82 y 41,63%), fue inferior ($P<0,05$) con relación a TD y GS: 58,59; 46,83% y 69,05; 57,79%, respectivamente. Simulando la cinética de degradación *in vitro*, se encontró que la fracción potencialmente degradable para GP fue de 68,96%, siendo superior ($P<0,05$) en 16,12% y 29,37% con relación a TD y CA, respectivamente. Se evidenció que GS es la mejor alternativa para la alimentación en ovinos, con MS (26,6%), PC (17,71%), FDN (32,52%) y FDA (15,24%) y por su mayor digestibilidad de MS y FDN al compararlo con los otros forrajes.

Palabras clave: *Fabaceae, compositae*, calidad nutricional, digestibilidad

**In vitro digestibility of two shrubs and a fodder tree inoculating ruminal liquid of sheep****Abstract**

To optimize ovine production in tropical areas, forages that provide nutrients for the efficient development of animals are required, being necessary for producers to know the wide variety of trees, shrubs and other available forages, which can be a source of protein and energy for the sheep. The objective was to determine the nutritional components and in vitro digestibility of three forages, golden button (*Tithonia diversifolia*) (TD), matarratón (*Gliricidia sepium*) (GP) and cratylia (*Cratylia argentea*) (CA), using sheep ruminal liquid as inoculum. This research was carried out in the farm of UNILLANOS, at Villavicencio, forage leaf collections were made 50 days after a two-year established crop pruning. The statistical model used was completely randomized three treatments that were forages, six repetitions. In the laboratory, dry matter (DM), crude protein (CP) and neutral detergent fiber (NDF) and acid detergent fiber (ADF) were determined. For the in vitro tests the forages were incubated at 6, 12, 24, 48 and 72 hours at 38 ° C, the ruminal fluid was mixed with the solution of Mc Dougall, and placed in a syringe filling it completely to avoid oxygenation of the material. The samples were placed in a heidolph® incubator (Plug & Play Unimax model) with circular movements and speed 113 revolutions per minute (RPM). CA presented the highest DM (30.4%) and CP (22.82%) compared to the other forages, but due to its high values of NDF (42.56%) and ADF (29.34%), its digestibility In vitro DM and NDF at 72 hours (48.82 and 41.63%), was lower ($P < 0.05$) in relation to TD and GS: 58.59; 46.83% and 69.05; 57.79%, respectively. Simulating the kinetics of in vitro degradation, it was found that the potentially degradable fraction for GP was 68.96%, being higher ($P < 0.05$) in 16.12% and 29.37% in relation to TD and CA, respectively. It was evidenced that GS is the best alternative for feeding in sheep, with DM (26.6%), CP (17.71%), NDF (32.52%) and ADF (15.24%) and for its greater digestibility of DM and NDF when compared with the other forages.

Keywords: *Fabaceae, compositae, nutritional quality, digestibility.*

Uso de harina de cayeno (*Hibiscus rosa-sinensis*) y probiótico (*Lactobacillus acidophilus*) en pollos

Iván Esteban Mariño Guerrero¹ y María Ligia Roa Vega^{2*}

¹Médico Veterinario Zootecnista, Universidad de los Llanos; Email: ivan.marino@unillanos.edu.co

²Zootecnista Esp. MSc. Docente Universidad de los Llanos de Investigación Agroforestería, Villavicencio-Meta, Colombia. Email: mroa@unillanos.edu.co

Resumen

La producción de aves de corral, logra ser mejorada económicamente introduciendo en sus dietas las forrajerías arbustivas, como el cayeno (*Hibiscus rosa-sinensis*), que puede ser una estrategia viable para reemplazar parcialmente el concentrado comercial (CC). Se ha comprobado, que los probióticos (*Lactobacillus acidophilus*) (LA) ayudan a reforzar la capacidad de defensa de la microflora en el tracto digestivo. El objetivo fue determinar el efecto del reemplazo de harina de cayeno (HC) sin y con probiótico más pectina (LAP) sobre parámetros productivos y digestibilidad de nutrientes, en pollos de engorde. Se utilizaron 90 pollos de engorde de un día, se les hizo adaptación, manejo sanitario y vacunación, manteniendo agua a voluntad, los primeros quince días se suministró CC y luego fue reemplazado con HC en niveles de: 0 (T1), 6 (T2) y 12% (T3), con y sin LAP, el peso inicial experimental fue de $543,6 \pm 72$ g. El diseño fue completamente al azar, arreglo factorial, tres tratamientos, dos niveles de probiótico: sin y con adición de LAP, tres repeticiones, cada una con cinco unidades experimentales. Se evaluó: ganancia de peso (GP), consumo de alimento (CA), conversión alimenticia (CoA), coeficiente de digestibilidad de materia seca (CodMS), rendimiento de canal (RC) y peso de: pechuga (PP), pierna pernil (PPP) y vísceras (PV). El CA por ave/día fue menor ($P < 0,05$) en T1 con y sin LAP 145,8 y 146,4g siguiendo en orden ascendente T3 con y sin LAP que fueron menores con relación a T2 con y sin LAP. La GP y por ave/día y CoA fueron similares para todos los tratamientos, observándose valores superiores de en T1 y T3 con LAP, 89,86gr; 1,63 y 88,83gr; 1,66, respectivamente. El RC y PPP fueron similares para todos los tratamientos. El PP fue

superior ($P < 0,05$) para T3 y T1 con LAP (806,2 y 800g). El codMS fue superior ($P < 0,05$) para T2 con y sin LAP (93,03 y 92,93%). Se observó que no hubo efecto del LAP ni el nivel de HC en GP, CA, RC y PPP, por lo tanto se puede recomendar el uso de esta arbustiva hasta el 12% reemplazando el CC.

Palabras clave: Pollos, arbustiva forrajera, microorganismos, digestión

Use of cayenne flour (*Hibiscus rosa-sinensis*) and probiotic (*Lactobacillus acidophilus*) in chickens

Abstract

Poultry production is economically improved by introducing shrub fodder into their diets, such as cayenne (*Hibiscus rosa-sinensis*), which may be a viable strategy to partially replace commercial concentrate (CC). It has been proven that probiotics (*Lactobacillus acidophilus*) (LA) help to strengthen the defense capacity of the microflora in the digestive tract. The objective was to determine the effect of replacement of cayenne flour (CF) without and with probiotic plus pectin (LAP) on productive parameters and nutrient digestibility, in broiler chickens. 90 day-old broiler chickens were used, they were adapted, sanitary management and vaccination, keeping water at will, the first fortnight was given CC and then it was replaced with HC at levels of: 0 (T1), 6 (T2) and 12% (T3), with and without LAP, the initial experimental weight was $543.6 \pm 72\text{g}$. The design was completely random, factorial arrangement, three treatments, and two levels of probiotic: without and with the addition of LAP, three repetitions, each with five experimental units. It was evaluated: weight gain (WG), feed intake (FI), feed conversion (FCo), dry matter digestibility coefficient (DMdCo), carcass yield (CY) and weight of: breast (WB), leg pernil (WLP) and viscera (WV). The FI per bird / day was lower ($P < 0.05$) in T1 with and without LAP 145.8 and 146.4g following in ascending order T3 with and without LAP that were lower in relation to T2 with and without LAP. The WG and per bird / day and FCo were similar for all the treatments, with higher values observed in T1 and T3 with LAP, 89.86gr; 1.63 and 88.83 g; 1,66, respectively. The CY and WLP were similar for all treatments. The WB was higher ($P < 0.05$) for T3 and T1 with LAP (806.2 and 800g). The DMdCo was higher ($P < 0.05$) for T2 with and without LAP (93.03 and 92.93%). It was observed that there was no effect of the LAP nor the level of CF in WG, FI, CY and WLP, therefore the use of this shrub can be recommended up to 12% replacing the CC.

Keywords: Chickens, fodder bush, microorganisms, digestion.

Digestibilidad *in vivo* de forrajes en ovinos utilizando microorganismos eficientes

¹María Ligia Roa Vega, ²Cesar Augusto Navarro Ortiz, ³Mónica Liseth Silva Quintero

¹Zootecnista Esp. MSc. Docente Universidad de los Llanos de Investigación Agroforestería, Villavicencio-Meta, Colombia Email: mroa@unillanos.edu.co. ²Médico Veterinario Zootecnista, MSc. Docente catedrático Universidad de los Llanos: Email: cesar.navarro@unillanos.edu.co. ³Médico Veterinario Zootecnista. Joven Investigadora. Universidad de los Llanos

Resumen

Los sistemas ovinos que están establecidos en zonas caracterizadas por la baja fertilidad de sus suelos requieren de suplementación con el fin de completar los requerimientos nutricionales para una efectiva producción de carne, asegurando su calidad e inocuidad. La tendencia de investigaciones sobre esta temática ha sido la búsqueda de forrajes con mayor contenido nutricional que las gramíneas, que con el uso de microorganismos eficientes (ME), pueden incrementar digestibilidad, lo cual se verá reflejado en la producción de carne de ovino buscando mejorar la ganancia de peso para obtener un producto en menor tiempo y de alta calidad. El objetivo fue determinar el efecto del uso de ME: *Lactobacillus* sp. y *Saccharomyces* sp. en la digestibilidad *in vivo* de forrajes en ovinos, con una dieta a base de gramíneas (GR): *Braquiaria decumbens* en pastoreo y *Pennisetum hybridum* suplementados con tres arbustivas: *Hibiscus rosa sinensis*, (HB) *Moringa oleifera* (MO) y *Morus alba* (MA) y salvado de trigo (ST). Este proyecto actualmente se está ejecutando en la zona del Piedemonte (Villavicencio, Meta). Se están utilizando diez ovinos Camuro cruzados con Katahdin con peso promedio de $15,6 \pm 4$ kg, previamente desparasitados y vitaminados. El consumo de las raciones se está calculando en materia seca aproximadamente 4% de peso vivo, se dispone de agua y sal mineralizada del 6% a voluntad. Los tratamientos son T1: GR (BD en pastoreo y 1 kg de PH), T2: GR, suplementados con HB; T3: GR suplementado con MO; T4: GR suplementados con MA, y T5 GR suplementados con ST. Se está suministrando 10 ml diarios por animal de los preparados de EM. A cinco ovinos

se les suministra ME y a cinco no. Se colectarán heces correspondientes a digestibilidad *in vivo* de 24 horas durante cinco días finalizando el experimento. Se llevarán las muestras al laboratorio para analizar: materia seca (MS), proteína cruda (PC), fibra cruda (FC) y grasa, para calcular los nutrientes digestibles totales (NDT). Además, se estimarán los aumentos de peso, consumo, conversión alimenticia y rendimiento en canal. El diseño es bloques completamente al azar, con cinco tratamientos, dos niveles de ME y cinco repeticiones.

Palabras clave: Arbustivas forrajera, probióticos, digestión, ovinos

**Digestibility *in vivo* of forks in sheep using efficient microorganisms****Abstract**

The sheep systems that are established in areas characterized by the low fertility of their soils require supplementation in order to complete the nutritional requirements for an effective production of meat, ensuring its quality and safety. The trend of research on this issue has been the search for forages with higher nutritional content than grasses, which with the use of efficient microorganisms (EM), can increase digestibility, which will be reflected in the production of sheep meat seeking to improve the gain of weight to obtain a product in less time and of high quality. The objective was to determine the effect of the use of EM: *Lactobacillus* sp. and *Saccharomyces* sp. *in vivo* digestibility of forages in sheep, with a diet based on grasses (GR): *Braquiaria decumbens* in grazing and *Pennisetum hybridum* supplemented with three shrubs: *Hibiscus rosa sinensis*, (HB) *Moringa oleifera* (MO) and *Morus alba* (MA) and wheat bran (WB). This project is currently being executed in the Piedemonte area (Villavicencio, Meta). We are using ten Camuro sheep crossed with Katahdin with an average weight of 15.6 ± 4 kg, previously dewormed and vitaminized. The consumption of the rations is being calculated in dry matter approximately 4% of live weight, water and mineralized salt of 6% are available at will. The treatments are T1: GR (BD in grazing and 1 kg of PH), T2: GR, supplemented with HB; T3: GR supplemented with MO; T4: GR supplemented with MA, and T5 GR supplemented with WB. 10 ml per day are being supplied per animal of the MS preparations. Five sheep are supplied EM and five do not. Feces corresponding to 24-hour *in vivo* digestibility will be collected during five days, ending the experiment. The samples will be taken to the laboratory to analyze: dry matter (DM), crude protein (PC), crude fiber (CF) and fat, to calculate the total digestible nutrients (TDN). In addition, increases in weight, consumption, feed conversion and carcass yield will be estimated. The design is completely random blocks, with five treatments, two EM levels and five repetitions.

Keywords: Fodder bush, probiotic digestion, sheep.

Suplementación con ensilaje de cáscara de naranja en la calidad composicional de leche bovina

Camilo Pineda Pulido¹, Anastasia Cruz Carrillo², Ángela M Rodríguez Salgado³, Nelson L. Peña Holguín⁴.

¹Estudiante X semestre de Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. cristhian.pineda@uptc.edu.co, ²MV. Esp. MSc. Docente Asociada Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. anastasia.cruz@uptc.edu.co, ³MVZ. Esp. MSc. Docente. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. angelarodsa@gmail.com, ⁴MV. Esp. Docente. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. nelsonphmv@hotmail.com

Resumen

El ensilaje de cáscara de naranja se ha usado en la suplementación de bovinos de engorde y en hembras productoras de leche, aprovechando su palatabilidad y calidad composicional representada principalmente en la presencia de flavonoides. Constituye esto una alternativa para la alimentación de los bovinos en cualquier época del año, siendo más significativa en épocas de verano. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la suplementación diaria de hembras bovinas en producción, sobre la calidad composicional de la leche, incluyendo la proporción de ácidos grasos de diferente tipo. Los dos ensilajes fueron elaborados en la Granja Experimental Tunguavita (GET). Se seleccionaron 22 hembras bovinas en producción, sanas, mantenidas en pastoreo (Kikuyo) en la GET, ubicada en el municipio de Paipa-Boyacá, con dos ordeños al día; se dividieron al azar en dos grupos, uno que recibió ensilaje de naranja entre 6 Kg en promedio cada día durante 40 días y otro que recibió ensilaje de avena en igual cantidad y durante el mismo tiempo. La digestibilidad *in vitro* del ensilaje de avena 63,7% y la del ensilaje naranja/avena, 66,1%. Se tomaron muestras de leche para valorar los componentes de la misma encontrando valores muy similares en ambos grupos en cuanto a pH, densidad, sólidos no grasos, proteínas, sales, lactosa y recuento de células somáticas pero fue superior el porcentaje de grasa en los animales que recibieron ensilaje de naranja/avena sobre los que recibieron solo avena. Se encontró menor proporción de ácidos grasos saturados en la leche

de las vacas suplementadas con ensilaje de naranja/avena (64,22%) que en las que consumieron ensilaje de avena (68,08%) y por ello mayor porcentaje de ácidos grasos insaturados, 33,6% y 31,6% respectivamente. En cuanto a los omega 3 y 6 se encontró 0,46% y 0,48% en las vacas suplementadas con ensilaje de naranja/avena y 0,42% en ambos tipos de ácidos grasos para las suplementadas con ensilaje de avena. Se demuestra que el ensilaje de naranja no solo constituyó un tipo de suplementación económica para las vacas en producción, sino que también mejoró la calidad de la leche.

Palabras clave: Ácidos grasos, nutrición animal, cítricos, leche enriquecida.

Supplementation with orange shells silage in the compositional quality of bovine milk

Abstract

The orange peel silage has been used in the supplementation of fattening cattle and in milk producing females, taking advantage of its palatability and compositional quality represented mainly in the presence of flavonoids. This constitutes an alternative for the feeding of bovines at any time of the year, being more significant in times of summer. The objective of this work was to evaluate the effect of the daily supplementation of bovine females in production, on the compositional quality of milk, including the proportion of fatty acids of different types. The two silages were made at the Tunguavita Experimental Farm (TEF). Twenty-two bovine females were selected in production, healthy, maintained in pasture (Kikuyo) in the TEF, located in the municipality of Paipa-Boyacá, with two milkings per day; they were randomly divided into two groups, one that received orange silage between 6 kg on average every day for 40 days and one that received oat silage in equal quantity and during the same time. The in vitro digestibility of oat silage 63.7% and that of orange / oat silage, 66.1%. Milk samples were taken to assess the components of the same finding values very similar in both groups in terms of pH, density, non-fat solids, proteins, salts, lactose and somatic cell count but the percentage of fat in animals was higher who received orange / oat silage on those who received only oatmeal. A lower proportion of saturated fatty acids were found in the milk of cows supplemented with orange / oat silage (64.22%) than in those that consumed oat silage (68.08%) and, therefore, a higher percentage of unsaturated fatty acids. 33.6% and 31.6% respectively. Regarding omega 3 and 6, 0.46% and 0.48% were found in cows supplemented with orange / oat silage and 0.42% in both types of fatty acids for those supplemented with oat silage. It is demonstrated that the orange silage not only constituted a type of economic supplementation for the cows in production, but also improved the quality of the milk.

Keywords: Fatty acids, animal nutrition, citrus, enriched milk.

Evaluación de algunos parámetros productivos en terneros alimentados con una dieta obtenida por fermentación en estado sólido (FES) papa-zanahoria

Angela Mireya Rodríguez Salgado¹, Luis Miguel Borras Sandoval², Carlos Eduardo Rodríguez Molano³

¹Medico Veterinario Zootecnista, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Docente Nutrición y Alimentación animal, Investigador Grupo de Investigación en Bioquímica y Nutrición Animal.

angelarodsa@gmail.com. ²Zootecnista, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Docente Producción de Bovinos, Investigador Grupo de Investigación en Bioquímica y Nutrición Animal.

³Zootecnista, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Docente Nutrición Animal y Bioquímica, Investigador Grupo de Investigación en Bioquímica y Nutrición Animal.

Resumen

El objetivo de la presente investigación fue determinar el comportamiento de algunos parámetros zootécnicos en terneros sometidos a diferentes inclusiones de FES papa-zanahoria y a la vez el efecto de las inclusiones de FES sobre el desarrollo ruminal en los terneros. Para esto, se establecieron cuatro grupos de animales, cada uno conformado por 4 terneros (cruces con Holstein); al tratamiento control se le suministro leche + forraje; tratamiento L/F/6grFES (leche+forraje+6gr de FES por kg de peso); tratamiento L/F/6grBalanc (leche+forraje+6gr de alimento balanceado por kg de peso); tratamiento L/F/9grFES (leche+forraje+9gr de FES por kg de peso). Las variables a evaluar fueron: ganancia de peso, altura a la cruz, consumos y desarrollo ruminal. El tiempo de experimentación fue de 8 semanas, iniciando la investigación a partir de la segunda semana de vida de los terneros. Al concluir el tiempo experimental, los animales que recibieron suplementación con 6gr de FES (L/F/6grFES) y 6gr de Balanceado (L/F/6grBalanc), alcanzaron un peso final estadísticamente superior ($p<0,05$) en relación a los animales del grupo Control. La mayor ganancia de peso durante el tiempo de estudio se obtuvo con la dieta L/F/6grFES, con un valor de 23,25 kg en las 8 semanas de experimentación, con un g.d.p. de 603,6 gr/día en el último pesaje;

seguido del grupo L/F/6grBalanceado con 469,6gr y el grupo L/F/9grFES con 462,5gr/día. Para la ganancia diaria promedio, se observa que en los animales suplementados con distintas dosis de alimentos lograron g.d.p. superiores a los 450gr/día. En cuanto a la altura a la cruz, la mayor alzada se logró con el tratamiento de 6gr de FES por Kg de peso, así, los animales reportaron una altura de 85cm (Tratamiento L/F/6grFES), 83,1cm (Tratamiento L/F/6grBalanceado), 83,2cm (Tratamiento L/F/9grFES) y 82,3cm en el grupo Control.

Palabras clave: Activación ruminal, altura a la cruz, desarrollo ruminal, fermentación en estado sólido, ganancia diaria de peso.

Evaluation of some productive parameters in calves feed with a diet obtained by fermentation in solid state (FSE) potato-carrot

Abstract

The objective of the present investigation was to determine the behavior of some zootechnical parameters in calves subjected to different inclusions of potato-carrot solid-state fermentation SSF and at the same time the effect of SSF inclusions on ruminal development in calves. For this, four groups of animals were established, each consisting of 4 calves (crosses with Holstein); the control treatment is supplied with milk + fodder; treatment M / F / 6grSSF (milk + forage + 6gr of SSF per kg of weight); treatment M / F / 6grBalanc (milk + forage + 6gr of balanced feed per kg of weight); treatment M / F / 9grSSF (milk + forage + 9gr of SSF per kg of weight). The variables to be evaluated were: weight gain, height at the withers, consumption and ruminal development. The experimental time was 8 weeks, starting the research from the second week of life of the calves. At the end of the experimental period, the animals that received supplementation with 6gr of SSF (M / F / 6grSSF) and 6gr of Balanced (M / F / 6grBalanced), reached a statistically higher final weight ($p < 0.05$) in relation to the animals of the Control group. The greatest weight gain during the study time was obtained with the M / F / 6grSSF diet, with a value of 23.25 kg in the 8 weeks of experimentation, with a daily weight gain of 603.6 gr / day in the last weighing; followed by the group M / F / 6grBalanced with 469.6gr and the group M / F / 9grSSF with 462.5gr / day. For the average daily gain, it is observed that in animals supplemented with different doses of food they attained daily weight gain higher than 450gr / day. As for the height at the withers, the highest elevation was achieved with the treatment of 6gr of SSF per Kg of weight, thus, the animals reported a height of 85cm (Treatment M / F / 6grSSF), 83.1cm (Treatment M / F / 6grBalanced), 83.2cm (Treatment M / F / 9grSSF) and 82.3cm in the Control group.

Keywords: Ruminal activation, height at the withers, ruminal development, solid-state fermentation, daily weight gain.

Efecto del Polen Apícola como Aditivo Funcional sobre Parámetros Productivos en Pollo de Engorde*

Lina Marcela Ríos Peña¹, Ana Milena Sierra Suárez¹, Daniel Rodríguez-Aguilar²

¹Zootecnistas. ²Zootecnista, MSc. Producción Animal, Universidad Nacional de Colombia-sede Bogotá.

*Trabajo para optar por título de Zootecnista en la Universidad Industrial de Santander-sede Málaga.

Resumen

Actualmente el alimento representa entre un 65 a 75% de los costos de producción, donde las materias primas como el maíz y la torta de soya son importadas y dependientes del mercado internacional, afectando la rentabilidad del sistema productivo. De otra parte, es importante buscar aditivos de origen natural propios del país, que ocasionen un efecto positivo en la productividad, mejoren los parámetros productivos o la salud de las aves. El polen apícola ha demostrado mejorar parámetros productivos, respuesta inmune y antioxidante al ser un antibiótico activo, antiparasitario y antimicrobiano. Este estudio evaluó el efecto de la inclusión del polen de abeja como aditivo funcional en un sistema de alimentación para pollo de engorde. Se utilizaron 200 pollitos mixtos (línea Ross 308) de un día de edad, se asignaron aleatoriamente a cuatro tratamientos (5 réplicas y 10 animales por replica) con tres niveles de inclusión de polen (T0: tratamiento testigo, T1: 0.5% polen de abeja, T2: 1.0% polen de abeja, T3: 1.5% polen de abeja). Se realizó una alimentación por fases: inicio (día 1-21), levante (día 22-35) y engorde (día 36-42), respectivamente. Se utilizó un diseño completamente al azar, separando las medias con una prueba de Tukey ($p<0.05$). Se evaluaron parámetros e indicadores productivos como: peso corporal, ganancia de peso, consumo acumulado, conversión acumulada, supervivencia, FEE, EA, IP los días 28 y 42 de edad. No se presentaron diferencias significativas ($p<0.05$) entre los tratamientos experimentales para los parámetros productivos al día 28 de edad. Al día 42 de edad, los niveles de inclusión de polen al 0.5% y 1.5% mostraron el mejor desempeño productivo frente

al control y polen 1.0% con excepción de la supervivencia (prueba Kruskal Wallis) e indicadores productivos los cuales no presentaron diferencias significativas entre los tratamientos ($p<0.05$). En el análisis económico el control y polen 0.5% obtiene los mejores ingresos frente al polen 1.5% y 1.0%. Se concluye que la inclusión de polen al 0.5% mejora parámetros productivos y obtiene un buen ingreso económico, convirtiéndose en una alternativa viable en la alimentación para pollos de engorde.

Palabras clave: Alimentación animal, desempeño productivo, avicultura.

Effect of Bee Pollen as Functional Additive to Broiler Chicken Production Parameters

Abstract

Currently food represents between 65 to 75% of production costs, where raw materials such as corn and soybean cake are imported and dependent on the international market, affecting the profitability of the production system. On the other hand, it is important to look for natural additives from the country, which have a positive effect on productivity, improve the productive parameters or the health of the birds. Bee pollen has been shown to improve productive parameters, immune response and antioxidant to be an active antibiotic, antiparasitic and antimicrobial. This study evaluated the effect of the inclusion of bee pollen as a functional additive in a feed system for broiler chicken. We used 200 mixed chicks (Ross 308 line) of one day of age, were randomly assigned to four treatments (5 replicates and 10 animals per replica) with three levels of pollen inclusion (T0: control treatment, T1: 0.5% pollen from bee, T2: 1.0% bee pollen, T3: 1.5% bee pollen). Feeding was performed by phases: onset (day 1-21), up (day 22-35) and fattening (day 36-42), respectively. A completely randomized design was used, separating the means with a Tukey test ($p < 0.05$). Parameters and productive indicators were evaluated such as: body weight, weight gain, cumulative consumption, cumulative conversion, survival, FEE, EA, IP (*acronyms from Spanish*) on days 28 and 42 of age. There were no significant differences ($p < 0.05$) between the experimental treatments for the productive parameters at day 28 of age. At day 42 of age, pollen inclusion levels at 0.5% and 1.5% showed the best productive performance against control and 1.0% pollen with the exception of survival (Kruskal Wallis test) and productive indicators which did not show significant differences between treatments ($p < 0.05$). In the economic analysis the control and pollen 0.5% obtain the best income against pollen 1.5% and 1.0%. It is concluded that the inclusion of pollen at 0.5% improves productive parameters and obtains a good economic income, becoming a viable alternative in feeding for broiler chickens.

Keywords: Animal feeding, productive performance, poultry farming.



Evaluación productiva de cuyes (*Cavia porcellus*) suplementados con harina de follajes arbóreos de zona semidesértica

José E. Apráez Guerrero¹ Zoot PhD, Daniela Urbano Solarte², Santiago Astudillo Sánchez²

Profesor, Departamento de Producción y Procesamiento Animal, Universidad de Nariño, Pasto, Colombia. earpaez@exalumno.unam.mx. ²Estudiantes de Zootecnia, Universidad de Nariño, Pasto, Colombia. dany-1394@hotmail.com, astudillo927@hotmail.com

Resumen

La investigación se desarrolló en la Granja Experimental Botana, ubicada en el municipio de Pasto, Nariño. Se evaluó el comportamiento productivo de cuyes (*Cavia porcellus*) suplementados con harina de follaje de Guácimo (*Guazuma ulmifolia* Lam) y Payandé (*Pithecellobium lanceolatum* Willd). Se utilizaron 80 machos con peso aproximado de 250 g, distribuidos en 4 tratamientos con cuatro réplicas de 5 animales cada una. Previamente se cosecho, deshidrató y molió el follaje. Se determinó su contenido nutricional y antinutricional y se incorporó a los suplementos. Los tratamientos fueron: forraje más suplemento comercial (T0); forraje más suplemento con harina de *G. ulmifolia* (T1), forraje más suplemento con *P. lanceolatum* (T2), forraje más suplemento con *G. ulmifolia* y *P. lanceolatum* (T3). El contenido de proteína varió entre 23.39 y 30.3%, y la fibra bruta entre 19.31 y 33.8% para las harinas de *G. ulmifolia* y *P. lanceolatum* respectivamente. Se encontró presencia de fenoles en las dos especies. El consumo de materia seca fue similar entre tratamientos ($p > 0.05$), oscilo entre 40.33 y 45.08 g/día en levante y 68.81 a 73.61 g/día en ceba. La ganancia de peso en levante fue 11.2, 9.1, 7.8 y 8.9 g/d para T0, T1, T2 y T3 respectivamente, con diferencias entre T0 y los demás tratamientos ($p < 0.05$). Se encontraron ganancias de peso mayores ($p > 0.05$) en T1 y T2 10.9, 11.3 g/d respectivamente en ceba. La conversión alimenticia en levante fue de 4.0, 4.7, 5.5 y 4.6 para T0, T1, T2 y T3 respectivamente, con diferencias ($p < 0.05$) a favor de T0; en ceba se observaron mejores conversiones ($p > 0.05$) con *G. ulmifolia* (6.2). Los rendimientos en canal fueron de 73.14, 72.73,

72.11 y 72.52 para T0, T1, T2 y T3. La mortalidad osciló entre el 2 a 5% y los costos parciales fueron menores en los suplementos con harina de *P. lanceolatum*. Se concluye que el *G. ulmifolia* puede utilizarse en alimentación de cuyes y *P. lanceolatum* requiere ser mezclada, pues su contenido fenólico limita su uso en monogástricos herbívoros.

Palabras clave: Suplemento, follaje, alimentación, cuyes, nutricional, silvopastoril.

Productive evaluation of guinea pigs (*Cavia porcellus*) supplied with foliage meal in semidesert zone**Abstract**

The research was carried out at Botana Experimental Farm, located in the municipality of Pasto, Nariño. The productive behavior of guinea pigs (*Cavia porcellus*) supplemented with Guácimo foliage meal (*Guazuma ulmifolia Lam*) and Payandé (*Pithecellobium lanceolatum Willd*) was evaluated. We used 80 males weighing approximately 250 g, distributed in 4 treatments with four replicates of 5 animals each. Previously it was harvested, dehydrated and ground the foliage. Its nutritional and antinutritional content was determined and it was incorporated into the supplements. The treatments were: forage plus commercial supplement (T0); forage plus supplement with flour of *G. ulmifolia* (T1), forage plus supplement with *P. lanceolatum* (T2), forage plus supplement with *G. ulmifolia* and *P. lanceolatum* (T3). The protein content varied between 23.39 and 30.3%, and the crude fiber between 19.31 and 33.8% for the flours of *G. ulmifolia* and *P. lanceolatum* respectively. Phenols were found in both species. Dry matter consumption was similar between treatments ($p > 0.05$), oscillography between 40.33 and 45.08 g / day in the east and 68.81 to 73.61 g / day in fattening. The weight gain in the Levant was 11.2, 9.1, 7.8 and 8.9 g / d for T0, T1, T2 and T3 respectively, with differences between T0 and the other treatments ($p < 0.05$). Greater weight gains ($p > 0.05$) were found in T1 and T2 10.9, 11.3 g / d respectively in fattening. The feed conversion was 4.0, 4.7, 5.5 and 4.6 for T0, T1, T2 and T3 respectively, with differences ($p < 0.05$) in favor of T0; in fattening, better conversions were observed ($p > 0.05$) with *G. ulmifolia* (6.2). The carcass yields were 73.14, 72.73, 72.11 and 72.52 for T0, T1, T2 and T3. Mortality ranged from 2 to 5% and partial costs were lower in supplements with *P. lanceolatum* meal. It is concluded that *G. ulmifolia* can be used in guinea pig feeding and *P. lanceolatum* needs to be mixed, because its phenolic content limits its use in monogastric herbivores.

Keywords: Supplement, foliage, feeding, guinea pigs, nutritional, silvopastoril.

Efecto de una dieta FES sobre los parámetros productivos, valores hematológicos y morfometría intestinal en gallinas ponedoras

Deisy Carolina Cala Guerrero¹, Luis Miguel Borrás Sandoval², Gabriel Fernando Saavedra Montañez³

¹Investigador, Grupo de Investigación en Bioquímica y Nutrición Animal, Facultad de ciencias Agropecuarias, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Tunja, Colombia. deisycala_186@hotmail.com. ²Docente

Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Coordinador Grupo de Investigación en Bioquímica y Nutrición Animal – PhD. Tunja, Colombia. luis.borras@uptc.edu.co. ³Investigador, Grupo de Investigación en Bioquímica y Nutrición Animal, Facultad de ciencias Agropecuarias, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Tunja, Colombia. gafesamo@gmail.com

Resumen

La producción avícola a nivel nacional ha experimentado un crecimiento rápido relacionado con los avances genéticos, de manejo y nutrición, mejorando la oferta y facilitando el acceso al consumo de huevo, considerado uno de los alimentos esenciales y económicos de la alimentación humana. Así mismo, el crecimiento constante de la población humana mundial ha obligado al sector agropecuario a aumentar los niveles de producción. Se hace necesaria la utilización de estrategias que permitan mejorar la rentabilidad del sistema disminuyendo los costos de producción sin que se vean afectados los parámetros productivos. Como estrategia de origen nutricional se ha propuesto la utilización de residuos agrícolas que sometidos a procesos de fermentación en estado sólido (FES) aumentan su valor nutritivo. El principal objetivo es evaluar el efecto de la utilización de un alimento FES en gallinas ponedoras identificando como se pueden ver afectados los índices productivos antes de llegar al pico de producción; así mismo dar a conocer los cambios que se puedan presentar a nivel intestinal y sanguíneo. El estudio estará dividido en dos fases, la primera en el Laboratorio de Nutrición Animal de la Uptc realizando el análisis de la calidad composicional del alimento FES evaluando parámetros como pH, proteína cruda, cenizas, humedad, fibra cruda y materia seca. La segunda fase será en la granja avícola el

Fiscal ubicada en Duitama, se utilizará un diseño completamente al azar con tres tratamientos: T1: alimento comercial, T2: 15% y T3:30% de inclusión de alimento FES. Se evaluarán parámetros productivos: porcentaje de producción, peso del huevo, ganancia de peso, cambios en la morfología y la integridad de la mucosa intestinal, así como variaciones en los valores hematológicos de las aves; se realizará un análisis de varianza (ANOVA) para determinar las posibles diferencias estadísticas entre tratamientos y prueba de comparación de promedios de Tukey 5%. Se espera que el valor nutricional de alimento obtenido mediante un proceso de fermentación en estado sólido incremente el valor de proteína cruda, realizado por microorganismos principalmente bacterias acido lácticas. La sustitución parcial del alimento comercial por FES permite evidenciar una disminución en los costos de producción manteniendo los parámetros productivos.

Palabras clave: Fermentación, bacterias, nutrición, morfometría

Effect of a SSF diet on the productive parametres, hematological values and intestinal morphometry in laying hens**Abstract**

Poultry production at a national level has experienced rapid growth related to genetic advances, management and nutrition, improving supply and facilitating access to egg consumption, considered one of the essential and economic foods of human nutrition. Likewise, the constant growth of the world's human population has forced the agricultural sector to increase production levels. It is necessary to use strategies to improve the profitability of the system by reducing production costs without affecting the production parameters. As a strategy of nutritional origin, it has been proposed the use of agricultural residues that undergo processes in solid-state fermentation (SSF) increase their nutritional value. The main objective is to evaluate the effect of the use of an SSF feed on laying hens identifying how productive indices may be affected before reaching the production peak; also make known the changes that may occur at the intestinal and blood levels. The study will be divided into two phases, the first in the Animal Nutrition Laboratory of the Uptc, performing the analysis of the compositional quality of the SSF food, evaluating parameters such as pH, crude protein, ash, moisture, crude fiber and dry matter. The second phase will be at the Fical poultry farm located in Duitama, using a completely randomized design with three treatments: T1: commercial feed, T2: 15% and T3: 30% inclusion of SSF feed. Productive parameters will be evaluated: percentage of production, egg weight, weight gain, changes in the morphology and integrity of the intestinal mucosa, as well as variations in the hematological values of the birds; an analysis of variance (ANOVA) will be carried out to determine the possible statistical differences between treatments and comparison test of Tukey 5% averages. It is expected that the nutritional value of food obtained through a fermentation process in solid state will increase the value of crude protein, made by microorganisms, mainly lactic acid bacteria. The partial substitution of commercial

feed by SSF allows showing a decrease in production costs while maintaining the productive parameters.

Keywords: Fermentation, bacteria, nutrition, morphometry.

Evaluación del comportamiento metabólico asociado a la suplementación energética en vacas lecheras de trópico alto

Diana Milena David M¹; Rómulo Campos Gaona²; Lesvy Ramos³ José Edmundo Apráez⁴; Mauricio Vélez Terranova⁵; Gema Lucia Zambrano B⁶.

¹MSc, Universidad Nacional de Colombia - Sede Palmira, Palmira, Colombia. dmdavidm@unal.edu.co. ²Docente, MSc. Universidad de Nariño. Pasto, Colombia. lesvyramos@yahoo.com. ³Profesor Titular, DSc. Universidad Nacional de Colombia – Sede Palmira. Palmira, Colombia. rcamposeg@unal.edu.co. ⁴Profesor Titular, PhD. Universidad de Nariño. Pasto, Colombia. eaprarez@gmail.com. ⁵Docente, PhD. Universidad Nacional de Colombia – Sede Palmira. Palmira, Colombia. ovelez@unal.edu.co. ⁶MSc., Universidad Nacional de Colombia – Sede Palmira. Palmira, Colombia. mitugema@hotmail.com

Resumen

Se ha observado que las ganaderías de leche del departamento de Nariño presentan problemas nutricionales, especialmente en el periodo de transición y la lactancia temprana, a causa del desbalance energético presente en las dietas ofrecidas; provocando con ello deficiencias en la actividad productiva y reproductiva de las vacas. Dadas estas razones, el principal objetivo de este proyecto fue estudiar el comportamiento metabólico en el período de transición y lactancia temprana en vacas de leche suplementadas con grasa sobrepasante en el trópico alto de Nariño. Para ello, se seleccionaron 21 animales de la raza Holstein x Simmental, de segundo y tercer parto. Estos se distribuyeron en tres tratamientos de siete animales cada uno. El tratamiento control (T1) recibió una dieta base (forraje + concentrado) sin suplemento graso, el tratamiento dos (T2) la dieta base más 250 g/día de grasa sobrepasante y el tratamiento tres (T3) la dieta base más 250 g/día de grasa sobrepasante enriquecida con omega tres. El periodo experimental abarcó desde el día 15 preparto al día 105 de lactancia, se colectaron muestras de sangre con 15 días de intervalo, para evaluar el comportamiento metabólico mediante determinación sérica de: los ácidos grasos no esterificados (NEFA), el betahidroxibutirato (BHB), el colesterol, los triglicéridos, la glucosa, las proteínas totales, la albumina, el nitrógeno

ureico sanguíneo (BUN) y las globulinas. Adicionalmente, se determinó la condición corporal de cada hembra en evaluación. Los resultados indicaron no haber incidencia de los tratamientos establecidos sobre la evaluación metabólica y su relación con la condición corporal. Al evaluar el comportamiento metabólico durante el periodo experimental, se observó que los indicadores metabólicos energéticos no presentaron cambios, indicando un adecuado suministro de energía en la dieta para la ganadería evaluada; sin embargo, al evaluar los metabolitos asociados al metabolismo nitrogenado, se observaron diferencias en proteína, sugiriendo un desbalance energético-proteico de la dieta ofrecida. Por otra parte, los valores encontrados en las variables, constituyen datos de referencia sobre el comportamiento y las condiciones nutricionales de las ganaderías de lechería especializada en la región Nariñense.

Palabras clave: Balance energético, grasa, suplemento nutricional.

Agradecimientos

A la Vicerrectoría de Investigaciones, Postgrados y Relaciones Internacionales – VIPRI de la Universidad de Nariño, Convocatoria Docente 2016.

Metabolic behavior evaluation associated with energy supplementation in dairy cows of the high tropic

Abstract

It has been observed that the dairy farms of the department of Nariño present nutritional problems, especially in the period of transition and early lactation, because of the energy imbalance present in the diets offered; causing deficiencies in the productive and reproductive activity of the cows. Given these reasons, the main objective of this project was to study the metabolic behavior in the transition period and early lactation in milk cows supplemented with fat surpassing in the high tropic of Nariño. For this, 21 animals of the Holstein x Simmental breed, of second and third calving were selected. These were distributed in three treatments of seven animals each. The control treatment (T1) received a base diet (forage + concentrate) without fat supplement, treatment two (T2) the base diet plus 250 g / day of fat excess and treatment three (T3) the base diet plus 250 g / day of fat overpassing enriched with omega three. The experimental period ranged from day 15 antepartum to day 105 of lactation, blood samples were collected with 15 days of interval, to evaluate the metabolic behavior by means of serum determination of: non-esterified fatty acids (NEFA), beta-hydroxybutyrate (BHB), cholesterol, triglycerides, glucose, total proteins, albumin, blood urea nitrogen (BUN) and globulins. Additionally, the body condition of each female in evaluation was determined. The results indicated that there was no incidence of the established treatments on the metabolic evaluation and its relation with the corporal condition. When evaluating the metabolic behavior during the experimental period, it was observed that the energy metabolic indicators did not present changes, indicating an adequate supply of energy in the diet for the evaluated livestock; However, when evaluating the metabolites associated with nitrogen metabolism, differences in protein were observed, suggesting an energy-protein imbalance of the diet offered. On the other hand, the values found in the variables constitute reference data on the behavior

and nutritional conditions of specialized dairy farms in the Nariñense region.

Keywords: Negative energy, fat, nutritional supplement.

Comportamiento productivo de hembras gestantes *Cavia porcellus* bajo diferentes aportes de proteína y energía

Diana María Ortiz Rueda¹, Paula Andrea Escobar Zambrano², Juan Fernando Urbano González³.

¹Zootecnia MSc, Centro Internacional de Producción Limpia – Lope. dianaortiz712@gmail.com. ²Zootecnia, Centro Internacional de Producción Limpia – Lope. paula_andrea9001@hotmail.com. ³Zootecnia Esp., Centro Internacional de Producción Limpia – Lope. jfurbano@misena.edu.co

Resumen

La producción de cuyes es de gran interés en el departamento de Nariño por ser la fuente de ingresos de familias campesinas, quienes aprovechan espacios reducidos para su crianza. Por esta razón, es necesario mejorar algunas prácticas que permitan obtener mayores rendimientos. Entre ellas se encuentra la formulación de alimentos balanceados, ya que se cuenta con información desactualizada y no se consideran los requerimientos nutricionales de cada fase productiva. El objetivo de esta investigación es evaluar el comportamiento productivo de hembras gestantes *Cavia porcellus*, bajo diferentes aportes de energía y proteína. El estudio se realizará en el Centro Internacional de Producción Limpia -Lope de la ciudad de Pasto (Nariño). Se utilizarán 108 hembras y 36 machos alojados en jaulas. Los tratamientos serán: T1: 60% forraje + 40% suplemento (16% proteína y 2800 Kcal); T2: 60% forraje + 40% suplemento (18% proteína y 3000 Kcal); T3: 60% forraje + 40% suplemento (20% proteína y 3200 Kcal); T4: 70% forraje + 30% suplemento (16% proteína y 2800 Kcal); T5: 70% forraje + 30% suplemento (18% proteína y 3000 Kcal); T6: 70% forraje + 30% suplemento (20% proteína y 3200 Kcal); T7: 80% forraje + 20% suplemento (16% proteína y 2800 Kcal); T8: 80% forraje + 20% suplemento (18% proteína y 3000 Kcal); T9: 80% forraje + 20% suplemento (20% proteína y 3200 Kcal). Las variables a evaluar serán: consumo de materia seca, tamaño de camada al nacimiento, fertilidad, mortalidad y pesos al cruzamiento y parto; se empleará un diseño completamente aleatorizado, para el análisis de los datos. Como resultado, se

espera identificar la dieta con los mejores parámetros productivos con el fin de desplegar nuevas investigaciones en esta área.

Palabras clave: Alimentación, cuy, consumo.

Productive behavior of pregnant females *Cavia porcellus* under different contributions of protein and energy

Abstract

The production of guinea pigs is of great interest in the department of Nariño as it is the source of income for peasant families, who take advantage of small spaces for their upbringing. For this reason, it is necessary to improve some practices that allow obtaining higher yields. Among them is the formulation of balanced foods, since there is outdated information and the nutritional requirements of each productive phase are not considered. The objective of this research is to evaluate the productive behavior of pregnant *Cavia porcellus* females, under different energy and protein inputs. The study will be carried out at the International Clean Production Center-Lope in the city of Pasto (Nariño). It will be used 108 females and 36 males housed in cages. The treatments will be: T1: 60% forage + 40% supplement (16% protein and 2800 Kcal); T2: 60% forage + 40% supplement (18% protein and 3000 Kcal); T3: 60% forage + 40% supplement (20% protein and 3200 Kcal); T4: 70% forage + 30% supplement (16% protein and 2800 Kcal); T5: 70% forage + 30% supplement (18% protein and 3000 Kcal); T6: 70% forage + 30% supplement (20% protein and 3200 Kcal); T7: 80% forage + 20% supplement (16% protein and 2800 Kcal); T8: 80% forage + 20% supplement (18% protein and 3000 Kcal); T9: 80% forage + 20% supplement (20% protein and 3200 Kcal). The variables to be evaluated will be: dry matter consumption, litter size at birth, fertility, mortality and weights at crossing and parturition; a completely randomized design will be used for the analysis of the data. As a result, it is expected to identify the diet with the best productive parameters in order to deploy new research in this area.

Keywords: Feeding, guinea pig, consumption.

Evaluación de parámetros nutricionales en siete genotipos de sorgo forrajero (*Sorghum vulgare*) en Yopal, Casanare

Diana Katherinne Rios Moyano¹; Abelardo Conde Pulgarin²; Jeincy Camargo Torres³; Diana Obregón Corredor⁴.

¹Docente Programa de Ingeniería Agronómica. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad de La Salle. Correo electrónico: dkrios@unisalle.edu.co. ²Docente Programa de Zootecnia. Facultad de Ciencias Agropecuarias.

Universidad de La Salle. Correo electrónico: aconde@unisalle.edu.co. ³Egresada Programa de Zootecnia. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad de La Salle. ⁴Estudiante Doctorado. Department of Entomology, Cornell University, Ithaca, NY. Correo electrónico:

do265@cornell.edu.co.

Resumen

El sorgo forrajero (*Sorghum vulgare*) es un cultivo que se ha desarrollado en el país como alternativa de alimentación animal en los sistemas de producción bovina, del cual se destaca su uso para pastoreo directo, forraje de corte en fresco o ensilado; se destaca su buena adaptación en ambientes de sequía, normalmente limitantes para otros tipos de forraje. El ensayo tuvo como objetivo evaluar parámetros nutricionales de siete genotipos de sorgo forrajero en tres momentos de corte diferentes; éste se realizó en la universidad de La Salle Campus Utopía, en la ciudad de Yopal-Casanare a 256 m.n.s.m., con los genotipos comerciales Pampa verde BMR-6, JJT-18, ABS-7000, 600 D, Africano, Pampa verde y Pampa verde Centurión, cada uno de los cuales fue cosechados en tres momentos diferentes 70, 80 y 90 días después de la siembra (DDS). Se utilizó un diseño factorial 7 x 3, el primer factor es genotipo y el segundo momentos de corte, en campo se establecieron cuatro bloques, donde la unidad experimental estaba constituida por seis surcos de 5 metros de largo con una separación de 0,7 m entre surco. Los genotipos fueron sembrados grano a grano cada 0,1 m y raleados a 11 plantas por metro lineal posterior a la emergencia de las plantas. En cada momento de corte se realizó un análisis bromatológico completo determinando cenizas, materia seca (MS), proteína (PT%) fibra en detergente neutro (FDN), fibra en detergente ácido (FDA) y extracto etéreo (EE). El análisis de varianza para

muestra que para las fuentes de variación DDS y genotipo x DDS existen diferencias en todas las variables evaluadas, en genotipos se presentan diferencias significativas en todas las variables excepto para NIDA. El mayor contenido de PT lo tiene 600D 9,48% alcanzando un máximo de 12.11% a los 70 DDS, cuenta con los contenidos mas altos de FDN (66,51 %), Pampa verde cuenta con los niveles mas bajos de EE (1,86%). De acuerdo con los resultados se concluye que el momento de corte y la variedad de sorgo elegida tienen una influencia directa sobre la calidad nutricional del sorgo forrajero sembrado en Yopal-Casanare.

Palabras clave: Sorgo forrajero, calidad nutricional, alimentación bovina.

Agradecimientos

A la Universidad de la Salle por la financiación del proyecto dentro de la convocatoria interna realizada por la Vicerrectoría de Investigación y Transferencia. Al Semillero de Investigación en cereales y leguminosas del programa de Ingeniería Agronómica por su aporte de trabajo en campo, al personal de laboratorios de nutrición animal de la Universidad de La Salle y a los estudiantes del programa de Ingeniería Agronómica de la línea productiva de cereales y leguminosas del Proyecto Utopía de La Salle por su aporte en el proyecto.

Nutritional evaluation in seven genotypes of forage sorghum (*Sorghum vulgare*) in Yopal-Casanare**Abstract**

Sorghum forage sorghum (*Sorghum vulgare*) is a crop that has been developed in the country as an alternative animal feed in bovine production systems, of which it stands out its use for direct grazing, fresh cut forage or silage; its good adaptation in drought environments, normally limiting for other types of forage, is highlighted. The objective of the trial was to evaluate nutritional parameters of seven forage sorghum genotypes at three different cutting moments; This was carried out at the University of La Salle Campus Utopia, in the city of Yopal-Casanare at 256 mnsm, with the commercial genotypes Pampa green BMR-6, JJT-18, ABS-7000, 600 D, African, Pampa Verde and Pampa Centurion green, each of which was harvested at three different times 70, 80 and 90 days after sowing (DAS). We used a factorial design 7 x 3, the first factor is genotype and the second moments of cut, in the field four blocks were established, where the experimental unit consisted of six rows of 5 meters long with a separation of 0.7 m between furrows. The genotypes were planted grain by grain every 0.1 m and thinned to 11 plants per linear meter after emergence of the plants. At each time of cut, a complete bromatological analysis was carried out determining ash, dry matter (DM), protein (PT%) fiber in neutral detergent (FND), fiber in acid detergent (FAD) and ether extract (EE). The analysis of variance for sample that for the sources of variation DAS and genotype x DAS there are differences in all the evaluated variables, in genotypes there are significant differences in all the variables except for NIDA. The highest content of PT has 600D 9.48% reaching a maximum of 12.11% at 70 DAS, has the highest contents of FND (66.51%), Pampa green has the lowest levels of EE (1, 86%). According to the results, it is concluded that the cutting moment and the sorghum variety chosen have a direct influence on the nutritional quality of the forage sorghum planted in Yopal-Casanare.

Keywords: Forage sorghum, nutritional quality, cows feeding.

Análisis nutricional de polen congelado colectado en el municipio de Viracachá, Boyacá

Diana A. Turca-Cárdenas; Adriana del P. Aguilar-Vargas.; Julio C. Vargas-Abella; Roy J. Andrade-Becerra.

Grupo de Investigación en Producción Animal del Trópico Alto Colombiano (GIPATRACOL), Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. diana.turca@uptc.edu.co; julio.vargas@uptc.edu.co

Resumen

El polen es considerado un alimento especial con efectos potenciadores en la salud por sus propiedades terapéuticas, como antibacterianas, fungicidas, antineoplásicas, antidiarreicas y sus efectos inmunomoduladores, razones que han llamado la atención de los consumidores y se ha difundido su demanda e inclusión en la dieta humana en la actualidad. El polen presenta en su composición nutricional, proteínas, lípidos, azúcares, fibras, sales minerales, aminoácidos y vitaminas, además de sustancias con propiedades farmacológicas como las anteriormente mencionadas. En el mercado nacional el polen se comercializa como polen seco, proceso que consiste en someter dicho producto por largos períodos de tiempo a ciertas temperaturas para de esta forma disminuir su humedad y poder preservarlo mucho más, al someterlo a este proceso, las proteínas presentes en el polen tienden a alterarse y desnaturalizarse, perdiendo así las propiedades ya antes sugeridas. El objetivo del presente estudio es determinar la composición nutricional del polen en condiciones de congelación para compararlo con estudios realizados a polen seco de la misma región. Para el desarrollo de este análisis se realiza el muestreo de 5 apiarios ubicados en el municipio de Viracachá, de donde se toman muestras de polen de 5 colmenas escogidas aleatoriamente, estas posteriormente serán juntadas y mezcladas, para luego ser llevadas al análisis bromatológico.

Palabras clave: Polen, proteínas, polen congelado, polen seco, antioxidantes, humedad, bromatológico.

Nutritional analysis of frozen pollen collected in the municipality of Viracachá, Boyacá**Abstract**

Pollen is considered a special food with health enhancing effects due to its therapeutic properties, such as antibacterial, fungicide, antineoplastic, antidiarrheal and its immunomodulatory effects, reasons that have attracted the attention of consumers and have spread its demand and inclusion in the human diet today. Pollen presents in its nutritional composition, proteins, lipids, sugars, fibers, mineral salts, amino acids and vitamins, as well as substances with pharmacological properties such as those mentioned above. In the national market, pollen is marketed as dry pollen, a process that consists of subjecting said product for long periods of time to certain temperatures in order to reduce its humidity and preserve it much more, by subjecting it to this process, the proteins present in Pollen tend to be altered and denatured, thus losing the properties already suggested. The objective of the present study is to determine the nutritional composition of pollen under freezing conditions to compare it with studies conducted with dry pollen from the same region. For the development of this analysis the sampling of 5 apiaries located in the municipality of Viracachá is carried out, where pollen samples are taken from 5 randomly selected hives, these will later be collected and mixed, and then taken to the bromatological analysis.

Keywords: Pollen, proteins, frozen pollen, dry pollen, antioxidants, humidity, bromatological.

Ensilaje de naranja como suplemento alimenticio y su efecto sobre la composición de la leche caprina

Dixon Fabián Flórez Delgado¹, Alfonso Eugenio Capacho Mogollón², Sandra Milena Quintero Muiño³, Karen Yelitza Gamboa Vera⁴

¹Zootecnista, Magíster en Sistemas Sostenibles de Producción. Docente tiempo completo ocasional, Universidad de Pamplona. Pamplona, Norte de Santander, Colombia. dixon.flerez@unipamplona.edu.co; ²Zootecnista, Magíster en Calidad de la Educación Superior. Docente tiempo completo, Universidad de Pamplona. Pamplona, Norte de Santander, Colombia.

aecapacho@unipamplona.edu.co; ³Zootecnista, Especialista en Nutrición Animal Sostenible. Docente tiempo completo ocasional, Universidad de Pamplona. Pamplona, Norte de Santander, Colombia.

sandra.quintero@unipamplona.edu.co, ⁴Estudiante Programa de Zootecnia. Universidad de Pamplona. Pamplona, Norte de Santander, Colombia. karen-0126@hotmail.com

Resumen

Una de las principales desventajas de la producción de leche caprina, deriva del elevado costo por concepto de suplementación basada en alimentos comerciales, lo cual hace necesario explorar otras alternativas de alimentación. El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto del ensilaje de naranja (EN) sobre la calidad de la leche caprina en la Granja Experimental Villa Marina de la Universidad de Pamplona. Una primera fase consistió en validar la calidad nutricional del EN evaluando fermentaciones de 21, 30 y 45 días, bajo un diseño de bloques completos aleatorizados con cuatro réplicas. Se aplicaron pruebas de estadística descriptiva y ANOVA mediante la prueba LSDFisher ($p<0.05$) encontrando diferencias significativas para pH con 3,63 en el tratamiento 1; materia seca y proteína con 14,50% y 9,15% respectivamente para el tratamiento 2. Para los parámetros nutricionales de cenizas, grasa y fibra se obtuvo un comportamiento similar durante los días de almacenamiento, determinando de esta manera, que 30 días fue el mejor periodo de fermentación. La segunda fase, consistió en evaluar los parámetros de calidad de la leche caprina: grasa, proteína, sólidos no grasos, minerales, densidad y lactosa, con la suplementación con EN a 12 caprinos, teniendo en cuenta dos tratamientos:

250g y 500g, un testigo y cuatro réplicas, empleado el equipo Julie C3 Scope Electric semanalmente durante un periodo experimental de 60 días. Se aplicaron pruebas de estadística descriptiva, comparación de medias mediante la prueba de Tukey, encontrando diferencia significativa ($P<0,05$) para grasa en el tratamiento 1 con 5,25% y proteína y sólidos minerales en el tratamiento 2, con medias de 3,99% y 0,86% respectivamente. Para los demás parámetros se obtuvo valores similares, permitiendo concluir que la inclusión de EN como suplemento alimenticio es una alternativa nutricional que mejora algunas características de calidad de la leche caprina. Se estimó el costo de producción de EN en \$348,11 por kg. Para los costos de suplementación por litro de leche producido, se obtuvo un valor de \$ 85,59 para el Tratamiento 1 y de \$ 171,90 para el Tratamiento 2. La producción de leche no evidenció diferencias significativas entre los tratamientos y el testigo.

Palabras claves: fermentación anaeróbica, leche de cabra, naranja, nutrición animal, producción lechera.

Agradecimientos

A la Universidad de Pamplona y a la Vicerrectoría de Investigaciones por el apoyo dado al desarrollo del proyecto.

**Orange silage as a dietary supplement and its effect on the composition of goat milk****Abstract**

One of the main disadvantages of goat milk production derives from the high cost of supplementation based on commercial foods, which makes it necessary to explore other feeding alternatives. The objective of the present study was to evaluate the effect of orange silage (OS) on the quality of goat milk at the Villa Marina Experimental Farm of the University of Pamplona. A first phase consisted of validating the nutritional quality of OS by evaluating fermentations of 21, 30 and 45 days, under a design of randomized complete blocks with four replications. Descriptive statistics and ANOVA tests were applied using the LSDFisher test ($p < 0.05$), finding significant differences for pH with 3.63 in treatment 1; dry matter and protein with 14.50% and 9.15% respectively for treatment 2. For the nutritional parameters of ash, fat and fiber a similar behavior was obtained during the days of storage, determining in this way, that 30 days was the best fermentation period. The second phase consisted of evaluating the quality parameters of goat milk: fat, protein, non-fat solids, minerals, density and lactose, with OS supplementation to 12 goats, taking into account two treatments: 250g and 500g, a witness and four replicas, used by the Julie C3 Scope Electric team weekly during an experimental period of 60 days. Descriptive statistics tests were applied, comparison by means by the Tukey test, finding a significant difference ($P < 0.05$) for fat in treatment 1 with 5.25% and protein and mineral solids in treatment 2, with means of 3.99% and 0.86% respectively. For the other parameters, similar values were obtained, allowing concluding that the inclusion of OS as a nutritional supplement is a nutritional alternative that improves some characteristics of goat milk quality. The production cost of OS was estimated at \$ 348.11 per kg. For the supplementation costs per liter of milk produced, a value of \$ 85.59 was obtained for Treatment 1 and \$ 171.90 for Treatment 2. The milk production did not show significant differences between the treatments and the control.

Keywords: anaerobic fermentation, goat milk, orange, animal nutrition, milk production.

Estandarización del proceso de elaboración de saccharina rústica para alimentación animal

César Villamizar Quiñones¹, Dixon Fabián Flórez Delgado², Alfonso Eugenio Capacho Mogollón³, Yaneth Amparo Vera Lizarazo⁴, Luis Ernesto Quintero Rodríguez⁵.

¹Ingeniero Agrónomo, Magister en Ciencias Agropecuarias. Docente tiempo completo, Universidad de Pamplona. Pamplona, Norte de Santander.

csr.villamizar@unipamplona.edu.co; ²Zootecnista, Magister en Sistemas Sostenibles de Producción. Docente tiempo completo ocasional, Universidad de Pamplona. Pamplona, Norte de Santander, Colombia.

dixon.florez@unipamplona.edu.co; ³Zootecnista, Magister en Calidad de la Educación Superior. Docente tiempo completo, Universidad de Pamplona. Pamplona, Norte de Santander, Colombia. aecapacho@unipamplona.edu.co;

⁴Microbióloga, Doctor en Sanidad Animal y Reproducción. Docente tiempo completo, Universidad de Pamplona. Pamplona, Norte de Santander, Colombia.

yanedt.vera@unipamplona.edu.co; ⁵Médico Veterinario Zootecnista, Magister en Salud Pública. Docente hora cátedra, Universidad de la Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina. lquintero@fcv.unlp.edu.ar

Resumen

Son diversas las fuentes de alimentación utilizadas en las explotaciones pecuarias, dentro de los cuales se distingue el uso de pastos y forrajes, que por las condiciones del trópico en que se encuentra el país, su producción está influenciada, por la temperatura, precipitación y radiación solar, ocasionando excedentes de producción en épocas de lluvia y escasez en épocas de baja precipitación o veranos prolongados, afectando la producción y el comportamiento animal. Teniendo en cuenta que la alimentación representa el mayor porcentaje dentro de los costos totales de producción en una explotación pecuaria, es necesario buscar fuentes alternativas de buena calidad nutricional, fácil consecución y constante producción durante el año, que puedan ser utilizadas en la dieta de los animales ya sea como materia prima para la elaboración de concentrados o como suplemento alimenticio, que conlleven a mejorar la producción y productividad de la empresa pecuaria. La presente investigación se desarrolló en la Granja Experimental Villa Marina de la Universidad de Pamplona, durante el periodo comprendido entre los años 2014 y 2016. Para

estandarizar el proceso de producción de saccharina rústica para alimentación animal se empleó un diseño de bloques completos aleatorizados, con tres tratamientos (1%, 1.5% y 2% de urea más 0.5% de sal mineralizada), un testigo y cuatro repeticiones; se aplicó la prueba Tukey ($P>0.05$) para determinar diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos y el testigo. Se obtuvo un porcentaje de materia seca de 19 a 22%, para la fibra neutra y ácida un porcentaje que osciló entre 48 a 63% y 24 a 40% respectivamente; para estas variables no hubo diferencias estadísticamente significativas ($P>0.05$). La proteína, reportó diferencias significativas ($P<0.05$) de los tratamientos dos y tres, con un promedio de 14%, el contenido de cenizas, presentó los mejores valores en los tratamientos uno y dos con el 4.4 al 5.9%, siendo estadísticamente diferente ($P<0.05$). Para calcio y fósforo, el tratamiento uno fue superior estadísticamente ($P<0.05$) con valores de 0.29% y 0.18% respectivamente, la digestibilidad in vitro para el tratamiento tres, alcanzó el 56% y es estadísticamente diferente ($P<0.05$). El costo de producción por kilogramo de saccharina fue de \$ 328,35.

Palabras clave: Caña de azúcar, composición nutricional, nutrición animal, urea.

Agradecimientos

A la Universidad de Pamplona y a la Vicerrectoría de Investigaciones por el apoyo dado al desarrollo del proyecto.

**Standardization of the production process of rustic *saccharina* for animal feed****Abstract**

The sources of food used in livestock operations are diverse, within which the use of pastures and forages is distinguished, which due to the conditions of the tropics in which the country is located, and its production is influenced by temperature, precipitation and solar radiation, causing surplus production in times of rain and scarcity in times of low rainfall or prolonged summers, affecting production and animal behavior. Bearing in mind that food represents the highest percentage of total production costs in a livestock operation, it is necessary to look for alternative sources of good nutritional quality, easy procurement and constant production during the year, which can be used in the diet of the animals either as raw material for the preparation of concentrates or as a food supplement, which lead to improve the production and productivity of the livestock business. The present investigation was developed in the Villa Marina Experimental Farm of the University of Pamplona, during the period between 2014 and 2016. To standardize the production process of rustic *saccharina* for animal feed, a randomized complete block design was used, with three treatments (1%, 1.5% and 2% of urea plus 0.5% of mineralized salt), one control and four repetitions; Tukey test ($P > 0.05$) was applied to determine statistically significant differences between treatments and the control. A percentage of dry matter was obtained from 19 to 22%, for the neutral and acid fiber a percentage that ranged between 48 to 63% and 24 to 40% respectively; for these variables, there were no statistically significant differences ($P > 0.05$). The protein, reported significant differences ($P < 0.05$) of treatments two and three, with an average of 14%, the ash content, presented the best values in treatments one and two with 4.4 to 5.9%, being statistically different ($P < 0.05$). For calcium and phosphorus, treatment one was statistically superior ($P < 0.05$) with values of 0.29% and 0.18% respectively, in vitro digestibility for treatment three, reached 56% and is statistically different ($P < 0.05$). The cost of production per kilogram of *saccharina* was \$ 328.35.

Keywords: Sugarcane, nutritional composition, animal nutrition, urea.

Efecto del ensilaje de *Avena sativa* en la producción de vacas lactantes, trópico alto Nariño*

Edwin Castro – Rincón¹, Juan L Cardona – Iglesias², Martín R – Valenzuela², Filadelfo Hernández – Oviedo³, Lina M Ríos – Peña⁴, Luz A – Lozano⁵.

¹Investigador PhD, Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Agrosavia), Centro de Investigación Obonuco, Pasto, Colombia. Correo: ecastro@corpoica.org.co. ²Investigador Master, Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Agrosavia), Centro de Investigación Obonuco, Pasto, Colombia. Correo: jlcardona@corpoica.org.co. ³Profesional de apoyo a la investigación, Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Agrosavia), Centro de Investigación Obonuco, Pasto, Colombia. Correo: mvalenzuela@corpoica.org.co. ⁴Profesional de apoyo a la investigación, Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Agrosavia), Centro de Investigación Obonuco, Pasto, Colombia. Correo: fhernandez@corpoica.org.co. ⁵Pasante pregrado, Universidad Industrial de Santander. Correo: linamrios@hotmail.com. ⁶Pasante pregrado, Universidad Nacional de Colombia sede Palmira. Correo: lalozoa@unal.edu.co. Corporación Colombiana de investigación Agropecuaria – Agrosavia Centro de Investigación Obonuco Km 5 Vía Pasto – Obonuco, Nariño, Colombia. *E-mail: ecastro@corpoica.org.co

Resumen

Las variaciones climáticas conllevan a la estacionalidad de la oferta forrajera en sistemas ganaderos del trópico, por lo que se hace necesario el uso de forrajes conservados. El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de tres niveles de inclusión de ensilaje de *Avena sativa* suministrado a vacas lactantes. El experimento se efectuó en el Centro de Investigación Obonuco de Agrosavia, Pasto-Nariño. Se utilizaron seis vacas de primer parto F1 Kiwi Cross x Holstein entre 90 y 150 días de lactancia (sin suplementación comercial) asignadas en un cuadrado latino replicado de 3x3, pastoreaban praderas de composición mixta predominando pasto *Cenchrus clandestinus*. El ensilaje se suministró en tres niveles de inclusión (0; 0,8 y 1,4%) con base al porcentaje del consumo de materia seca/animal. Cada periodo evaluado comprendió 12 días, 5 fueron de acostumbramiento y 7 de medición, los últimos tres días de cada periodo se recolectaron en

ordeño muestras de leche de cada animal (ampm). Las variables evaluadas fueron; producción de leche litros/día (PL), proteína (%P), grasa (%G), sólidos totales (%ST) y nitrógeno ureico en leche (MUN mg/dl). La información se procesó en el software SPSS V 2.0, se realizó análisis de varianza y pruebas de comparación de medias (Tukey < 0,05). Las variables PL, %P, %G y %ST no presentaron diferencias significativas, los valores obtenidos para los niveles de inclusión 0; 0,8 y 1,4% correspondieron a 9,53 - 9,78 y 9,78; 3,40 - 3,43 y 3,45; 4,05 - 4,41 y 4,52; 12,80 - 12,88 y 12,98 respectivamente. La variable MUN presentó diferencia significativa (p 0,02) entre los diferentes niveles, 0% de inclusión: 10,71±0,5; seguida del nivel 0,8%: 9,16±0,5; y 1,4%: 8,21±0,5 mg/dl. Los niveles de inclusión del ensilaje estadísticamente no influyeron sobre la producción y calidad composicional de la leche en este experimento, sin embargo aumentando el nivel de ensilaje se observó un leve incremento numérico en los valores de cada variable analizada. Al aumentar la ración de ensilaje los niveles de MUN disminuyeron. Se recomienda realizar el estudio con una mayor población de animales y así estimar una óptima inclusión de este material forrajero conservado.

Palabras clave: Alimentación, calidad de leche, forrajes conservados, consumo.

* Convenio Especial de Cooperación de Ciencia Tecnología e Innovación N°. 882 – 2015 Entre el Departamento de Nariño, y la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria – Corpoica. Financiado con recursos del Sistema General de Regalías SGR Asignados al Departamento de Nariño y recursos propios de AGROSAVIA

Effect of the silage of common oat (*Avena sativa*) in the production of lactating cows, high tropic Nariño.

Abstract

The climatic variations lead to the seasonality of the forage supply in livestock systems of the tropics, for that reason the use of conserved forages is necessary. The objective of this study was to evaluate the effect of three levels of inclusion of common oat (*Avena sativa*) silage supplied to lactating cows. The experiment was carried out at the Obonuco Research Center in Agrosavia, Pasto-Nariño. Six cows of first calving F1 Kiwi Cross x Holstein between 90 and 150 days of lactation (without commercial supplementation) assigned in a replicated Latin square of 3x3 were grazed, pastures of mixed composition predominated grass *Cenchrus clandestinus*. The silage was supplied in three inclusion levels (0, 0.8 and 1.4%) based on the percentage of dry matter / animal consumption. Each evaluated period comprised 12 days, 5 were of habituation and 7 of measurement, the last three days of each period were collected in milking milk samples of each animal (am-pm). The variables evaluated were; milk production liters / day (MP), protein (% P), fat (% F), total solids (% TS) and urea nitrogen in milk (MUN mg / dl). The information was processed in SPSS V 2.0 software, variance analysis and mean comparison tests were performed (Tukey <0.05). The variables MP, % P, % F and % TS did not present significant differences, the values obtained for inclusion levels 0; 0.8 and 1.4% corresponded to 9.53 - 9.78 and 9.78; 3.40 - 3.43 and 3.45; 4.05-4.41 and 4.52; 12.80 - 12.88 and 12.98 respectively. The MUN variable presented a significant difference (p 0.02) between the different levels, 0% inclusion: 10.71 ± 0.5 ; followed by the 0.8% level: 9.16 ± 0.5 ; and 1.4%: 8.21 ± 0.5 mg / dl. The inclusion levels of the silage statistically did not influence the production and compositional quality of the milk in this experiment, however, increasing the level of silage, a slight numerical increase was observed in the values of each variable analyzed. As the silage ration increased, the MUN levels decreased. It is recommended to carry out the study with a greater population of animals and

thus estimate an optimum inclusion of this preserved forage material.

Keywords: Food, quality of milk, preserved forages, consumption.

Efecto de suplementación con subproductos de caña y niveles de urea en vacas lactantes*

Elizabeth Lagos-Burbano², Yeferson A Bran-Miranda³, Edwin Castro-Rincón¹

¹Investigador PhD, Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Agrosavia), Centro de Investigación Obonuco, Pasto, Colombia. Correo: ecastro@corpoica.org.co. ²Investigador Master, Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Agrosavia), Centro de Investigación Obonuco, Pasto, Colombia. Correo: elagos@corpoica.org.co. ³Profesional de apoyo a la investigación, Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Agrosavia), Centro de Investigación Obonuco, Pasto, Colombia. Correo: ybran@corpoica.org.co. Corporación Colombiana de investigación Agropecuaria – Agrosavia. Centro de Investigación Obonuco. Km 5 Vía Pasto – Obonuco, Nariño, Colombia. E-mail: ecastro@corpoica.org.co

Resumen

El cultivo de la caña de azúcar, genera grandes volúmenes de subproductos con un alto potencial para la nutrición animal en diferentes formas de uso. El objetivo de este trabajo fue evaluar dos suplementos elaborados con melote y bagazo de caña y dos niveles de inclusión de urea, 30 (S1) y 45 (S2) g kg⁻¹ de materia seca (MS) y un testigo absoluto (C) en vacas lactantes. El experimento se realizó en el Centro de Investigación Obonuco de Agrosavia, Nariño. Se usaron seis vacas de primer parto F1 Kiwi Cross x Holstein entre 100 y 200 días de lactancia, las cuales se encontraban bajo pastoreo rotacional con predominancia del pasto *Cenchrus clandestinus*, se empleó un diseño cuadrado latino replicado de 3x3. Se suministró 4 kg de MS de cada suplemento vaca día⁻¹. Cada periodo evaluado comprendió 15 días, 7 de acostumbramiento y 8 de evaluación, los últimos tres días de cada periodo se tomaron muestras de leche. Las variables evaluadas fueron; producción de leche (PL, litros vaca día⁻¹), producción de proteína (PP, g día⁻¹), producción de grasa (PG, g día⁻¹), producción de sólidos totales (PST, g día⁻¹) y nitrógeno ureico en leche (MUN, mgdl⁻¹). Se utilizó el software SPSS V 2.0 para el análisis de la información. Se encontraron diferencias ($P<0,05$) en PL, obteniendo el mayor promedio S1, seguido de S2 frente a C (9,19, 8,92 y 8,04); PST, en donde S2 (1359,76) superó a C (1175,81), pero fue similar a S1 (1356,87) y MUN donde S1 difirió de C y S2 (14,3, 16,71 y 16,32).

Para las variables PP (294,32, 336,73, 326,22) y PG (388,82, 434,78, 392,86), no se encontraron diferencias ($P>0,05$) entre C, S1 y S2. Se concluye que los subproductos de la caña de azúcar con adecuados niveles de inclusión de urea mejoran los parámetros productivos en vacas lactantes, sin embargo, cabe anotar que, S1 (30 g urea kg⁻¹ MS) presentó los mejores promedios en producción y calidad de la leche y el menor contenido de MUN en los animales evaluados. Se recomienda seguir validando estos suplementos con más unidades experimentales.

Palabras clave: Caña, bagazo, melote, subproductos, nutrición.

* Convenio Especial de Cooperación de Ciencia Tecnología e Innovación N°. 881 – 2015 entre el departamento de Nariño, y la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria – Corpoica. Financiado con recursos del Sistema General de Regalías SGR asignados al departamento de Nariño y recursos propios de AGROSAVIA.

Effect of supplementation with sugar cane sub-products and urea levels in lactating cows**Abstract**

The cultivation of sugarcane generates large volumes of by-products with a high potential for animal nutrition in different forms of use. The objective of this work was to evaluate two supplements made with cane melon and bagasse and two inclusion levels of urea, 30 (S1) and 45 (S2) g kg⁻¹ of dry matter (DM) and an absolute control (C) in lactating cows. The experiment was carried out at the Obonuco Research Center in Agrosavia, Nariño. Six cows of first calving F1 Kiwi Cross x Holstein between 100 and 200 days of lactation were used, which were under rotational grazing with predominance of *Cenchrus clandestinus* grass, a replicated 3x3 square latin design was used. 4 kg DM of each day-1 cow supplement was supplied. Each evaluated period comprised 15 days, 7 of habituation and 8 of evaluation; the last three days of each period milk samples were taken. The variables evaluated were; milk production (MP, liters cow day⁻¹), production of protein (PP, g day⁻¹), production of fat (PF, g day⁻¹), production of total solids (PTS, g day⁻¹) and Urea nitrogen in milk (MUN, mgdl⁻¹). The software SPSS V 2.0 was used for the analysis of the information. Differences were found ($P < 0.05$) in MP, obtaining the highest average S1, followed by S2 versus C (9.19, 8.92 and 8.04); PTS, where S2 (1359.76) exceeded C (1175.81), but was similar to S1 (1356.87) and MUN where S1 differed from C and S2 (14.3, 16.71 and 16.32). For the variables PP (294.32, 336.73, 326.22) and PF (388.82, 434.78, 392.86), no differences were found ($P > 0.05$) between C, S1 and S2. It is concluded that sugarcane byproducts with adequate levels of urea inclusion improve the productive parameters in lactating cows, however, it should be noted that, S1 (30 g urea kg⁻¹ DM) presented the best averages in production and quality of milk and the lower MUN content in the animals evaluated. It is recommended to continue validating these supplements with more experimental units.

Keywords: Sugar cane, bagasse, molasses, by-products, nutrition.

Rentabilidad de la suplementación con fruto de palma en bovinos de levante en pastoreo

Elkin Orlando Romero Cárdenas¹, MVZ;
Rodolfo Ruiz Posada¹, MVZ; Lisbeth Campos.
Arenas¹, MVZ, Paola Galván Campo¹, MVZ.

Instituto Universitario de la Paz. ¹Grupo de Investigación en Producción y Ciencia Animal (PROCA), Docente Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Instituto Universitario de la Paz, Barrancabermeja, Colombia. e-mail:
elkin.romero@unipaz.edu.co

Resumen

Una alternativa utilizada actualmente para contrarrestar los problemas nutricionales es la suplementación con subproductos agrícolas regionales, en este caso el fruto de palma aceitera; la suplementación puede permitir el aumento de la capacidad de carga en los sistemas productivos, incrementando la eficiencia de utilización de pasturas en picos de producción y aumentando el nivel de producción por unidad de superficie (kg/ha/año). Se evaluó el comportamiento técnico rentable en la suplementación energética con fruto de palma en novillos de levante en pastoreo rotacional con *Brachiaria humidicola* sobre las variables ganancia de peso, rentabilidad e ingresos bruto y neto. El trabajo se realizó en el centro experimental Santa Lucia, UNIPAZ, Barrancabermeja. Se utilizaron 24 animales distribuidos en tres tratamientos, T0: pastoreo; T1: pastoreo más harina de arroz 40%, salvado de trigo 40% y fruto de palma al 20%; T2: pastoreo más harina de arroz 30%, salvado de trigo 30% y fruto de palma al 40%. Los animales se suplementaron en un 20% respecto al consumo de la materia seca (2%), calculada con respecto a la variación en el peso promedio de los animales por tratamiento, las cantidades se ajustaron de acuerdo al resultado de cada pesaje. Para el tratamiento de la variable peso se estableció el uso de estadística no paramétrica, aplicando la prueba de Kruskal-Wallis, y donde se demostraron diferencias significativas Bonferroni, utilizando el software estadístico SPSS Statistics 21.0. Los ingresos bruto y neto se calcularon teniendo en cuenta las diferencias entre los costos de producción y el valor de venta por kilo de peso animal en pie. Las ganancias de peso medias diaria y acumulada fueron T0: $0,24 \pm 0,10$ y 216

kg/lote; T1: $0,28 \pm 0,12$ y 266 kg/lote; T2: $0,23 \pm 0,10$ y 218 kg/lote, no se obtuvieron diferencias significativas. El costo total, rentabilidad total y mensual, ingreso bruto y neto fueron T0: \$ 12'319.612; 2,76% y 0,92%, \$12'669.696 y \$350.084 respectivamente; T1: \$12'910.915; -0,79% y -0,26; \$12'809.568 y -101.347 y T2: \$13'092.341; -1,74% y -0,58%; \$12'868.224 y -224.117. No hubo efecto de la suplementación sobre la ganancia de peso obteniéndose resultados negativos en términos de rentabilidad económica.

Palabras clave: Suplementación energética, ganancia de peso, rentabilidad, costos, ingreso neto, ingreso bruto.



Profitability of the supplementation with fruit of palm in grazing cattle in pasture

Abstract

An alternative currently used to counteract nutritional problems is the supplementation with regional agricultural by-products, in this case the oil palm fruit; The supplementation can allow the increase of the load capacity in the productive systems, increasing the efficiency of use of pastures in production peaks and increasing the level of production per unit area (kg / ha / year). We evaluated the profitable technical behavior in energy supplementation with palm fruit in steers in rotational grazing with *Brachiaria humidicola* on the variables weight gain, profitability and gross and net income. The work was carried out in the Santa Lucia experimental center, UNIPAZ, Barrancabermeja. We used 24 animals distributed in three treatments, T0: grazing; T1: grazing plus 40% rice flour, 40% wheat bran and 20% palm fruit; T2: grazing more rice flour 30%, wheat bran 30% and palm fruit 40%. The animals were supplemented by 20% with respect to the consumption of dry matter (2%), calculated with respect to the variation in the average weight of the animals per treatment, the quantities were adjusted according to the result of each weighing. For the treatment of the weight variable, the use of nonparametric statistics was established, applying the Kruskal-Wallis test, and where significant Bonferroni differences were demonstrated, using the statistical software SPSS Statistics 21.0. The gross and net income was calculated taking into account the differences between the costs of production and the sale value per kilo of live weight. The daily and cumulative average weight gains were T0: 0.24 ± 0.10 and 216 kg / lot; T1: 0.28 ± 0.12 and 266 kg / lot; T2: 0.23 ± 0.10 and 218 kg / batch, no significant differences were obtained. The total cost, total and monthly profitability, gross and net income were T0: \$ 12'319.612; 2.76% and 0.92%, \$ 12,669,696 and \$ 350,084 respectively; T1: \$ 12,910,915; -0.79% and -0.26; \$ 12'809,568 and -101,347 and T2: \$ 13'092,341; -1.74% and -0.58%; \$ 12,868,224 and -224,117. There was no effect of supplementation on weight gain, obtaining negative results in terms of economic profitability.

Keywords: Energy supplementation, weight gain, cost effectiveness, costs, gross income, net income.

Composición de la leche de vacas pastoreando con/sin sistema silvopastoril

Esperanza Prieto-Manrique¹, Julio Ernesto Vargas-Sánchez², Joaquín Angulo-Arizala³, Liliana Mahecha-Ledesma³

¹Universidad de Sucre, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Sincelejo - Sucre, Colombia.
esperanza.prieto@unisucre.edu.co. ²Universidad de Caldas, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Departamento Sistemas de Producción. Manizales – Caldas, Colombia. jvargas@ucaldas.edu.co. ³Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias Agrarias, Grupo de Investigación en Ciencias Animales (GRICA). Medellín – Antioquia, Colombia. joaquin.angulo@udea.edu.co, liliana.mahecha@udea.edu.co.

Resumen

Se evaluó el efecto de la dieta, el número de partos y el tercio de lactancia sobre la calidad composicional de la leche de vacas pastoreando en cuatro sistemas de producción. El trabajo se realizó en diez ganaderías colombianas, representativas de los sistemas de producción lechería tropical (LT) y doble propósito (DP) con/sin sistema silvopastoril intensivo de leucaena (SSPi). En cada ganadería se tomaron tres muestras individuales de leche, de cinco vacas (día 62 ± 22 , día 147 ± 22 y día 227 ± 22 de lactancia), conjuntamente se estimó el consumo de suplemento y de forraje y se determinó su composición química. El análisis de los componentes de la leche y de nitrógeno ureico (MUN), se realizó en la leche fresca, mediante Milkoscan 133 B; cada sistema de producción se analizó independientemente. La dieta afectó ($p < 0.05$) el porcentaje de sólidos totales en LT y el porcentaje de lactosa en LTSSPi y DPSSPi. Grasa en leche varió entre 2.40 a 5.15%, proteína entre 2.77 a 3.75%, sólidos totales entre 10.95 a 14.14% y fueron afectados por el tercio de lactancia ($p < 0.05$) en todos los sistemas, presentando el primer tercio el menor valor. El sistema DP presentó el menor porcentaje de grasa y el sistema DPSSPi el mayor valor, por mayor proporción de genes *Bos indicus* en las vacas. LTSSPi y DPSSPi presentaron valores de MUN menores a 15 mg/dl. El número de parto no presentó efecto sobre la composición de la leche. La dieta y el número de parto presentaron menor

efecto que el tercio de lactancia sobre la composición de la leche.

Palabras clave: Lechería tropical, doble propósito, sólidos totales, grasa en leche, MUN, *Leucaena leucocephala*

Composition of milk cow grazing with / without silvopastoril system

Abstract

The effect of the diet, the number of births and the third of lactation on the compositional quality of the milk of cows grazing in four production systems was evaluated. The work was carried out in ten Colombian farms, representative of the systems of tropical dairy production (TD) and double purpose (DP) with / without intensive silvopastoral system of leucaena (SSPi). In each livestock, three individual samples of milk were taken from five cows (day 62 ± 22 , day 147 ± 22 and day 227 ± 22 of lactation), together the consumption of supplement and forage was estimated and its chemical composition was determined. The analysis of the components of milk and urea nitrogen (MUN) was carried out in fresh milk, using Milkoscan 133 B; each production system was analyzed independently. The diet affected ($p < 0.05$) the percentage of total solids in TD and the percentage of lactose in TDSSPi and DPSSPi. Fat in milk varied between 2.40 to 5.15%, protein between 2.77 to 3.75%, total solids between 10.95 to 14.14% and were affected by the third of lactation ($p < 0.05$) in all systems, the first third presenting the lowest value. The DP system presented the lowest percentage of fat and the DPSSPi system the highest value, due to the higher proportion of *Bos indicus* genes in the cows. TDSSPi and DPSSPi presented MUN values below 15 mg / dl. The parturition number had no effect on the composition of the milk. The diet and the number of childbirth had less effect than the third of lactation on the composition of the milk. Key words: Tropical dairy, dual purpose, total solids, fat in milk, MUN, *Leucaena leucocephala*.

Keywords: Tropical dairy system, dual purpose, total solids in milk, fat in milk, MUN, *Leucaena leucocephala*.

Efecto del reemplazo parcial de heno por follaje de arbóreas sobre metabolitos sanguíneos en corderos

Fabián Gutiérrez¹, Est. MVZ; Jairo Pardo-Guzmán¹, MVZ, MSc(c); Lilian Guevara-Muñetón¹, MVZ, MSc(c); Alejandra Vélez-Giraldo¹, MVZ, MSc(c); Rafael Castro¹, Est. MVZ; Marcela Díaz¹, Est. MVZ; Paula Lozano¹, Est. MVZ; Diana Cedié¹, Est. MVZ; Manuel Avila¹, Est. MVZ; Román Castañeda-Serrano^{1*} MVZ, MSc, PhD.

¹Grupo de investigación en sistemas agroforestales pecuarios Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad del Tolima. *Email: rcastaneda@ut.edu.co

Resumen

La medición de los niveles de metabolitos sanguíneos es una herramienta importante para analizar el estado energético y proteico de los animales. Los valores de β -hidroxibutirato y glucosa están relacionados con el estatus energético del animal. El nitrógeno ureico en sangre refleja el aprovechamiento de la proteína producto de la degradación del alimento a nivel ruminal. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la suplementación con follaje de *Cordia dentata* y *Samanea saman* sobre los valores de glucosa, urea y β -hidroxibutirato sanguíneos. El experimento fue realizado en la granja las Brisas, Ibagué (Tolima, Colombia). Se utilizaron 12 ovinos machos castrados con peso promedio de 20,06 Kg. Las dietas evaluadas fueron: T1: *Dichanthium* spp, T2: 80% *Dichanthium* spp, 20% *S. saman*, T3: 80% *Dichanthium* spp, 20% *C. dentata*, T4: 80% *Dichanthium* spp, 10% *S. saman*, 10% *C. dentata*. Las muestras de sangre se obtuvieron por venopunción yugular el último día de cada periodo experimental. El modelo estadístico utilizado fue un cuadrado latino 4x4, cuatro tratamientos x 4 períodos experimentales con duración de 17 días por periodo, (12 de adaptación a las dietas y 5 de evaluación). El análisis de los datos se realizó por medio de un ANOVA, la comparación entre medias se hizo por medio test de HSD de Tukey ($P= 0.05$) SAS versión 9.1. Se encontró que los valores de glucosa y β -hidroxibutirato fueron similares para todos los tratamientos ($p>0.05$) y estos se encontraron dentro de los valores de referencia

para ovinos de pelo. El nitrógeno ureico en sangre fue bajo para todos los tratamientos, sin embargo al comparar los tratamientos se presentan diferencias estadísticamente significativas ($p<0.05$) entre los mismos, evidenciando niveles superiores para los animales que tuvieron la inclusión del 20% de *S. saman* (T2), dado por la mayor disponibilidad de proteína en la dieta. Estos resultados demuestran que la inclusión de las especies arbóreas *S. saman* y *C. dentata*, no influyó sobre los niveles glucosa y β -hidroxibutirato, pero si sobre las concentraciones de BUN concluyendo que la inclusión de *S. saman* mejora el estatus metabólico de los animales.

Palabras clave: Trópico seco, sistemas silvopastoriles, suplementación, pequeños rumiantes.

Effect of partial hay replacement by tree foliage on blood metabolites in lambs

Abstract

The measurement of blood metabolite levels is an important tool to analyze the energy and protein status of animals. The values of β -hydroxybutyrate and glucose are related to the energy status of the animal. The blood urea nitrogen reflects the use of the protein product of food degradation at the ruminal level. The objective of this work was to evaluate the effect of supplementation with foliage of *Cordia dentata* and *Samanea saman* on blood glucose, urea and β -hydroxybutyrate values. The experiment was carried out in Las Brisas farm, Ibagué (Tolima, Colombia). We used 12 castrated male sheep with an average weight of 20.06 Kg. The diets evaluated were: T1: *Dichanthium* spp, T2: 80% *Dichanthium* spp, 20% *S. saman*, T3: 80% *Dichanthium* spp, 20% *C. dentata*, T4: 80% *Dichanthium* spp, 10% *S. saman*, 10% *C. dentata*. Blood samples were obtained by jugular venopuncture on the last day of each experimental period. The statistical model used was a 4x4 Latin square, four treatments x 4 experimental periods with duration of 17 days per period, (12 of adaptation to the diets and 5 of evaluation). The analysis of the data was performed by means of an ANOVA, the comparison between means was made by Tukey's HSD test ($P = 0.05$) SAS version 9.1. It was found that the values of glucose and β -hydroxybutyrate were similar for all treatments ($p > 0.05$) and these were found within the reference values for hair sheep. The blood urea nitrogen was low for all treatments, however, when comparing the treatments, statistically significant differences were found ($p < 0.05$) among them, showing higher levels for the animals that had the inclusion of 20% of *S. saman* (T2), given by the greater availability of protein in the diet. These results demonstrate that the inclusion of the *S. saman* and *C. dentata* tree species did not influence the glucose and β -hydroxybutyrate levels, but it did on the BUN concentrations concluding that the inclusion of *S. saman* improves the metabolic status of the animals.

Keywords: Dry forest, silvopastoralism systems, supplementation, small ruminants.

Alternativas de suplementación en bovinos carne en la provincia Comunera

Freddy Andrés Cala S¹, Luis Felipe Ayala¹,
Fabián Jiménez Arango²

¹Estudiantes IX semestre Facultad de Zootecnia,
Universidad Libre. Socorro, Santander. ²Zootecnista MSc.
Director proyecto. Docente Universidad Libre. Socorro,
Santander. f.jimenezzoot@yahoo.com

Resumen

En la provincia Comunera, localizada al sur oriente de Santander, la biomasa de las praderas desciende hasta 75% en épocas de baja precipitación, lo que ocasiona ganancias de peso inferiores a 150 gramos/animal/día, incluso se presentan pérdidas de peso. Con el propósito de reducir el efecto de la estacionalidad forrajera, se evaluó durante 60 días la incorporación de residuos de cosecha agroindustriales en la alimentación de bovinos en la fase de levante para determinar su efecto sobre la producción de carne y rentabilidad del sistema. La investigación se llevó a cabo en el municipio El Palmar, vereda Orocó, situada a 875 msnm. El suplemento estuvo constituido por pollinaza compostada 60%, melaza 20% y palmiste 20%, suministrando con éste un 9.0% de proteína cruda y 6.0 MJ de E/kg. Se emplearon diez bovinos de levante de la raza Brahman rojo con un peso inicial promedio de 210.6 kg que pastoreaban una pradera de *Brachiaria decumbens*, los cuales fueron distribuidos al azar en dos tratamientos utilizando la prueba de *t student*. Tratamiento I: suplementación con un kg/animal/día de la mezcla antes mencionada, suministrada en canoas de madera ubicadas en los potreros donde se encontraban los animales y tratamiento II: testigo. Los animales tuvieron un periodo de acostumbramiento de siete días. Durante la fase experimental los animales del tratamiento I alcanzaron incrementos de peso promedio de 0.680kg/animal/día con relación al tratamiento II que lograron incrementos promedio de 0.476 kg/animal/día, presentándose diferencia significativa ($p < 0.05$) entre éstos. El valor de la suplementación para el tratamiento I fue de \$72.855.00, pero los 61 kilogramos adicionales que se logran en este tratamiento representan un ingreso neto al productor de \$97.945.00, que

justifican la suplementación. Los animales del tratamiento I no mostraron ningún sistema adverso a la suplementación.

Palabras clave: Incremento peso, ingreso neto, melaza, pollinaza, residuos agroindustriales.

Alternatives of supplementation in cattle meat in Comunera province

Abstract

In the province of Comunera, located to the south east of Santander, the prairie biomass drops to 75% in times of low rainfall, which causes weight gains of less than 150 grams / animal / day, even weight losses occur. With the purpose of reducing the effect of forage seasonality, the incorporation of agroindustrial crop residues in the cattle feed in the rising phase was evaluated for 60 days to determine its effect on meat production and profitability of the system. The investigation was carried out in the municipality of El Palmar, Orocó village, located at 875 meters above sea level. The supplement consisted of 60% compost, 20% molasses and 20% palm kernel, providing 9.0% crude protein and 6.0 MJ E / kg. Ten red-bred Brahman cattle with an average initial weight of 210.6 kg grazing on a *Brachiaria decumbens* meadow were used, which were randomized into two treatments using the *t-student* test. Treatment I: supplementation with one kg / animal / day of the aforementioned mixture, supplied in wooden canoes located in the paddocks where the animals were and treatment II: control. The animals had a seven-day acclimatization period. During the experimental phase, the animals of treatment I reached average weight increases of 0.680 kg / animal / day in relation to treatment II, which achieved average increases of 0.476 kg / animal / day, presenting a significant difference ($p < 0.05$) between them. The values of the supplementation for treatment I was \$ 72,855.00, but the additional 61 kilograms that are achieved in this treatment represent a net income to the producer of \$ 97,945.00, which justifies the supplementation. The animals of treatment I did not show any system adverse to supplementation.

Keywords: Increase weight, net income, molasses, manure, agroindustrial waste.

Caracterización nutricional y mineral de Boca de Indio (*Piptocoma discolor* (Kunth) Pruski), bajo condiciones del trópico húmedo Amazónico

Faver Álvarez Carrillo¹, Juan Carlos Suárez²,
Gustavo Adolfo Celis Parra¹

¹Docente Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad de la Amazonia, Florencia – Caquetá, Colombia. ²Docente Programa de Ingeniería Agroecológica, Facultad de Ingeniería, Universidad de la Amazonia, Florencia – Caquetá, Colombia. falvarezc@uniamazonia.edu.co

Resumen

El objetivo general de este trabajo fue caracterizar la calidad nutricional y mineral de Boca de Indio (*Piptocoma discolor* (Kunth) Pruski), en dos unidades de paisajes en el municipio de Florencia (Caquetá). Se escogieron al azar 30 árboles de *P. discolor*, en dos unidades de paisajes; por cada uno de los paisajes se escogieron 15 árboles bajo los siguientes criterios: a) árboles adultos, b) árboles con características morfológicas bien definidas, c) árboles sin presencia de plagas, y d) árboles sin presencia de enfermedades. Se tomaron muestras de hojas y tallos no lignificados y se secaron a 70 °C hasta peso constante para establecer porcentaje de humedad. Finalmente se sacaron 200 g por muestra para determinar Materia Seca (MS), Materia Orgánica (MO), Carbono Orgánico (CO), Proteína Cruda por el Método de Kjelhal (PC), Fibra Detergente Ácida (FDA), Fibra Detergente Neutra (FDN) y Digestibilidad *in Vitro* de Materia Seca (estimación) (DMS), de igual forma los minerales que se estimaron fueron Ca, Mg, K por espectrofotometría de absorción atómica, y P por espectrofotometría UW-VIS. Los niveles de Proteína cruda (PC) y Nitrógeno (N) en el arbusto *P. discolor*, presentó diferencias significativas, siendo mayor en el paisaje de vega (PC 14,62 y N 2,34), sobre el lomerío (PC 9,48% y N 1,51). Los contenidos de P presentaron diferencias significativas siendo superior en la zona de vega (1,29±0,11) que en la de lomerío (0,93±0,11). En los contenidos de Ca no se encontraron diferencias significativas entre los suelos de lomerío (0,78±0,12) y vega (0,57±0,12), pero se convierte en fuente de suplementación del Ca en

animales que solo son alimentados con gramíneas. Los contenidos bromatológicos en hojas y tallos verdes del Boca de Indio, en zona de lomerío y vega, demuestran que es una especie arbustiva que presenta buenas condiciones nutricionales para ser considerada como una alternativa que ayuda a suplementar nutrientes, en especial, PC, MO, P, Ca, K, Na, Mg, Mn, que son superiores a los contenidos que presentan las gramíneas usadas en la región del piedemonte amazónico caqueteño.

Palabras clave: Leñosa perenne, árboles nativos, forraje, nutricional, minerales.



Nutritional and mineral characterization of Boca de Indio (*Piptocoma discolor* (Kunth) Pruski), under conditions of the humid Amazonian tropic

Abstract

The general objective of this work was to characterize the nutritional and mineral quality of Boca de Indio (*Piptocoma discolor* (Kunth) Pruski), in two units of landscapes in the municipality of Florencia (Caquetá). 30 trees of *P. discolor* were chosen at random in two landscape units; for each of the landscapes, 15 trees were chosen under the following criteria: *a*) adult trees, *b*) trees with well-defined morphological characteristics, *c*) trees without the presence of pests, and *d*) trees without the presence of diseases. Samples were taken from non-lignified leaves and stems and dried at 70 °C until constant weight to establish humidity percentage. Finally, 200 g were taken per sample to determine Dry Matter (DM), Organic Matter (OM), Organic Carbon (OC), Raw Protein by the Kjelhal Method (RP), Acid Detergent Fiber (ADF), Neutral Detergent Fiber (NDF)) and *in vitro* Digestibility of Dry Matter (estimate) (DDM), likewise the minerals that were estimated were Ca, Mg, K by atomic absorption spectrophotometry, and P by UW-VIS spectrophotometry. The levels of raw protein (RP) and Nitrogen (N) in the shrub *P. discolor*, presented significant differences, being higher in the landscape of vega (CP 14.62 and N 2.34), on the hill (RC 9, 48% and N 1.51). The contents of P presented significant differences being higher in the zone of fertile plain (1.29 ± 0.11) than in that of hills (0.93 ± 0.11). In the contents of Ca no significant differences were found between the soils of lomerío (0.78 ± 0.12) and vega (0.57 ± 0.12), but it becomes a source of Ca supplementation in animals that are only fed with grasses. The bromatological contents in leaves and green stems of the Boca de Indio, in an area of lomerío and vega, show that it is a shrub species that presents good nutritional conditions to be considered as an alternative that helps to supplement nutrients, especially RP, OM, P, Ca, K, Na, Mg, Mn, which are higher than the contents of the grasses used in the Amazonian piedmont region of Caqueta.

Keywords: Perennial woody, native trees, fodder, nutritional, minerals.

Evaluación de la relación planta - animal en un sistema especializado de leche en Nariño-Colombia

Gema Lucía Zambrano Burbano¹, José Edmundo Apráez Guerrero²

¹Investigadora, Zoot. MSc Universidad de Nariño., (c) Dr.Sc. Grupo de Investigación Producción y Sanidad Animal-Cuyes, Línea de investigación Recursos Alimentarios para Especies Pecuarias, Pasto, Colombia. mitugema@hotmail.com. ²Docente asociado, Universidad de Nariño, Facultad de Ciencias Pecuarias, Programa de Zootecnia, Grupo de Investigación Producción y Sanidad Animal-Cuyes, Línea de investigación Recursos Alimentarios para Especies Pecuarias, Pasto, Colombia. eapraez@gmail.com

Resumen

Se evaluó la relación entre la composición nutricional de las praderas de *Lolium hybridum* en monocultivo y en mezcla de *Dactylis glomerata*, *Holcus lannatus* y *Lolium sp*, con algunos indicadores metabólicos en vacas lecheras, durante dos épocas (lluviosa y seca), y en diferentes zonas de las praderas (alta, media, baja). Se realizaron análisis bromatológicos del monocultivo y de la mezcla; en muestras de sangre se determinó hematocrito, hemoglobina, proteínas totales, nitrógeno ureico sanguíneo (BUN) y cuerpos cetónicos. El análisis de la información obtenido de las variables bromatológicas e indicadores metabólicos, se realizó mediante análisis de varianza a través del procedimiento GLM del programa estadístico SAS 9.20. En el monocultivo se observaron diferencias ($P<0.05$) en periodo de recuperación (PR), tanto por épocas como por zonas; mientras que, en el policultivo el PR fue diferente solo entre épocas. La producción de biomasa en el monocultivo tuvo diferencias ($P<0.05$) entre épocas y zonas, en el policultivo no las hubo entre zonas. Se observaron diferencias entre zonas, en la mayor parte de los componentes nutricionales de las dos clases de praderas, a favor del monocultivo, salvo en Fibra Detergente Neutra (FDN), fósforo y magnesio. El BUN y la hemoglobina resultaron diferentes ($P<0.05$) en el monocultivo y en la mezcla. No se observaron diferencias en hematocrito, proteínas totales y cuerpos cetónicos. Los valores de hematocrito en el monocultivo fueron de 36.94% y proteínas

totales de 7.17 (g/dl). En la pradera en mezcla, los niveles de hematocrito fueron de 34.42% y proteínas totales de 7.95 (g/dl); en ambos casos hubo ausencia de cuerpos cetónicos. Los resultados permiten inferir que, tanto el monocultivo como la mezcla, constituyen un alimento satisfactorio para las ganaderías de Nariño, ya que proveen los nutrientes necesarios para mantenimiento y producción media de 19 litros de leche.

Palabras clave: *Dactylis glomerata*, *Holcus lannatus*, holstein, *Lolium sp*, *Lolium hybridum*, Trópico Alto de Nariño.

Agradecimientos

A la Vicerrectoría de Investigaciones, Postgrados y Relaciones Internacionales-VIPRI de la Universidad de Nariño, Convocatoria Docente 2016.

Plant - animal relationship in a specialized dairy system in Nariño-Colombia**Abstract**

The relationship between the nutritional composition of the *Lolium hybridum* grasslands in monoculture and in the mixture of *Dactylis glomerata*, *Holcus lannatus* and *Lolium sp*, with some metabolic indicators in dairy cows, during two seasons (rainy and dry), and in different zones was evaluated of the prairies (high, medium, low). Bromatological analyzes of the monoculture and the mixture were carried out; in blood samples, hematocrit, hemoglobin, total proteins, blood urea nitrogen (BUN) and ketone bodies were determined. The analysis of the information obtained from the bromatological variables and metabolic indicators was carried out by analysis of variance through the GLM procedure of the statistical program SAS 9.20. In the monoculture, differences were observed ($P < 0.05$) in the recovery period (RP), both by seasons and by zones; while, in polyculture the RP was different only between eras. The production of biomass in the monoculture had differences ($P < 0.05$) between seasons and zones, in the polyculture there were no between zones. Differences were observed between zones, in most of the nutritional components of the two types of grasslands, in favor of monoculture, except for Neutral Detergent Fiber (NDF), phosphorus and magnesium. BUN and hemoglobin were different ($P < 0.05$) in monoculture and in the mixture. No differences were observed in hematocrit, total proteins and ketone bodies. The values of hematocrit in the monoculture were 36.94% and total proteins of 7.17 (g / dl). In the mixed meadow, hematocrit levels were 34.42% and total proteins were 7.95 (g / dl); in both cases there was an absence of ketone bodies. The results allow us to infer that, both the monoculture and the mixture, constitute a satisfactory food for the Nariño herds, since they provide the necessary nutrients for maintenance and average production of 19 liters of milk.

Keywords: *Dactylis glomerata*, *Holcus lannatus*, Holstein, *Lolium sp*, *Lolium hybridum*, High Tropic of Nariño.

Relación entre la composición, la capacidad antioxidante y el contenido fenólico de alimentos concentrados para perros

Giovanni Restrepo B^{1,5}, Alexandra Usuga S^{2,6}, Luis Miguel Gomez^{3,7}, Carolina Mesa Pineda^{3,8}, Oliver Restrepo Rojas^{3,9}, Juan Camilo Duque^{3,10}, Benjamín A. Rojano^{4,11}

¹Grupo de Investigación en Biotecnología Animal (GIBA), Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid – Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, Antioquia, Colombia.

²Grupo de Investigación INCA-CES, Universidad CES, Medellín, Antioquia, Colombia. ³Grupo de Investigación Nutri-Solla, Solla S.A, Itagüí, Antioquia, Colombia.

⁴Grupo de Investigación en Química de los Alimentos y los Productos Naturales, Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, Antioquia, Colombia. ⁵e-mail:

grestre0@unal.edu.co. ⁶e-mail: ausuga@ces.edu.co. ⁷e-mail: lmgomezo@solla.com. ⁸e-mail: cmesa@solla.com. ⁹e-mail: orestrepor@solla.com. ¹⁰e-mail: jcduque@solla.com. ¹¹e-mail: brojano@unal.edu.co.

Resumen

El estrés oxidativo se ha asociado con el desarrollo de muchas enfermedades crónicas y degenerativas en los caninos. La presencia de antioxidantes en los alimentos contribuye a la reducción de los efectos nocivos de las especies reactivas de oxígeno (ROS) y nitrógeno (RNS). Los polifenoles son un grupo de sustancias entre las cuales muchas presentan gran actividad antioxidante y desempeñan un papel importante en la prevención de enfermedades. La evaluación de la capacidad antioxidante total (CAT) de un alimento proporciona información biológicamente más relevante que la medición de la concentración de antioxidantes individuales. El objetivo de esta investigación fue evaluar la relación entre la composición, la CAT y el contenido de polifenoles de concentrados comerciales para perros. Se seleccionaron aleatoriamente 19 alimentos para perros de los cuatro diferentes segmentos comerciales: popular, económico, premium y superpremium. Mediante un análisis bromatológico se evaluó la composición de cada alimento. A partir de la fracción hidrofílica de cada alimento, se evaluó la CAT mediante el método ABTS y el contenido fenólico total a través del método de Folin-Ciocalteu. Se realizaron análisis de varianza y correlación de Pearson. Los concentrados de los segmentos premium y superpremium presentaron

proporciones mayores de proteína y grasa, y menores de fibra, cenizas, calcio y fosforo, en comparación con los concentrados de los segmentos popular y económico. Para los segmentos popular, económico, premium y superpremium, se encontraron valores de fenoles totales de 160.1 ± 49.8 , 146.7 ± 41.5 , 131.6 ± 21.5 y 144.9 ± 34.1 mg de ácido gálico/100 g muestra ($p > 0.05$); y valores de CAT de 3146.0 ± 564.5 , 2895.4 ± 581.0 , 2837.6 ± 241.7 y 2875.79 ± 325.8 µmol Trolox/L muestra ($p > 0.05$), respectivamente. Se encontró una correlación positiva entre el contenido de fibra y los fenoles totales ($r = 0.47$, $p < 0.05$). Se concluye que la segmentación comercial de los concentrados para perros no está reflejada en su aporte antioxidante y que un mayor contenido de fibra propio de concentrados de segmentos popular y económico, está asociado positivamente con el contenido de fenoles.

Palabras clave: Alimento, antioxidantes, caninos, estrés oxidativo, fenoles.

**Relationship between composition,
antioxidant capacity and phenolic content of
concentrated food for dogs****Abstract**

Oxidative stress has been associated with the development of many chronic and degenerative diseases in canines. The presence of antioxidants in food contributes to the reduction of the harmful effects of reactive oxygen species (ROS) and nitrogen (RNS). Polyphenols are a group of substances among which many have high antioxidant activity and play an important role in the prevention of diseases. The evaluation of the total antioxidant capacity (TAC) of a food provides biologically more relevant information than the measurement of the concentration of individual antioxidants. The objective of this investigation was to evaluate the relationship between the composition, the TAC and the polyphenol content of commercial concentrates for dogs. 19 dog foods were randomly selected from the four different commercial segments: popular, economic, premium and superpremium. Through a bromatological analysis the composition of each food was evaluated. From the hydrophilic fraction of each food, the TAC was evaluated by the ABTS method and the total phenolic content through the Folin-Ciocalteu method. Pearson's variance and correlation analysis were performed. The concentrates of the premium and superpremium segments presented higher proportions of protein and fat, and lower fiber, ash, calcium and phosphorus, in comparison with the concentrates of the popular and economic segments. For the popular, economic, premium and superpremium segments, total phenol values of 160.1 ± 49.8 , 146.7 ± 41.5 , 131.6 ± 21.5 and 144.9 ± 34.1 mg of gallic acid / 100 g sample ($p > 0.05$) were found; and CAT values of 3146.0 ± 564.5 , 2895.4 ± 581.0 , 2837.6 ± 241.7 and 2875.79 ± 325.8 $\mu\text{mol Trolox} / \text{L sample}$ ($p > 0.05$), respectively. A positive correlation was found between fiber content and total phenols ($r = 0.47$, $p < 0.05$). It is concluded that the commercial segmentation of the concentrate for dogs is not reflected in its antioxidant contribution and that a higher content of fiber typical of concentrates of popular and economic segments, is positively associated with the content of phenols.

Keywords: Food, antioxidants, canine, oxidative stress, phenols.

Evaluación de perfiles metabólicos en hembras ovinas paridas de una granja del departamento de Antioquia

Leonardo Cossio Luján^{*1}, Danilo Alexander Carvajal Beltrán^{*1}, Elkin Mauricio Arboleda Zapata^{*1}, Carlos Humberto Tamayo Patiño*, Oscar David Múnica Bedoya¹, Catalina Roldán Urrea^{*1}, Yorcly Lopera Graciano^{1,2}, Henry Cardona Cadavid^{*1}

*Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia; ¹Semillero de Investigación y Grupo de Estudio en Ovinos y Caprinos, GEKO-GaMMA de la Universidad de Antioquia; ²Tienda Ovina, Empresa de Asesorías Ovino-Caprinas. e-mail de contacto: henry.cardona@gmail.com

Resumen

Los perfiles metabólicos permiten obtener información relacionada con el estado nutricional y como este puede afectar el estado sanitario de un hato en un momento determinado. El objetivo fue evaluar en sangre las concentraciones de metabolitos en 10 hembras ovinas recién paridas (entre 5 días y 35 días postparto) que se encuentran estabuladas. El estudio fue llevado a cabo en una granja ovina en Antioquia. Se midieron concentraciones en sangre (mg/dl) de glucosa, Nitrógeno Ureico en Sangre (BUN), urea, colesterol total, bilirrubina total y Aspartato Aminotransferasa (AST). Se tomaron tres muestras de sangre por animal y dichas muestras fueron colectadas de la vena yugular con intervalos de 1 semana para cada animal (ocho F1 East Friesian*Romanov, y dos Ovino de Pelo Colombiano, OPC). Los valores promedios encontrados fueron: Bilirrubina=0,30±0,16 (0.1-0.2*); BUN=3,68±5,5 (19-37*); Urea=29,3±11,8 (40-80*); Colesterol=76,17±17,73 (37-65*); AST=138,1±64,2 (75-339*) y Glucosa=61,6±8,37 (48-80*); la alimentación de estas hembras recién paridas se basa en el pasto de corte Cuba 22 (0,95Mcal/kg, 6,59% PB) e Imperial (0,81Mcal/kg, 5,04PB) junto con 500/gr/día/animal de ensilaje de naranja (proteína 9%, grasa 3%, fibra 12%, cenizas 10%, humedad 50%) y suplementados con concentrados (750/gr/animal/día en dos porciones) con el siguiente perfil nutricional: proteína 18%, grasa 2%, fibra 12%, cenizas 10%, humedad 13%, las cuales se les suministra entre las 6 y 8 am y entre

las 4 y 6 pm. Estas dietas altamente energéticas pueden tener incidencia en altos niveles de bilirrubina y su acción en el metabolismo lipídico; por lo tanto, esto puede conllevar a que se presenten altos niveles de colesterol y bilirrubina en dichos análisis. El BUN y la UREA se encontraron por debajo de estos rangos. La glucosa y la AST estuvieron entre los rangos descritos por el laboratorio que llevó a cabo dicho análisis. Los niveles de glucosa y colesterol fueron diferentes a los encontrados por otros autores en estudios con ovinos, los valores de UREA, bilirrubina total y AST fueron similares a otros estudios citados. El conocimiento de los perfiles metabólicos en este redil permite tener indicios de la incidencia de la alimentación con respecto al estado nutricional y sanitario de dichas hembras.

* Aval del Comité de Ética para la Experimentación Animal (CEEA) de la Universidad de Antioquia Acta número 115 del 2018

Palabras clave: AST, BUN, colesterol, East Friesian, nutrición, Romanov

Agradecimientos

Al Grupo de Investigación GaMMA de la Universidad de Antioquia por la financiación del proyecto (Estrategia para la Sostenibilidad GaMMA de la UdeA), a la Facultad de Ciencias Agrarias por el apoyo logístico y académico, y especialmente a todo el personal de la Granja Ovina La Fortaleza por permitirnos realizar esta investigación en su granja.



Evaluation of metabolic profiles in paride female sheeps from a farm of the department of Antioquia

Abstract

The metabolic profiles allow obtaining information related to the nutritional status and how it can affect the health status of a herd at a given time. The objective was to evaluate blood concentrations of metabolites in 10 freshly born female sheep (between 5 days and 35 days postpartum) that are housed. The study was carried out in a sheep farm in Antioquia. Blood concentrations (mg / dl) of glucose, blood urea nitrogen (BUN), urea, total cholesterol, total bilirubin and aspartate aminotransferase (AST) were measured. Three blood samples were taken per animal and these samples were collected from the jugular vein with intervals of 1 week for each animal (eight F1 East Friesian *Romanov, and two Colombian Hair Ovine, CHO). The average values found were: Bilirubin = 0.30 ± 0.16 (0.1-0.2 *); BUN = 3.68 ± 5.5 (19-37 *); Urea = 29.3 ± 11.8 (40-80 *); Cholesterol = 76.17 ± 17.73 (37-65 *); AST = 138.1 ± 64.2 (75-339 *) and Glucose = 61.6 ± 8.37 (48-80 *); The feeding of these fresh-born females is based on Cuba 22 (0.95Mcal / kg, 6.59% PB) and Imperial (0.81Mcal / kg, 5.04PB) cutting pasture together with 500 / gr / day / animal of orange silage (protein 9%, fat 3%, fiber 12%, ash 10%, humidity 50%) and supplemented with concentrates (750 / gr / animal / day in two portions) with the following nutritional profile: protein 18%, 2% fat, 12% fiber, 10% ash, 13% moisture, which is supplied between 6 and 8 am and between 4 and 6 pm. These highly energetic diets can have an impact on high levels of bilirubin and its action on lipid metabolism; therefore, this can lead to high levels of cholesterol and bilirubin in such analyzes. The BUN and the UREA were below these ranges. Glucose and AST were among the ranges described by the laboratory that performed the analysis. The levels of glucose and cholesterol were different from those found by other authors in studies with sheep, the values of UREA, total bilirubin and AST were similar to other studies cited. The knowledge of the metabolic profiles in this fold allows having indications of the

incidence of the feeding with respect to the nutritional and sanitary status of said females.

* Guarantee of the Ethics Committee for Animal Experimentation (CEEA acronym from Spanish) of the University of Antioquia Act number 115 of 2018

Keywords: AST, BUN, cholesterol, East Friesian, nutrition, Romanov.

Evaluación del efecto de productos alternativos en el rendimiento técnico económico en cerdos de precebo

MV., Esp. Hermes Ordoñez Olivares; Mg. Jorge Humberto Contreras Castro; Estudiante MVZ
Maria Camila Muñoz Muñoz.

Instituto Universitario de la Paz UNIPAZ.
hermes.ordonez@unipaz.edu.co;
jorge.contreras@unipaz.edu.co;
maria.munos@unipaz.edu.co

Resumen

El destete ocasiona una respuesta de estrés agudo debido a los cambios sociales, ambientales y nutricionales a los que son expuestos los lechones y por ello, la presente investigación tiene como objetivo evaluar técnica y económicamente el efecto de dos productos alternativos, inmunomodulador y homeopático, en cerdos en la fase de precebo. Las actividades de la fase experimental se llevarán a cabo durante 42 días en la Unidad Académica y de Investigación MVZ Porcinos del Instituto Universitario de la Paz UNIPAZ, estableciéndose un diseño aleatorizado unifactorial, valorándose los productos alternativos (factor de evaluación) a través de la respuesta expresada en los parámetros técnicos y económicos. El diseño constará de tres tratamientos, T1 (alimento balanceado), T2 (alimento balanceado con inmunomodulador) y T3 (alimento balanceado con homeopático), utilizándose 24 cerdos mestizos (hembras y machos castrados), que se distribuirán en ocho cerdos por tratamiento, pesados previamente con la finalidad de homogenizar los lotes de los tratamientos. Diariamente se llevará la información de consumo y diarreas, y de otra parte, cada 14 días se realizaran los pesajes con el propósito de tabular la información que permita determinar las variables técnicas (consumo de alimento, ganancia de peso, conversión y frecuencia de diarreas), e igualmente, las variables económicas (utilidad neta de efectivo, margen de utilidad, beneficio/costo y utilidad neta por animal). La información se procesará mediante estadística no paramétrica a través de la prueba de Kruskal-Wallis, y en caso de ser necesario, la prueba de Bonferroni, mediante el software estadístico SPSS. Se espera que las

variables técnicas y económicas tengan un mejor comportamiento en los tratamientos experimentales, que los productos alternativos tengan una mejor eficiencia nutricional, expresado en un mejor comportamiento de las variables técnicas y económicas en los tratamientos que utilizan productos alternativos respecto al tratamiento de alimento balanceado únicamente.

Palabras clave: Cerdo, precebo, inmunomodulador, homeopatía, estrés.

Evaluation of the effect of alternative products on technical economic performance in precebo pigs

Abstract

Weaning causes an acute stress response due to the social, environmental and nutritional changes to which the piglets are exposed and, therefore, the present investigation has as objective to evaluate technically and economically the effect of two alternative products, immunomodulator and homeopathic, in pigs in the pre-boar phase. The activities of the experimental phase will be carried out during 42 days in the Academic and Investigation Unit MVZ Pigs of the UNIPAZ University Institute of La Paz, establishing a unifactorial randomized design, evaluating the alternative products (evaluation factor) through the answer expressed in the technical and economic parameters. The design will consist of three treatments, T1 (balanced feed), T2 (balanced feed with immunomodulator) and T3 (balanced feed with homeopathic), using 24 mestizo pigs (females and castrated males), which will be distributed in eight pigs per treatment, heavy previously with the purpose of homogenizing the batches of the treatments. Daily consumption information and diarrhea will be carried out, and on the other hand, weighings will be carried out every 14 days with the purpose of tabulating the information that allows determining the technical variables (food consumption, weight gain, conversion and frequency of diarrhea), and also, the economic variables (net cash profit, profit margin, profit / cost and net profit per animal). The information will be processed by non-parametric statistics through the Kruskal-Wallis test, and if necessary, the Bonferroni test, using the statistical software SPSS. It is expected that the technical and economic variables have a better behavior in the experimental treatments, that the alternative products have a better nutritional efficiency, expressed in a better behavior of the technical and economic variables in the treatments that use alternative products with respect to the food treatment balanced only.

Keywords: Pig, precebo, immunomodulator, homeopathy, stress.

**Evaluación productiva-nutricional de tres variedades de avena forrajera (*Avena sativa*) con niveles de ferti-riego hidropónico**

Horacio Rojas Cárdenas¹ y Ángela Paola Avendaño Higuera²

Docente Asistente Magister. Tiempo Completo.
Universidad Nacional Abierta y A distancia-UNAD-CEAD
Duitama. Mail: horacio.rojas@unad.edu.co. ²Asistente
Técnico Particular. Zootecnista. Egresado de la Universidad
Nacional Abierta y A distancia-UNAD- Duitama. Mail:
apaolita88@gmail.com

Resumen

El presente trabajo trata sobre la producción de forraje verde hidropónico, que es una técnica de cultivo sin tierra, donde se manejaron tres variedades de Avena forrajera (*Avena Sativa*), como fueron: Cayuse, Ever Leaf y Nativa, con el fin de evaluar producción de biomasa, calidad nutricional y costos de producción de cada variedad. La avena forrajera como forraje verde hidropónico (FVH), es un alimento fresco, palatable, de considerado valor proteico y de producción constante el cual se obtiene a partir de la germinación hidropónica de semillas o granos. Para desarrollar este trabajo se tuvo un período de duración de 14 días captando la energía del sol y asimilando los nutrientes de la solución nutritiva (ferti-riego, a base de humus de lombriz), y que se puede producir en cualquier época del año. El FVH, es una alternativa como suplementación animal y se puede utilizar en la alimentación de diferentes especies como ovinos, bovinos, porcinos, conejos, caballos y aves. La producción de FVH tiene como ventajas: alto valor proteico, alta digestibilidad, bajo costo de producción, producción durante todo el año, mínimo espacio de producción, fácil manejo y producción de forraje fresco. El trabajo se llevó a cabo en la granja del Colegio Institución Educativa Técnica de Monguí, (Boyacá), bajo condiciones de experimentación en invernadero teniendo en cuenta la misma Humedad relativa (HR) y Temperatura (T), ambiente, método de siembra de semillas y ferti-riego aplicado en varios niveles con el fin de analizar los diferentes efectos en cada uno de los tratamientos. Los tratamientos fueron con las tres variedades y la modificación estaba en el porcentaje del ferti-riego aplicado así:

T0 sin ferti-riego, T1 (25 %), T2 (50%) y T3 (75%) de ferti-riego. El tratamiento de mejor resultado en cantidad de biomasa fue T2 (Cayuse) con 6.14 kgs por bandeja; en referencia a la mejor calidad nutricional se consiguió con la variedad Ever leaf en todos los tratamientos. En cuanto a los costos de producción, no fue significativa la diferencia, aunque la variedad nativa, es menos costosa, pero no compensa con su valor nutricional.

Palabras clave: Hidropónico, biomasa, forraje, germinación, digestibilidad, calidad nutricional.

**Productive-nutritional evaluation of three varieties of feeding oat (*Avena sativa*) with levels of ferti-hydroponic riding****Abstract**

The present work deals with the production of hydroponic green forage, which is a landless cultivation technique, where three varieties of forage oats (*Avena sativa*) were managed, such as: Cayuse, Ever Leaf and Nativa, in order to evaluate production of biomass, nutritional quality and production costs of each variety. The forage oats as hydroponic green forage (HGF), is a fresh, palatable food of considered protein value and constant production which is obtained from the hydroponic germination of seeds or grains. In order to carry out this work, we had a period of 14 days, capturing the energy of the sun and assimilating the nutrients of the nutrient solution (ferti-irrigation, based on earthworm humus), which can be produced at any time of the year. The HGF, is an alternative as animal supplementation and can be used in the feeding of different species such as sheep, cattle, swine, rabbits, horses and birds. The production of HGF has as advantages: high protein value, high digestibility, low cost of production, production throughout the year, minimum production space, easy handling and production of fresh forage. The work was carried out in the farm of the Technical Educational Institution of Monguí, (Boyacá), under experimental conditions in greenhouse taking into account the same relative humidity (RH) and temperature (T), environment, seed sowing method and ferti-irrigation applied at several levels in order to analyze the different effects in each of the treatments. The treatments were with the three varieties and the modification was in the percentage of ferti-irrigation applied as follows: T0 without fertigation, T1 (25%), T2 (50%) and T3 (75%) of fertigation. The treatment with the best result in quantity of biomass was T2 (Cayuse) with 6.14 kg per tray; in reference to the best nutritional quality was achieved with the Ever leaf variety in all treatments. In terms of production costs, the difference was not significant, although the native variety is less expensive, but does not compensate with its nutritional value.

Keywords: Hydroponic, biomass, forage, germination, digestibility, nutritional quality.

Evaluación de las curvas de crecimiento y calidad nutricional de algunos forrajes de trópico alto

Avellaneda-Vargas Ivan¹, Sierra-Sanchez Luz-Andrea², Fonseca-López Dania³.

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia /
Grupo GIBNA. ¹ivan.avellaneda@uptc.edu.co;
²gibna.uptc@gmail.com; ³correodania@gmail.com

Resumen

La alimentación de los animales herbívoros o fitófagos depende del consumo de forraje disponible en las praderas, éste es un alimento otorgado por la naturaleza, donde predominan variedad de especies vegetales nativas o foráneas que se han adaptado a las condiciones medioambientales del mundo; el forraje es de disponibilidad temporal – ilimitada, con cualidades, requerimientos y manejo individuales. Esto implica que un óptimo manejo generará beneficios económicos y alimentos de calidad para la alimentación del ganado. En trópico alto, crecen gramíneas y leguminosas cuyo manejo afecta su rendimiento y la calidad nutricional. Por lo anterior, en este trabajo se evaluarán las curvas de crecimiento y calidad nutricional de las siguientes asociaciones: a) Kikuyo (*Pennisetum clandestinum*) + Trébol (*Trifolium* sp); b) Festuca (*Festuca arundinacea*) + Trebol (*Trifolium* sp.) y c) falsa poa (*Holcus lanatus*) + Trébol (*Trifolium* sp.). Para ello, se establecerán parcelas de 2x3m² con cuatro replicas, para un total de 12 unidades experimentales. Se determinará la correlación lineal del crecimiento, longitud de raíces, contenido de MS% y PC%; digestibilidad, cuantificación K-P y un análisis de la microbiología básica del suelo. La fertilización se hará conforme al estudio químico de este. Los datos serán analizados por ANOVA y la comparación de los promedios mediante la prueba de Tukey con un 95% de confiabilidad. Con este trabajo se generará conocimiento referente a la calidad nutricional en relación con la curva de crecimiento de las especies forrajeras más representativas del departamento de Boyacá.

Palabras clave: Pasto, cultivo *Pennisetum clandestinum*, *Trifolium* sp.

Evaluation of growth curves and nutritional quality of some high tropical forage

Abstract

The feeding of herbivorous or phytophagous animals depends on the consumption of fodder available in the meadows, this is a food provided by nature, where a variety of native or foreign plant species predominate that have adapted to the environmental conditions of the world; the forage is of temporary availability - unlimited, with qualities, requirements and individual management. This implies that optimal management will generate economic benefits and quality food for livestock feed. In high tropics, grasses and legumes grow, whose management affects their yield and nutritional quality. Therefore, in this work the growth and nutritional quality curves of the following associations will be evaluated: a) Kikuyo (*Pennisetum clandestinum*) + Clover (*Trifolium* sp); b) Festuca (*Festuca arundinacea*) + Clover (*Trifolium* sp.) and c) false poa (*Holcus lanatus*) + Clover (*Trifolium* sp.). For this, plots of 2x3m² with four replicas will be established, for a total of 12 experimental units. The linear correlation of growth, root length, MS% content and PC% will be determined; digestibility, K-P quantification and an analysis of the basic soil microbiology. The fertilization will be done according to the chemical study of this. The data will be analyzed by ANOVA and the comparison of the averages using the Tukey test with 95% reliability. This work will generate knowledge regarding nutritional quality in relation to the growth curve of the most representative forage species of the department of Boyacá.

Keywords: Grass, farming, *Pennisetum clandestinum*, *Trifolium* sp.

Efecto de suplementación con frijol caupí sobre valores hemáticos en tilapia roja (*Oreochromis spp*)

Iván Fidel Rocha Paba¹, MVZ Esp. Ricci Terraza Martínez¹, Bacteriólogo; Jorge Humberto Contreras Castro¹, Biol.

Instituto Universitario de la Paz. ¹Grupo de Investigación en Producción y Ciencia Animal (PROCA), Docente Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Instituto Universitario de la Paz, Barrancabermeja, Colombia. e-mail: ivan.rocha@unipaz.edu.co

Resumen

La acuicultura es considerada una de las potencias productivas en América Latina, mostrando un acelerado crecimiento en Colombia. La alimentación en la producción piscícola a base de concentrado comercial representa un alto costo de producción, conllevando a la implementación de dietas alternativas que por sus propiedades proteicas pretenden reducir los costos cumpliendo la función alimenticia esperada, garantizando un adecuado suministro y balance de nutrientes. El trabajo se realizó en instalaciones del instituto universitario de la paz (UNIPAZ), en estanque de tierra ubicado en la Unidad Académica y de Investigación MVZ Peces. El objetivo de la investigación consistió en evaluar el efecto de la suplementación con frijol Caupí al 20% y 40% sobre valores hemáticos de tilapia roja (*Oreochromis sp*) en etapa de ceba. Se utilizaron 300 tilapias en tres tratamientos, con dos replicas cada uno, compuestas por 50 tilapias/replica seleccionadas al azar, se suministró, T0 100% alimento balanceado; T1 20% frijol y 80% alimento balanceado; T2 40% frijol y 60% alimento balanceado, alimentados 4 veces/día durante 30 días. La toma de muestra se realizó en la vena caudal en tubos con anticoagulante EDTA, almacenadas a 2°C, transportadas a la clínica veterinaria de pequeños animales UNIPAZ, para obtener los resultados de los valores hematológicos. El análisis estadístico se hizo en inferencial a través de la prueba de hipótesis, para lo cual se realizó la comparación de medias entre tratamientos a través del análisis de varianza (ANOVA) de clasificación simple, utilizando para ello, el software estadístico SPSS Statistics 21.0. Para todas las inferencias se

estipuló una probabilidad de 0.05, intervalo de confianza para la media al 95%. El estudio reveló que las variables plaquetas y neutrófilos entre tratamientos disminuyeron respecto al tratamiento control (T0); así mismo variables como linfocitos y monocitos presentaron aumento respecto al tratamiento control (T0). Las variables hematocrito, hemoglobina, recuento total de glóbulos blancos y diferencial de eosinófilos, aunque presentaron algunas diferencias numéricas, no se encontraron diferencias significativas entre los tres tratamientos. La suplementación con frijol caupí en tilapia roja (*Oreochromis spp*) afecta los valores hemáticos en términos de las variables plaquetas, neutrófilos, linfocitos y monocitos.

Palabras clave: Tilapia, frijol caupí, sangre, alteración, suplemento.

**Effect of supplementation with caupí bean on hematological values in red tilapia (*Oreochromis spp*)****Abstract**

Aquaculture is considered one of the productive powers in Latin America, showing an accelerated growth in Colombia. Feeding in fish production based on commercial concentrate represents a high cost of production, leading to the implementation of alternative diets that for their protein properties aim to reduce costs by fulfilling the expected food function, ensuring an adequate supply and balance of nutrients. The work was carried out in facilities of the university institute of peace (UNIPAZ), in an earthen pond located in the Academic and Investigation Unit MVZ Peces. The objective of the research consisted of evaluating the effect of the 20% and 40% Caupí bean supplementation on blood values of red tilapia (*Oreochromis sp*) in the fattening stage. 300 tilapias were used in three treatments, with two replicates each, composed of 50 tilapia / replica selected at random, T0 100% balanced feed was supplied; T1 20% beans and 80% balanced feed; T2 40% beans and 60% balanced feed, fed 4 times / day for 30 days. The sample was taken in the caudal vein in tubes with EDTA anticoagulant, stored at 2 ° c, transported to the veterinary clinic of small animals UNIPAZ, to obtain the results of the hematological values. The statistical analysis was made in inferential through the test of hypothesis, for which the comparison of means between treatments was performed through the analysis of variance (ANOVA) of simple classification, using for it, the statistical software SPSS Statistics 21.0. For all inferences, a probability of 0.05, confidence interval for the mean of 95%, was stipulated. The study revealed that the platelet and neutrophil variables between treatments decreased with respect to the control treatment (T0); Likewise, variables such as lymphocytes and monocytes showed an increase with respect to the control treatment (T0). The variables hematocrit, hemoglobin, total white blood cell count and differential of eosinophils, although they presented some numerical differences, no significant differences were found between the three treatments. The supplementation with

cowpea beans in red tilapia (*Oreochromis spp*) affects the blood values in terms of the variables platelets, neutrophils, lymphocytes and monocytes.

Keywords: Tilapia, cowpea bean, blood, alteration, supplements.

Evaluación de ensilajes de *Pennisetum purpureum* y *Tithonia diversifolia*: emisión de metano *in vitro* y ganancia de peso en ovinos

María Alexandra Huertas, Vilma A. Holguín y
Jairo Mora-Delgado

Universidad del Tolima, Grupo de Investigación Sistemas
Agroforestales Pecuarios jrmora@ut.edu.co

Resumen

El objetivo de este estudio fue evaluar la ganancia de peso y la emisión de metano *in vitro* de mezclas de *Pennisetum purpureum* (P) y *Tithonia diversifolia* (T) en ensilaje. La producción de metano se evaluó en ensilajes con cuatro proporciones T/P, a saber: TP-100/0; TP-67/33; TP-33/67; y TP-0/100 (peso fresco). La producción de gas *in vitro* se midió por triplicado a las 3, 6, 12, 24, 33 y 48 horas, en Corpoica-Tibaitatá. Se utilizó un diseño experimental de dos factores donde el primer factor fue el nivel de inclusión de T/P, y el segundo el tipo de inoculante utilizado. Para la respuesta animal, se realizó un ensayo en la Universidad Nacional de Colombia-Palmira para evaluar el efecto de la alimentación con ensilajes de P/T (T1), comparados con un control de *P. purpureum* al 100% (T2). Se emplearon 10 ovinos mestizos de razas tropicales con peso promedio de 23 kg, divididos en dos tratamientos. Los ensilajes se suministraron como ración base durante 61 días y se suministró un complemento energético de harina de arroz y sal mineral a voluntad. Se midió peso de los animales al inicio, intermedio y final del experimento; el consumo se midió diariamente en dos suministros. Los datos se analizaron en un diseño totalmente al azar con cinco repeticiones; se hizo un Andeva y la prueba de Tukey para la diferencia de medias. La ganancia diaria de peso fue positiva con 55 g /animal/día para el tratamiento T2, respecto a una ganancia negativa para T1. En la producción de metano, hubo diferencias ($P=0,0001$) entre tratamientos y entre horas de fermentación, pero la interacción entre tratamiento*horas no muestra diferencias. El ensilaje (TP-0/100), presentó la mayor emisión de metano, con diferencias significativas frente a los que contienen mayor proporción de *T. diversifolia* (TP-100/0; TP-67/33, en un 17% y 30% por encima,

respectivamente). Se concluye, que la proporción ideal en el ensilaje por su mayor alta digestibilidad y menor emisión de metano fue TP-67/33. La dieta de ensilaje *P. purpureum/ T. diversifolia* (TP-67/33) en ovinos, incrementa el peso corporal a niveles de suplementos de alta calidad proteica.

Palabras clave: Ovinocultura; forrajes leñosos; digestibilidad; GEI

Evaluation of silages of *Pennisetum purpureum* and *Tithonia diversifolia*: *in vitro* methane emission and weight gain in sheep

Abstract

The objective of this study was to evaluate the weight gain and *in vitro* methane emission of mixtures of *Pennisetum purpureum* (P) and *Tithonia diversifolia* (T) in silage. Methane production was evaluated in silages with four T / P ratios, namely: TP-100/0; TP-67/33; TP-33/67; and TP-0/100 (fresh weight). The production of *in vitro* gas was measured in triplicate at 3, 6, 12, 24, 33 and 48 hours, in Corpoica-Tibaitatá. A two-factor experimental design was used where the first factor was the inclusion level of T / P, and the second the type of inoculant used. For the animal response, an assay was conducted at the National University of Colombia-Palmira to evaluate the effect of feeding with S / T silages (T1), compared with a control of 100% *P. purpureum* (T2). We used 10 mestizo sheep of tropical breeds with an average weight of 23 kg, divided into two treatments. The silages were supplied as a base ration for 61 days and an energy supplement of rice flour and mineral salt was supplied ad libitum. Weight of the animals was measured at the beginning, intermediate and end of the experiment; Consumption was measured daily in two supplies. The data was analyzed in a totally randomized design with five repetitions; Andeva was made and Tukey's test for the difference of means. The daily weight gain was positive with 55 g / animal / day for the T2 treatment, with respect to a negative gain for T1. In methane production, there were differences ($P = 0.0001$) between treatments and between fermentation hours, but the interaction between treatment * hours does not show differences. Silage (TP-0/100), presented the highest methane emission, with significant differences compared to those containing a higher proportion of *T. diversifolia* (TP-100/0, TP-67/33, by 17% and 30%). % above, respectively). It is concluded that the ideal proportion in the silage due to its higher digestibility and lower methane emission was TP-67/33. The silage diet *P. purpureum* / *T. diversifolia* (TP-67/33) in sheep, increases the body weight to levels of supplements of high protein quality.

Keywords: Ovine culture; woody fodder; digestibility; GEI



Alimentación natural en sistemas de producción de trucha arcoíris

Joel Hernando Méndez Ordúz, María Fernanda Estupiñan Botía, Leonardo Avendaño Vásquez

Semillero de Investigación Yaskua. Programa de Zootecnia – IPRED- Centro de Investigaciones para el Desarrollo Agroindustrial (CIAGRO) - Universidad Industrial de Santander- Sede Málaga,
Santander. joel.h.mo@hotmail.com,
mafestupinan@hotmail.com,
lavandanov2005@hotmail.com

Resumen

Las alternativas de alimentación en sistemas de producción de peces en áreas de alta montaña son muy pocas o desconocidas, tienen dificultades para acceder o transportar suministros y alimentos convencionales; sin embargo las zonas tienen agua fresca y abundante de forma natural debido a las condiciones atmosféricas y ecológicas del ecosistema, abundan también otros organismos como el crustáceo de agua dulce *Gammarus lacustris*, pequeño crustáceo de 4mm con un alto potencial biótico para alimento de anfibios, pantano aves y truchas silvestres, con un valor biológico de 40% de proteína altamente digerible y adaptabilidad a condiciones de cautiverio. La trucha arcoíris (*Onchorhynchus mykiss*) representa una de las especies de peces más importantes en el sector de producción de alimentos para el consumo nacional y la exportación, además de ser un multiplicador de la economía local que contribuye a la superación de la pobreza en las zonas rurales. Por lo tanto, el presente trabajo tiene como objetivo evaluar la inclusión de *Gammarus lacustris*, como un suplemento dietético en la trucha arco iris. 135 Juveniles de trucha arcoíris se colocarán en una batería de 9 unidades experimentales de 60 L, con un sistema de recirculación de agua tratada por filtro biológico, bajo un diseño completamente aleatorizado (CRD). Los animales serán sometidos a los tratamientos: (T1 = 100% de concentrado comercial, T2 = 75% de concentrado comercial y 25% de alimento vivo, T3 = 50% de concentrado comercial + 50% de alimento vivo). Se determinará el aumento de peso, la tasa de crecimiento específico, el factor de conversión de alimentos, la tasa de eficiencia de proteína, la

longitud total y la longitud estándar. Los resultados de las variables consideradas se presentarán como el promedio \pm DE. Todos los datos de las diferentes variables se someterán al análisis de varianza (ANOVA de una vía), seguido de la prueba de Tukey para determinar la importancia de las diferencias entre los tratamientos; para todas las variables consideradas en este experimento, el nivel de significación será P <0.05. Se espera obtener resultados significativos en los parámetros productivos de los animales con *Gammarus lacustris*.

Palabras clave: Pez, nutrición, requerimientos, producción, *Gammarus lacustris*.

Natural Feeding in Rainbow Trout Production Systems

Abstract

The alternatives of feeding in fish production systems in high mountain areas are very few or not known, they have difficulties in accessing or transporting supplies and conventional foods; nevertheless the zones have fresh and abundant water in a natural way due to the atmospheric and ecological conditions of the ecosystem, also abounding other organisms such as the freshwater crustacean *Gammarus lacustris*, small crustacean of 4mm with a high biotic potential for food of amphibians, swamp birds and wildlife trout, with a biological value of 40% highly digestible protein and adaptability to captive conditions. The rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) represents one of the most important fish species in the food production sector for national consumption and export, besides being a multiplier of the local economy that contribute to overcoming poverty in rural areas. Therefore, the present work aims to evaluate the inclusion of *Gammarus lacustris*, as a dietary supplement in rainbow trout. 135 Juveniles of Rainbow Trout will be placed in a battery of 9 experimental units of 60 L, with a water recirculation system, treated by biological filter, under a completely randomized design (CRD). The animals will be subjected to the treatments: (T1 = 100% Commercial Concentrate, T2 = 75% Commercial concentrate and 25% Live food, T3 = 50% Commercial Concentrate + 50% Live food). The Weight Gain, Specific Growth Rate, Food Conversion Factor, Protein Efficiency Rate, Total Length and Standard Length will be determined. The results of the variables considered will be presented as the average \pm SD. All data of the different variables will be subjected to variance analysis (one-way ANOVA), followed by the Tukey test to determine the significance of the differences between treatments; for all the variables considered in this experiment, the significance level will be $P < 0.05$. It is expected to obtain significant results in the productive parameters of the animals with *Gammarus lacustris*.

Keywords: Fish, Nutrition, Requirements, Production, *Gammarus lacustris*.

Evaluación de la fermentación por ensilado de desechos orgánicos de plazas de mercado para alimentación animal

¹Jorge Eduardo Cardona Lancheros, ²Octavio Jaramillo A, ³José Ariel Galvis González.

¹Ingeniero de Alimentos, Magister en Biotecnología, investigador Universidad Católica de Pereira. Grupo de investigación en Desarrollo Empresarial.

jecardon@misena.edu.co. ²Medico Veterinario,

Especialista Nutrición Animal, investigador Universidad Católica de Pereira. Grupo de investigación en Desarrollo Empresarial. ojaramilloa@misena.edu.co. ³Administrador de Empresas, Líder Grupo de investigación en Desarrollo Empresarial. Universidad Católica de Pereira.

ariel.galvis@ucp.edu.co.

Resumen

En las plazas de mercado se producen volúmenes considerables de residuos sólidos los cuales son una de las principales causas que contribuyen a la contaminación ambiental. En las centrales de abastos mayorista y minorista de la ciudad de Pereira, se presenta una situación ambiental preocupante como quiera que no se realiza correctamente el manejo integral de los residuos sólidos que allí se generan. El objetivo de la investigación es realizar la identificación y caracterización de los residuos orgánicos generados en las centrales mayorista y minorista con potencial para obtención de alimento para ganado, seleccionar los residuos orgánicos pertinentes de acuerdo a sus características nutricionales para la alimentación animal, desarrollar el prototipo para la nutrición de ganado vacuno y su validación en campo. La metodología a realizar en el proyecto, se basa en: planteamiento del diseño experimental a llevar a cabo de acuerdo a los factores nutricionales a tener en cuenta, ensilaje de los productos según la técnica de ensilaje húmedo de tubérculos por métodos separados y combinados, realización de análisis bromatológicos de los ensilajes resultantes para evaluar materia seca (MS), proteína cruda (PC), energía neta (EN), fibra detergente neutro (FDN) y fibra detergente ácido (FDA), realización de pruebas y ajustes a la palatabilidad del producto ensilado. Los resultados esperados son: caracterización de los residuos orgánicos provenientes de plazas de mercado, metodología de fermentación por

ensilaje y evaluación de los productos obtenidos en el ensilaje.

Palabras clave: Ensilaje, residuos orgánicos, fermentación.

Evaluation of the fermentation by silage of organic waste of market places for animal feeding

Abstract

In greengrocers, considerable volumes of solid waste are produced, which are one of the main causes that contribute to environmental pollution. In the wholesale and retail supply centers of the city of Pereira, there is a worrying environmental situation, since the integral management of the solid waste generated there is not properly carried out. The objective of the research is to identify and characterize the organic waste generated in the wholesale and retail plants with the potential to obtain feed for livestock, select the relevant organic waste according to their nutritional characteristics for animal feed, and develop the prototype for the nutrition of cattle and its validation in the field. The methodology to be carried out in the project is based on: experimental design approach to be carried out according to the nutritional factors to be taken into account, silage of the products according to the wet silage technique of tubers by separate and combined methods, implementation of bromatological analyzes of the resulting silages to evaluate dry matter (DM), raw protein (RP), net energy (NE), neutral detergent fiber (NDF) and acid detergent fiber (ADF), testing and adjustments to the palatability of the silage product. The expected results are: characterization of organic waste from market places, fermentation methodology by silage and evaluation of the products obtained in the silage.

Keywords: Silage, organic waste, fermentation.

Efectos de la suplementación pre y posparto con selenio en ovejas

Abd El-Ghany Hefnawy¹; Raquel López Arellano²; Alma Revilla Vázquez²; Arturo Trejo González²; Efrén Ramírez Bribiesca³; Jorge L. Tórtora Pérez².

¹Fac.Vet.Med., Univ. Benha Branch, Egipto; ²Facultad de Estudios Superiores-Cuautitlán, UNAM, México; ³Colegio de Posgraduados Chapingo, México. E.mail: tortora@unam.mx

Resumen

Se emplearon 32 ovejas Pelibuey primas, divididas en tres grupos, uno suplementado subcutáneo (SC) con 0.1 mg de selenito de sodio por kilo de peso vivo (K/PV), en la 7ma y 4ta semana preparto y en la 1era posparto. El segundo con 3mg de selenito en agua, por sonda, una vez por semana, en las 7 semanas preparto (SO) y el tercero control (C). Se determinó el Se en líquido alantoideo, obtenido por punción transabdominal, calostro, leche y plasma de las ovejas y sus corderos, las muestras se tomaron en las 8 semanas pre y posparto. Los niveles de Se en todas las muestras fueron mayores en los animales suplementados que en los controles ($p < 0.05$). Se observó una correlación positiva entre la edad de gestación y la concentración de Se en el líquido alantoideo ($r = 0.92$ a 0.96 ; $p < 0.05$) y entre la de la leche y el plasma de los corderos ($r = 0.57$ a 0.73 ; $p < 0.05$) y las madres ($r = 0.66$ a 95 ; $p < 0.05$) en los grupos suplementados, mientras que fue negativa en el grupo control ($r = -0.60$; $p < 0.05$). La concentración de Se en la leche y el plasma de los corderos fue mayor en el grupo SC que en SO ($p < 0.05$), en las dos primeras semanas posparto. La suplementación mantuvo los niveles plasmáticos de Se de las ovejas ante y posparto y mejoró los de la leche y el plasma de los corderos. La determinación de Se en el líquido alantoideo se confirmó como un buen indicador de la condición del feto y podría actuar como un reservorio del elemento para el feto.

Palabras clave: Ovinos, selenio (Se), fetos, alantoides, amnios.

Effect of pre and postpartum selenium supplementation in sheep

Abstract

32 Pelibuey primas were used, divided into three groups, one supplemented subcutaneous (SC) with 0.1 mg of sodium selenite per kilo of live weight (K / PV), in the 7th and 4th prepartum week and in the 1st postpartum. The second with 3mg of selenite in water, by tube, once a week, in the 7 weeks prepartum (SO) and the third control (C). The Se was determined in allantoic fluid, obtained by transabdominal puncture, colostrum, milk and plasma of the sheep and their lambs, the samples were taken in the 8 weeks before and after delivery. The Se levels in all the samples were higher in the supplemented animals than in the controls ($p < 0.05$). A positive correlation was observed between the gestational age and the concentration of Se in the allantoic fluid ($r = 0.92$ to 0.96 , $p < 0.05$) and between that of the milk and the plasma of the lambs ($r = 0.57$ to 0.73 ; <0.05) and mothers ($r = 0.66$ to 95 , $p < 0.05$) in the supplemented groups, while it was negative in the control group ($r = -0.60$, $p < 0.05$). The concentration of Se in the milk and plasma of the lambs was higher in the SC group than in the SO group ($p < 0.05$), in the first two postpartum weeks. The supplementation maintained the Se plasmatic levels of the ante and postpartum sheep and improved those of the milk and plasma of the lambs. The determination of Se in the allantoic fluid was confirmed as a good indicator of the condition of the fetus and could act as a reservoir of the element for the fetus.

Keywords: Sheep, selenium (Se), fetal, allantois, amnions.

Efecto de la suplementación con selenio (Se) preparto, sobre los niveles en plasma de selenio y T3 en ovejas y sus corderos recién nacidos

Abd Elghany-Hefnawy¹; Carlos Valverde Rodríguez² y Jorge Tórtora Pérez³.

¹Fac. Vet. Med., Univ. Benha Branch, Egipto; ²Instituto de Neurobiología, UNAM. ³Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, Universidad Nacional Autónoma de México; MÉXICO. E-Mail: tortora@unam.mx

Resumen

El Se es parte de la peroxidasa tiroidea y de tres deyodinazas, su actividad se considera tan crítica en la función tiroidea como la del yodo. Se evaluó la concentración en plasma y leche de Se y en suero de T3, en ovejas suplementadas y sus corderos recién nacidos. En veinte ovejas gestantes, en dos grupos, un grupo se suplementó por vía subcutánea (0.1 mg de selenito sódico / kg PV) en la 7ma y 4ta. semanas ante parto y en la primera semana postparto y otro fue control. Se tomaron muestras de plasma y suero en la 5ta y 2da semana anteparto, al parto y en la 1^a, 2^a, 4^a, 6^a y 8^a semanas después del parto, se tomaron muestras de plasma, suero, calostro y leche; en los corderos recién nacidos de plasma y suero a las 48 horas y 1^a, 2^a, 3^a, 5^a y 8^a semana postparto. Aumentó la concentración de T3 en las ovejas y hasta la octava semana posparto en los corderos, del grupo suplementado, comparado con el control ($p < 0.001$). Hubo una relación positiva entre Se en plasma y T3 en el suero, en ambos grupos ($r = 0.69$ a 0.72 , $p < 0.05$). Y una relación positiva entre la concentración de Se en leche y T3 sérica, en los corderos recién nacidos del grupo suplementado ($r = 0.84$, $p < 0.01$), contra una relación negativa en el grupo control ($r = -0.89$, $p < 0.01$). La suplementación de Se pre y posparto mantuvo los niveles de T3 en ovejas y corderos recién nacidos, hasta la octava semana postparto.

Palabras clave: Ovinos, selenio (Se), tiroides, T3.

Effect of prepartum selenium (Se) supplementation on plasma selenium and T3 levels relationships in ewes and their newborn lambs

Abstract

Se is part of thyroid peroxidase and three deyodinases, its activity is considered as critical in thyroid function as that of iodine. The concentration in plasma and milk of Se and serum of T3, in supplemented sheep and their newborn lambs were evaluated. In twenty pregnant sheep, in two groups, one group was supplemented subcutaneously (0.1 mg sodium selenite / kg PV) in the 7th and 4th. weeks before delivery and in the first week postpartum and another was control. Plasma and serum samples were taken in the 5th and 2nd week before birth, at parturition and in the 1st, 2nd, 4th, 6th and 8th weeks after delivery, samples of plasma, serum, colostrum and milk were taken; in newborn lambs plasma and serum at 48 hours and 1a, 2a, 3a, 5a and 8a, week postpartum. The concentration of T3 in the sheep increased until the eighth week postpartum in the lambs of the supplemented group, compared with the control ($p < 0.001$). There was a positive relationship between Se in plasma and T3 in serum, in both groups ($r = 0.69$ to 0.72 , $p < 0.05$). And a positive relationship between the concentration of Se in milk and serum T3, in newborn lambs of the supplemented group ($r = 0.84$, $p < 0.01$), against a negative relationship in the control group ($r = -0.89$, $p < 0.01$). Pre and post-partum supplementation maintained T3 levels in newborn sheep and lambs until the eighth week postpartum.

Keywords: Sheep, selenium (Se), thyroid, T3.

Comportamiento del pasto Kikuyo bajo condiciones de sombra y sin sombra

Jorge Fernando Triana Valenzuela¹, Alexander Navas Panadero², María Alejandra Castañeyras³, Laura Fernanda Aragón⁴

¹Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad de La Salle, jtriana@unisalle.edu.co. ²Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad de La Salle, anavas@unisalle.edu.co. ³Estudiante Medicina Veterinaria, Universidad de La Salle, mcastaneyras57@unisalle.edu.co.

⁴Estudiante Zootecnia, Universidad de La Salle, laragon05@unisalle.edu.co

Resumen

La lechería especializada en Colombia produce cerca del 50% de la leche del país y la alimentación de sus animales está basada fundamentalmente en el consumo directo de praderas permanentes. Adicionalmente, la producción de estos sistemas es altamente dependiente no solo de la biomasa consumida (consumo voluntario), sino de la calidad del forraje disponible. En Colombia, el pasto Kikuyo - *Cenchrus clandestinus* (Hoechst. Ex Chiov) - anteriormente denominado *Pennisetum clandestinum*, se ha constituido en la base de la alimentación de estos sistemas, ya que su hábito de crecimiento lo hace sumamente agresivo ante la invasión de otras especies forrajeras, posee una alta resistencia al pisoteo y ofertado en las edades fenológicas adecuadas, ofrece calidades nutricionales óptimas para los animales. Sin embargo, cerca de 70.000 hectáreas de praderas de kikuyo en la Sabana de Bogotá muestran bajo potencial productivo debido a su inadecuada utilización, resultando en bajas producciones de forraje, bajas cargas animales y producción láctea deficiente. Por lo anterior, se decidió realizar un trabajo en el Centro de Investigación y Capacitación de la Universidad de La Salle, ubicado en la vereda Aposentos del municipio de Briceño – Cundinamarca, para estudiar la dinámica de crecimiento de esta especie y su calidad composicional en diferentes edades fenológicas (15, 30, 45 y 60 días). Adicionalmente, se realizaron dos tratamientos, el primero bajo condiciones de sombra en asociación con árboles de acacia japonesa (*Acacia melanoxylon*) y el segundo bajo condiciones

normales de cielo abierto. Se realizaron tres repeticiones las cuales concluyeron en el mes de junio de 2018 y actualmente se están realizando los análisis de química húmeda. Además, se realizaron mediciones de índice de área foliar, composición botánica, alturas sin disturbar y alturas comprimidas para realizar la curva de calibración de un pasturómetro (Rising plate meter). Se espera que los resultados ayuden a ajustar los sistemas de pastoreo, buscando los puntos óptimos de pastoreo que garanticen un máximo aporte de nutrientes en el año.

Palabras clave: Forrajes, ganadería, pasturas, dinámica de crecimiento, pastoreo

Agradecimientos

Especial agradecimiento al Centro de Investigación y Capacitación Santa María del Puyón de la Universidad de La Salle.

Performance of Kikuyu forages under shadow and non-shadow conditions

Abstract

The specialized dairy in Colombia produces about 50% of the country's milk and the feeding of its animals is based mainly on the direct consumption of permanent pastures. Additionally, the production of these systems is highly dependent not only on the biomass consumed (voluntary consumption), but on the quality of the available forage. In Colombia, the grass Kikuyu - *Cenchrus clandestinus* (Hoechst, Ex Chiov) - formerly called *Pennisetum clandestinum*, has become the basis of the feeding of these systems, since its habit of growth makes it extremely aggressive before the invasion of other species forage, has a high resistance to trampling and offered at the right phenological ages, offers optimum nutritional qualities for animals. However, about 70,000 hectares of Kikuyu grasslands in the Sabana de Bogotá show low productive potential due to their inadequate utilization, resulting in low forage production, low animal loads and poor milk production. Therefore, it was decided to carry out a work in the Research and Training Center of the University of La Salle, located in the village of the municipality of Briceño - Cundinamarca, to study the growth dynamics of this species and its compositional quality in different phenological ages (15, 30, 45 and 60 days). Additionally, two treatments were carried out, the first under shade conditions in association with Japanese acacia trees (*Acacia melanoxylon*) and the second under normal open sky conditions. Three repetitions were made, which ended in June 2018 and wet chemistry analyzes are currently underway. In addition, measurements of leaf area index, botanical composition, undisturbed heights and compressed heights were made to perform the calibration curve of a rising plate meter. It is expected that the results will help to adjust the grazing systems, looking for optimal grazing points that guarantee a maximum supply of nutrients during the year.

Keywords: Forages, cattle, pastures, growth dynamics, grazing.

Edad fenológica y niveles de inclusión de *Sambucus nigra* sobre la fermentación *in vitro*

José Andrés Tabla Rojas¹, Hugo Sánchez Guerreo²

¹Zootecnista, Estudiante Maestría en Ciencias Agrarias Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira.
Email: jatablar@unal.edu.co. ²Profesor Asociado, Departamento de Ciencia Animal, Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira. Email: hsanchezgu@unal.edu.co

Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo evaluar mediante análisis *in vitro*, el efecto del estado fenológico y los niveles de inclusión de *Sambucus nigra* sobre la producción de metano ($\text{CH}_4 \text{ ml/g MSd}$), digestibilidad de la materia seca (%DIVMS) y producción de ácidos grasos volátiles (AGV). La investigación se desarrolla en el laboratorio de nutrición animal de la Universidad de Nariño. Se evaluarán tres edades fenológicas prefloración, floración y fructificación, y a cada edad se le incluyó tres niveles (10, 20 y 30 %). Se obtuvieron 9 tratamientos y se realizó 5 réplicas por tratamiento. Los datos son procesados con base en la prueba de comparaciones planeadas, a través del software R PROJECT 3.5. Se espera que la producción de metano, la digestibilidad de la materia seca y la proporción molar de AGV (%), estén afectadas por la edad fenológica, niveles de inclusión o por la interacción de los dos factores, y con ello concluir si el *Sambucus nigra* podría ser usado en sistemas de pastoreo como una estrategia para reducir emisiones de metano, sin detrimento de la fermentación ruminal.

Palabras clave: Rumiantes, metano, AGV, DIVMS, metabolitos secundarios.

Agradecimientos

Grupo de investigación: Conservación, mejoramiento y utilización del ganado criollo hartón del valle y otros recursos genéticos animales en el suroccidente colombiano.

***Financiación:** Convocatoria nacional de proyectos para el fortalecimiento de la investigación, creación e innovación de la Universidad Nacional de Colombia 2016-2018.

Phenological Age and inclusion levels of *Sambucus nigra* on *in vitro* fermentation

Abstract

The objective of this work is to evaluate, through *in vitro* analysis, the effect of phenological status and inclusion levels of *Sambucus nigra* on methane production ($\text{CH}_4 \text{ ml/g MSd}$), dry matter digestibility (% DIVDM) and production of volatile fatty acids (VFA). The research is developed in the animal nutrition laboratory of the University of Nariño. Three pre-flowering, flowering and fruiting phenological ages will be evaluated, and at each age three levels were included (10, 20 and 30%). 9 treatments were obtained and 5 replications were made per treatment. The data is processed based on the test of planned comparisons, through the software R PROJECT 3.5. It is expected that the production of methane, the digestibility of the dry matter and the molar proportion of VFA (%), are affected by the phenological age, inclusion levels or by the interaction of the two factors, and thus conclude if the *Sambucus nigra* could be used in grazing systems as a strategy to reduce methane emissions, without detriment to ruminal fermentation.

Keywords: Ruminants, methane, AGV, DIVMS, secondary metabolites.

Estado nutricional de ovejas de lana en sistemas extensivos en Cerrito-Santander

Juan Alejandro Cano Quintero, Mónica Lizeth Higuera García, Leonardo Avendaño Vásquez

Semillero de Investigación Yaskua. Programa de Zootecnia – IPRED- Centro de Investigaciones para el Desarrollo Agroindustrial (CIAGRO) - Universidad Industrial de Santander- Sede Málaga, Santander.
alejo_9403@hotmail.com molijaga@gmail.com.
lavendanov2005@hotmail.com.

Resumen

Algunas producciones de ovejas se establecen en áreas con suelos infértilles, por lo tanto, los sistemas de alimentación son de baja calidad, con deficiencias en la palatabilidad y difíciles de mantener. La evaluación de los metabolitos sanguíneos ha permitido diagnosticar, prevenir y corregir los desequilibrios nutricionales que afectan el estado productivo y reproductivo de la piara. Glucosa, BUN, proteínas totales y albúmina permiten establecer el grado de adaptación metabólica y la homeostasis de los procesos bioquímicos del organismo de un animal o un grupo de animales. No hay referencias que describan el estado metabólico de la raza *Corridale* en el área Cerrito-Santander, ni otras, con características climáticas y productivas similares. 20 Ovinos machos de la raza *Corridale* con una condición corporal mayor a 2.5 y menor 3.5, con membranas mucosas rosadas en grado 1 o 2 según el método Famacha® y peso entre 15 y 20 kg, serán evaluados trimestralmente por un año. Las muestras de sangre de la punción venosa yugular se recogerán y se centrifugarán y se congelarán a -20 °C para su posterior análisis. Se determinarán glucosa, albúmina, proteínas totales, BUN y colesterol, utilizando un espectrofotómetro Genesys 10 S UV.Vis y reactivos para el análisis metabólico de casas comerciales certificadas. Para determinar el contenido nutricional de los forrajes, se realizarán análisis bromatológicos evaluando los porcentajes de: materia seca, extracto etéreo, proteína bruta, extracto no nitrogenado, energía bruta. Las variables Condición corporal, Peso vivo, Concentraciones sanguíneas de glucosa, albúmina, proteínas totales, colesterol y BUN, se analizarán por medio de estadísticas descriptivas

basadas en el promedio (X) y la desviación estándar (DE), un análisis de varianza unidireccional realizarse (ANOVA), para determinar las variaciones en los indicadores metabólicos relacionados durante el año y el día y hora de recolección de la muestra, a lo largo del experimento; con un intervalo de confianza del 95%. El análisis se realizará a través del programa SPSS. El perfil metabólico determinará el estado nutricional y la dinámica metabólica, para tomar medidas en el manejo de la nutrición animal.

Palabras clave: Nutrición, bienestar animal, gestión, Santander, raza.

**Nutritional status of wool sheep in extensive systems in Cerrito-Santander****Abstract**

Some sheep productions are established in areas with infertile soils, therefore the feeding systems are of low quality, with deficiencies in palatability and difficult to sustain. The evaluation of blood metabolites has allowed diagnosing, preventing and correcting nutritional imbalances that affect the productive and reproductive state of the herd. Glucose, BUN, total proteins and albumin allow to establish the degree of metabolic adaptation and homeostasis of the biochemical processes of the organism of an animal or a group of animals. There are no references that describe the metabolic state of the *Corridale* race in the Cerrito-Santander area, nor others, with similar climatic and productive characteristics. 20 Male sheep of the *Corridale* breed with body condition higher than 2.5 and lower 3.5, with pink mucous membranes in grade 1 or 2 according to the Famacha® method and weight between 15 and 20 kg, will be evaluated quarterly for one year. Blood samples from jugular venipuncture will be collected and centrifuged and frozen at -20 °C for further analysis. Glucose, albumin, total proteins, BUN and cholesterol will be determined, using a Genesys 10 S UV.Vis spectrophotometer, and reagents for metabolic analysis of certified commercial houses. To determine the nutritional content of the forages, bromatological analyzes will be carried out evaluating the percentages of: dry matter, ethereal extract, crude protein, non-nitrogenous extract, gross energy. The variables Body Condition, Live Weight, blood concentrations of glucose, albumin, total proteins, cholesterol and BUN, will be analyzed by means of descriptive statistics based on average (X) and standard deviation (SD), an one way analysis of variance will be performed (ANOVA), to determine the variations in the related metabolic indicators during the year and the day and hour of collection of the sample, throughout the experiment; with a confidence interval of 95%. The analysis will be done through the SPSS program. The metabolic profile will determine the nutritional status and metabolic dynamics, to take action in the management of animal nutrition.

Keywords: Nutrition, animal welfare, management, Santander, breed.

Caracterización de estrategias de alimentación de *Cavia porcellus* en Pasto-Nariño y el valle de Sibundoy-Putumayo

Rocío E Patiño-Burbano¹, Juan L Cardona-Iglesias², Luz D Carlosama-Ojeda³, William Burgos-Paz⁴

¹Investigador Master, Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Agrosavia), Centro de Investigación Tibaitatá, Mosquera, Colombia. Correo: rpatino@corpoica.org.co

²Investigador Master, Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Agrosavia), Centro de Investigación Obonuco, Pasto, Colombia. Correo: jlcardona@corpoica.org.co. ³Profesional de apoyo a la investigación, Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Agrosavia), Centro de Investigación Obonuco, Pasto, Colombia.

lcarlosama@corpoica.org.co. ⁴Investigador PhD, Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Agrosavia), Centro de Investigación Tibaitatá, Mosquera, Colombia. Correo: wburgos@corpoica.org.co

Resumen

La producción de cuyes (*Cavia porcellus*) es un renglón de gran importancia bajo los sistemas de crianza familiar y comercial en zonas de minifundio en los departamentos de Nariño y Putumayo, y es particularmente atractivo por requerir pequeñas áreas de terreno para el cultivo de forrajes destinados al mantenimiento de los animales. El objetivo de este estudio fue identificar las principales prácticas de alimentación utilizadas por pequeños productores de cuyes en municipios de alta producción de esta especie en los departamentos de Nariño y Putumayo. La información analizada se obtuvo mediante una encuesta realizada a 404 productores de los municipios de Pasto - Nariño, Colón, San Francisco, Santiago y Sibundoy - Putumayo. Los datos fueron procesados en el programa IBM SPSS Statistics ® V. 20.0 a partir de estadística descriptiva. El 42.3% de los encuestados pertenecían a etnias indígenas de la región y entre los encuestados se estimó un inventario de 21.313 cuyes. La principal fuente de alimentación del sistema fue el forraje (51%), seguido de una alimentación mixta (forraje-concentrado) 44.3% y solo el 0.7% de los encuestados administra únicamente concentrado. Los restantes productores utilizan otras fuentes de alimentación, como los residuos de cosecha.

Entre las gramíneas utilizadas se destacan saboya (*Holcus lanatus*) 59.7%, kikuyo (*Cenchrus clandestinus*) 49.6%, Rye grass sp, 41.8%, imperial (*Axonopus scoparius*) 31.4%, brasilero (*Phalaris sp*) 30.1%; mientras que la principal leguminosa suministrada fue trébol blanco (*Trifolium repens*) 30.4%. En cuanto a forrajerías promisorias se destacó el botón de oro (*Tithonia diversifolia*) 18.7%. También se evidenció que algunos productores suministran arvenses como el corazón herido (*Eupatorium niveum*) 6.6% y nudillo (*Oplismenus barmanni*) 6.6%. La producción de forraje que sostiene la alimentación de este sistema se hace en áreas menores a 2500m² (75.8% de productores) y tan solo el 15.8% de los encuestados conocen o realizan alguna conservación del mismo. En general, existe una alta dependencia de la base forrajera en la alimentación de los animales y es necesario evaluar prácticas de alimentación mixta, suplementación estratégica y estrategias de conservación de forrajes, para garantizar la sostenibilidad y productividad del sistema.

Palabras clave: Cuy, forrajes, suplementación estratégica.

Agradecimientos

Los autores agradecen al proyecto de investigación denominado “Proyecto para escalar la investigación regional y las innovaciones de pequeños agricultores en la cadena de valor del cuy (*Cavia porcellus*)”. Celebrado entre El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria –AGROSAVIA. También se agradece a las asociaciones de pequeños productores de cuy (*Cavia porcellus*) y a los pequeños productores independientes vinculados al proyecto.



Characterization of feeding strategies of guinea pigs in Pasto-Nariño and Valle de Sibundoy-Putumayo

Abstract

The production of guinea pigs (*Cavia porcellus*) is a line of great importance under the systems of family and commercial breeding in smallholding areas in the departments of Nariño and Putumayo, and is particularly attractive because it requires small areas of land for the cultivation of forage for the maintenance of the animals. The objective of this study was to identify the main feeding practices used by small producers of guinea pigs in municipalities of high production of this species in the departments of Nariño and Putumayo. The information analyzed was obtained through a survey of 404 farmers in the municipalities of Pasto - Nariño, Colón, San Francisco, Santiago and Sibundoy - Putumayo. The data was processed in the IBM SPSS Statistics ® V. 20.0 program based on descriptive statistics. 42.3% of the respondents belonged to indigenous ethnic groups of the region and among the respondents an inventory of 21,313 guinea pigs was estimated. 44.3% were the main source of food for the system, and only 0.7% of the respondents administered only concentrate. The remaining producers use other sources of food, such as crop residues. Among the grasses used are safflower (*Holcus lanatus*) 59.7%, kikuyo (*Cenchrus clandestinus*) 49.6%, Rye grass sp, 41.8%, imperial (*Axonopus scoparius*) 31.4%, Brazilian (*Phalaris sp*) 30.1%; while the main legume supplied was white clover (*Trifolium repens*) 30.4%. In terms of promising forages, the gold button (*Tithonia diversifolia*) stood out 18.7%. It was also evident that some producers supplied weeds like the wounded heart (*Eupatorium niveum*) 6.6% and knuckle (*Oplismenus barmanni*) 6.6%. The production of forage that sustains the feeding of this system is done in areas under 2500m² (75.8% of producers) and only 15.8% of the respondents know or perform any conservation of it. In general, there is a high dependence on the forage base in the feeding of the animals and it is necessary to evaluate mixed feeding practices, strategic supplementation and forage conservation

strategies, to guarantee the sustainability and productivity of the system.

Keywords: Guinea pig, forages, strategic supplementation.



Evaluación de *Saccharomyces Boulardii* como suplemento probiótico en alevinos de tilapia roja *Oreochromis* sp. hasta la fase de prelevante

Juan Felipe Cardona Escobar¹, Hermes R. Pineda S.², Juan Carlos Blandon Martínez²

¹Estudiante Ingeniería Agropecuaria, Politécnico Colombiano JIC, ²Docentes Facultad de Ciencias Agrarias Politécnico Colombiano JIC. jcblandon@elpoli.edu.co

Resumen

El objetivo general de este trabajo fue evaluar la levadura *Saccharomyces boulardii*. como suplemento probiótico en alevinos de tilapia roja *Oreochromis* sp. en la fase de prelevante, en dos concentraciones: 0.1% y 0.3% en relación a su biomasa y determinar el efecto de su inclusión sobre los parámetros zootécnicos de conversión alimenticia (CA), tasa de crecimiento específica (TCE), ganancia de peso (GP) y el porcentaje de sobrevivencia. El experimento se llevó a cabo en la Estación Piscícola del Politécnico Colombiano JIC en el Municipio de San Jerónimo (Antioquia). Como objetivos específicos, se efectuaron las mediciones morfométricas del intestino como altura de las vellosidades, profundidad de las criptas, número de linfocitos intraepiteliales, células mitóticas en la cripta y los análisis de los parámetros físico-químicos (PH, temperatura y Oxígeno disuelto en ppm.) y microbiológicos (Coliformes totales y *E. coli*) del agua como parámetros de calidad. Se aplicó un diseño experimental de bloques al azar con 3 tratamientos: DB (dieta basal); T₁ (DB + 0.1% probiótico); T₂ (DB + 0.3% probiótico), con 160 animales por bloque. Se utilizó el programa estadístico SAS y las condiciones experimentales homogéneas permitieron visualizar diferencias estadísticas en alguno de los tratamientos con el probiótico respecto al control. Los resultados de los parámetros zootécnicos evidencian que los peces que fueron alimentados con la dieta más el probiótico mostraron GP, TCE más altas que los peces con la dieta sin probióticos, por lo que se observa una sinergia positiva del probiótico sobre los parámetros medidos.

Palabras clave: Tilapia roja (*Oreochromis* sp.), conversión, probióticos.

Evaluation of *Saccharomyces Boulardii* as a probiotic supplement from alevins of red tilapia *Oreochromis* sp. to the juvenile development phase

Abstract

The general objective of this work was to evaluate the yeast *Saccharomyces boulardii*. As a probiotic supplement in red tilapia fingerlings *Oreochromis* sp. in the pre-salt phase, in two concentrations: 0.1% and 0.3% in relation to its biomass and determine the effect of its inclusion on the zootechnical parameters of feed conversion (FC), specific growth rate (SGR), weight gain (WG) and the percentage of survival. The experiment was carried out at the Piscícola Station of the Colombian Polytechnic JIC in the Municipality of San Jerónimo (Antioquia). As specific objectives, morphometric measurements of the intestine were made as villus height, depth of the crypts, number of intraepithelial lymphocytes, mitotic cells in the crypt and physical-chemical parameters analysis (pH, temperature and dissolved oxygen in ppm.) and microbiological (total coliforms and *E. coli*) of water as quality parameters. An experimental block design was applied randomly with 3 treatments: DB (basal diet); T₁ (DB + 0.1% probiotic); T₂ (DB + 0.3% probiotic), with 160 animals per block. The statistical program SAS was used and the homogeneous experimental conditions allowed to visualize statistical differences in some of the treatments with the probiotic with respect to the control. The results of the zootechnical parameters show that the fish that were fed with the diet plus the probiotic showed WG, SGR higher than the fish with the diet without probiotics, for which a positive synergy of the probiotic is observed on the measured parameters.

Keywords: Red tilapia (*Oreochromis* sp.), conversion, probiotics.

Variación de la grasa subcutánea y su relación con parámetros productivos en vacas Angus primerizas

Juan Carlos Velásquez Mosquera¹, Esteban Mendoza de la Pava², Adel David Kalil Rey²

¹ M.V., MSc, Docente-Investigador Facultad Ciencias Agropecuarias Unisalle Bogotá (Colombia)
jcvelasquez@unisalle.edu.co, ² Estudiantes 10 semestre Zootecnia Unisalle

Resumen

Las reservas corporales de energía se encuentran relacionadas con la cantidad de grasa almacenada en el cuerpo durante los diferentes estados del ciclo reproductivo de la hembra bovina. En vacas de carne existen varios métodos para medir la grasa subcutánea, el más usado es la estimación visual de la condición corporal, sin embargo existen la técnica de ultrasonido en tiempo real UTR que es un método más preciso y fiable para medir las reservas corporales. El objetivo del estudio es medir la variación de la grasa subcutánea durante la lactancia en un grupo de vacas contemporáneas primerizas Angus ($n=12$) previo al parto y al destete a los 4 meses. La estimación de la grasa de cobertura se hará por el método visual de puntaje de condición corporal PCC en escala de 1 a 9 y usando la técnica de UTR midiendo la grasa subcutánea en dos zonas anatómicas del animal, en el dorso EGD y en el anca EGA. Se tomarán pesos al nacer y al destete de las crías y se estimarán correlaciones entre variables de grasa de la madre y parámetros productivos de sus crías. El promedio de peso al preparto fue de 471 ± 36 , el PCC preparto fue de $5,9 \pm 0,61$, y las medidas ecográficas preparto de EGD y EGA fueron de $2,82 \pm 0,69$ mm y $6,34 \pm 2,24$ respectivamente. El coeficiente de correlación entre los métodos para estimar grasa fue de $0,47$ ($p < 0,08$) para EGA y PCC, y no se encontró relación entre EGD y PCC ($0,04$). Se espera conocer cómo cambia la grasa durante la lactancia de las vacas de carne y como la cantidad de la grasa de cobertura estimada se relaciona con los parámetros peso al nacer y destete de sus crías.

Palabras clave: Condición corporal, ganado de carne, habilidad materna, ultrasonido

Variation of subcutaneous fat and its relation with productive parameters in first-calf Angus cows

Abstract

Body energy reserves are related to the amount of fat stored in the body during the different stages of the reproductive cycle of the bovine female. In meat cows there are several methods to measure subcutaneous fat, the most used is the visual estimation of body condition, however there is the RTU real-time ultrasound technique that is a more accurate and reliable method to measure body reserves. The aim of the study is to measure the variation of subcutaneous fat during lactation in a group of contemporary first-time Angus cows ($n = 12$) prior to parturition and at weaning at 4 months. The estimation of the covering fat will be made by the visual BCS body condition score method on a scale of 1 to 9 and using the RTU technique measuring the subcutaneous fat in two anatomical areas of the animal, on the back EGD and on the haunch EGA. Weights will be taken at birth and at the weaning of the offspring and correlations between variables of fat of the mother and productive parameters of their offspring will be estimated. The average prepartum weight was 471 ± 36 , the antepartum APW was 5.9 ± 0.61 , and the antepartum ultrasound measurements of EGD and EGA were 2.82 ± 0.69 mm and 6.34 ± 2.24 respectively. The coefficient of correlation between the methods to estimate fat was 0.47 ($p < 0.08$) for EGA and BCS, and no relationship was found between EGD and APW (0.04). It is expected to know how the fat changes during the lactation of the beef cows and how the amount of fat estimated coverage is related to the parameters birth weight and weaning of their offspring.

Keywords: Body condition, beef cattle, mothering ability, ultrasound.

Efecto de la suplementación con fibra sobre el comportamiento productivo de ganado lechero

Juan Daniel Sánchez Uribe¹, Luis Alberto Gallego Castro²

¹Estudiante de Ingeniería Agropecuaria Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. ²Docente Universidad de Antioquia y Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.
e-mail de contacto: luis.gallego@udea.edu.co

Resumen

Con el objetivo de determinar el efecto de la suplementación con fibra sobre el comportamiento productivo de ganado lechero, se realizó un estudio descriptivo en la finca Bonanza ubicada en la vereda San Juan, municipio de San Pedro de los Milagros. En la finca predomina el pasto kikuyo (*Cenchrus clandestinus*), que presenta un bajo aporte de fibra, especialmente cuando se pastorea a edades tempranas, razón a la que se atribuyen desbalances entre energía y proteína en los sistemas de producción lechera de trópico alto en Colombia. En el hato de esta finca, compuesto en promedio por 96 vacas de raza Holstein en producción, se suministró un suplemento comercial altamente fibroso (Composición máxima 25% de fibra y mínima 12% de proteína), con el cual se reemplazó en promedio un 30% del suplemento alimenticio de uso tradicional suministrado a las vacas en cada ordeño. Antes y después de iniciar el suministro del suplemento fibroso, se tomaron datos de producción de leche por vaca y de proteína, grasa y nitrógeno ureico en leche (MUN) de acuerdo con el reporte general realizado por la empresa que comercializa la leche y se determinó la relación beneficio costo. Los resultados mostraron cambios positivos para producción de leche (pasó de 21,67 litros a 23,68 litros en promedio por vaca), grasa en leche (pasó de 3,6% a 3,8%) y para MUN (pasó de 19 mg/dL a 16,8 mg/dL), mientras que para proteína en leche se presentó un ligero descenso pasando de 3,21% a 3,18%. Por el mejor contenido graso el precio de venta tuvo un aumento importante pasando de \$1195,51 a \$1247,51, mientras que el costo del suplemento por litro de leche (concentrado más suplemento fibroso) pasó de \$329,34 a \$318,02, mejorando la relación beneficio costo. La

inclusión del suplemento fibroso mejoró los niveles de MUN, aspecto que podría impactar de manera positiva la actividad reproductiva general del hato, lo que sumado a los mayores ingresos por venta de leche significaría una mayor rentabilidad para el propietario de la finca Bonanza.

Palabras clave: Nitrógeno ureico en leche, producción de leche, grasa en leche, relación beneficio costo.

Agradecimientos

Facultad de Ciencias Agrarias del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.

Effect of supplementation with fiber over productive behavior of dairy cattle

Abstract

In order to determine the effect of fiber supplementation on the productive behavior of dairy cattle, a descriptive study was carried out on the Bonanza farm located in the village of San Juan, municipality of San Pedro de los Milagros. On the farm, Kikuyo grass (*Cenchrus clandestinus*) predominates, which has a low fiber intake, especially when grazing at an early age, which is why imbalances between energy and protein are attributed to the high tropic milk production systems in Colombia. In the herd of this farm, composed on average of 96 Holstein cows in production, a highly fibrous commercial supplement was supplied (Maximum 25% fiber and minimum 12% protein), which was replaced on average by 30 % of the traditional food supplement supplied to the cows at each milking. Before and after starting the supply of fibrous supplement, milk production data were taken per cow and protein, fat and urea nitrogen in milk (MUN) according to the general report made by the company that markets the milk and was determined the cost benefit ratio. The results showed positive changes for milk production (it went from 21.67 liters to 23.68 liters on average per cow), fat in milk (went from 3.6% to 3.8%) and for MUN (it went from 19 mg / dL to 16.8 mg / dL), while for protein in milk there was a slight decrease from 3.21% to 3.18%. For the best fat content the sale price had a significant increase going from \$ 1195.51 to \$ 1247.51, while the cost of the supplement per liter of milk (concentrate plus fibrous supplement) went from \$ 329.34 to \$ 318.02, improving the cost benefit ratio. The inclusion of the fibrous supplement improved MUN levels, an aspect that could have a positive impact on the general reproductive activity of the herd, which, added to the higher income from milk sales, would mean a greater profitability for the owner of the Bonanza farm.

Keywords: Milk urea nitrogen, milk production, milk fat, benefit: cost ratio.

Efecto del uso de probióticos en el área de vellosidades intestinales de pollos de engorde

Owens José Barrios Barros^{1,2}, Julieta Esperanza Ochoa Amaya^{1,2}, José Ricardo Corredor Matus^{1,2}, Gustavo González^{1,2}, María Ligia Roa Vega³

^{1,2} Grupo de investigación GRIPADS de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, Programa de Medicina Veterinaria de la Universidad de los Llanos, Villavicencio-Colombia.³ Grupo de investigación AGROFORESTERIA de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, Programa de Medicina Veterinaria de la Universidad de los Llanos, Villavicencio-Colombia. E-mail: julieta.ochoa@gmail.com

Resumen

Existe una clara necesidad de alternativas seguras para promotores de crecimiento en la industria avícola diferentes a los antibióticos. Una de estas alternativas eficaces en la producción animal son los probióticos. Estos se complementan con la dieta animal para apoyar una microbiota intestinal bien equilibrada, contribuyen a mejorar la salud y parámetros productivos. Tienen el potencial de reducir las enfermedades entéricas, mejorar el desempeño de las aves de corral y disminuir la contaminación de productos avícolas. El objetivo del trabajo fue evaluar la altura, áreas de la base, ápice y área total de las vellosidades intestinales, en pollos de engorde tratados con probióticos y sus respectivos controles. La longitud de la vellosidad se calculó midiendo la distancia entre la punta de la vellosidad y su base, excluyendo la cripta; este procedimiento se hizo en cada uno de los grupos: control y probióticos. Por cada sección intestinal se realizaron cinco mediciones, se promediaron y el área de la vellosidad se calculó de acuerdo con la siguiente expresión: Área de vellosidad = (Ancho basal + ancho apical) x altura de la vellosidad. Se realizaron pruebas paramétricas y no paramétricas de "t" para muestras no pareadas. Los grupos probióticos presentaron una mayor área ($p=0,0127$) (368700 ± 47170) μm^2 vs control (200300 ± 10910) μm^2 ; ancho basal $p=0,0049$ ($155,4 \pm 13,90$) μm vs control ($103,9 \pm 8,74$) μm ; ancho apical ($p=0,0024$) ($90,62 \pm 5,205$) μm vs control ($61,13 \pm 4,490$) μm en el duodeno. No se encontraron diferencias estadísticas en el yeyuno e íleon. El tratamiento con los probióticos aumentó el área total, ancho basal y apical de la

vellosidad intestinal duodenal. Fue demostrado que el uso de probióticos generó modificaciones en la histomorfología intestinal duodenal en las áreas y anchos basales y apicales. No se generaron efectos en estas variables en yeyuno e íleon; no hubo cambios en la longitud de las vellosidades intestinales de duodeno, yeyuno y íleon. La mayor área intestinal de las vellosidades duodenales con el uso de probióticos aseguraría a la vez una mayor actividad enzimática y área de absorción de nutrientes, lo que se reflejara en mayor rendimiento en canal.

* Soporte financiero: DGI Universidad de los Llanos.

Palabras clave: Ancho, alto, duodeno, *Saccharomyces cerevisiae*, *Lactobacillus acidophilus*

Effect of the use of probiotics in the intestinal villi area of broiler chickens

Abstract

There is a clear need for safe alternatives for growth promoters in the poultry industry other than antibiotics. One of these effective alternatives in animal production is probiotics. These are complemented with animal diet to support a well-balanced intestinal microbiota, contribute to improve health and productive parameters. They have the potential to reduce enteric diseases, improve the performance of poultry and reduce the contamination of poultry products. The objective of the study was to evaluate the height, areas of the base, apex and total area of the intestinal villi, in broilers treated with probiotics and their respective controls. The length of the villi was calculated by measuring the distance between the tip of the villi and its base, excluding the crypt; this procedure was done in each of the groups: control and probiotics. For each intestinal section five measurements were made, they were averaged and the area of the villi was calculated according to the following expression: villus area = (basal width + apical width) x villus height. Parametric and non-parametric "t" tests were performed for unpaired samples. Probiotic groups had a larger area ($p = 0.0127$) (368700 ± 47170) μm^2 vs control (200300 ± 10910) μm^2 ; basal width $p = 0.0049$ (155.4 ± 13.90) μm vs control (103.9 ± 8.74) μm ; apical width ($p = 0.0024$) (90.62 ± 5.205) μm vs control (61.13 ± 4.490) μm in the duodenum. No statistical differences were found in the jejunum and ileum. Treatment with probiotics increased the total area, basal and apical width of duodenal intestinal villi. It was demonstrated that the use of probiotics generated modifications in the duodenal intestinal histomorphology in the basal and apical areas and widths. There were no effects on these variables in the jejunum and ileum; there were no changes in the length of the intestinal villi of the duodenum, jejunum and ileum. The greater intestinal area of the duodenal villi with the use of probiotics would assure at the same time a greater enzymatic activity and nutrient absorption area, which would be reflected in greater channel yield.

Keywords: Width, high, duodenum, *Saccharomyces cerevisiae*, *Lactobacillus acidophilus*.

* Financial support: DGI Universidad de los Llanos.

Los probióticos en la actividad de la cripta y vellosidad intestinal de pollos de engorde

Owens José Barrios Barros^{1,2}, Julieta Esperanza Ochoa Amaya^{1,1}, José Ricardo Corredor Matus^{1,2}, Gustavo González^{1,2}, María Ligia Roa Vega³

^{1,2} Grupo de investigación GRIPADS de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, Programa de Medicina Veterinaria de la Universidad de los Llanos, Villavicencio-Colombia. ³Grupo de investigación AGROFORESTERIA de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, Programa de Medicina Veterinaria de la Universidad de los Llanos, Villavicencio-Colombia.

Resumen

Existe una clara necesidad de alternativas seguras para promotores de crecimiento en la industria avícola diferentes a los antibióticos. Una de estas alternativas eficaces en la producción animal son los probióticos. Tienen el potencial de reducir las enfermedades entéricas, mejorar el desempeño de pollos y disminuir la contaminación de productos avícolas. Se evaluó la densidad de la capa de mucina intestinal mediante marcación de las células caliciformes, utilizando tinción de ácido peryódico de Schiff (PAS) en pollos y la medición de las áreas de las criptas con probióticos y sus respectivos controles. Las muestras intestinales fueron procesadas por los métodos de rutina para microscopía de luz y secciones histológicas (3-4 μm de grosor) fueron utilizadas para evaluar la densidad de la capa de mucina intestinal mediante marcación de las células caliciformes, utilizando tinción de PAS para detectar la producción de moco. La medición del área de la cripta se determinó con el cálculo del diámetro transverso y longitudinal de la cripta. Se realizaron pruebas paramétricas y no paramétricas de "t" para muestras no pareadas. Los grupos probióticos presentaron una mayor producción de moco en duodeno ($p=0,0480$) ($14,48 \pm 1,642$) % vs control ($8,674 \pm 0,9708$) %, en yeyuno ($p= 0,0480$) ($18,02 \pm 1,482$) % vs control ($11,50 \pm 1,681$) % y una mayor área de la cripta en duodeno ($p=0,0189$) ($3239 \pm 209,9$) μm^2 vs control ($2140 \pm 340,2$) μm^2 ; y en yeyuno ($p=0,0068$) ($3738 \pm 350,5$) μm^2 vs control ($2243 \pm 202,4$) μm^2 . No se encontraron diferencias estadísticas en el íleon con relación a la producción de moco y al área de la cripta. El tratamiento con los probióticos

aumentó la producción de moco y el área de la cripta de las vellosidades intestinales del duodeno y yeyuno. No se generaron efectos en estas variables en el íleon. La mayor área intestinal y actividad de las criptas duodenales y del yeyuno con el uso de los probióticos aseguraría a la vez una mayor acción enzimática y área de absorción de nutrientes, lo que deberá reflejarse en un mayor rendimiento en canal. * Soporte financiero: DGI Universidad de los Llanos.

Palabras clave: Caliciformes, mucina, duodeno, yeyuno, *Saccharomyces cerevisiae*, *Lactobacillus acidophilus*



Probiotics in the crypt activity and intestinal villi of broilers

Abstract

There is a clear need for safe alternatives for growth promoters in the poultry industry other than antibiotics. One of these effective alternatives in animal production are probiotics. They have the potential to reduce enteric diseases, improve chicken performance and reduce contamination of poultry products. The density of the intestinal mucin layer was evaluated by labeling the goblet cells, using periodic acid-Shiff staining (PAS) in chickens and measuring the areas of the crypts with probiotics and their respective controls. Intestinal samples were processed by routine methods for light microscopy and histological sections (3-4 μm thick) were used to evaluate the density of the intestinal mucin layer by labeling the goblet cells, using PAS staining to detect the production of mucus. The measurement of the area of the crypt was determined by calculating the transverse and longitudinal diameter of the crypt. Parametric and nonparametric tests of "t" were performed for unpaired samples. Probiotic groups presented a higher production of mucus in the duodenum ($p = 0.0480$) ($14.48 \pm 1.642\%$) vs control ($8.674 \pm 0.9708\%$), in the jejunum ($p = 0.0480$) ($18.02 \pm 1.482\%$) vs control ($11.50 \pm 1.681\%$) and a greater area of the crypt in the duodenum ($p = 0.0189$) ($3239 \pm 209.9 \mu\text{m}^2$) vs control ($2140 \pm 340.2 \mu\text{m}^2$); and in the jejunum ($p = 0.0068$) ($3738 \pm 350.5 \mu\text{m}^2$) vs control ($2243 \pm 202.4 \mu\text{m}^2$). No statistical differences were found in the ileum in relation to the production of mucus and the crypt area. Treatment with probiotics increased the production of mucus and the area of the crypt of the intestinal villi of the duodenum and jejunum. No effects were generated on these variables in the ileum. The greater intestinal area and activity of the duodenal crypts and of the jejunum with the use of probiotics would ensure both a greater enzymatic action and nutrient absorption area, which should be reflected in a higher channel yield.

Keywords: Goblet, mucin, duodenum, jejunum, *Saccharomyces cerevisiae*, *Lactobacillus acidophilus*.

* Financial support: DGI Universidad de los Llanos.

Uso de pulpa de café en alimentación de conejos de ceba

Laura Sánchez G^{1,2} M.Sc*, Raúl Velásquez V^{1,2}
Ph.D, Diego Restrepo M¹ M.Sc.

¹Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín,
Facultad de Ciencias Agrarias. ²Politécnico Colombiano
Jaime Isaza Cadavid, Facultad de Ciencias Agrarias.

*Correspondencia: lcsanche@unal.edu.co.

Resumen

El objetivo del estudio fue evaluar el efecto de la inclusión de pulpa de café ensilada y sin ensilar en la dieta de conejos de ceba sobre el desempeño productivo, la composición de la canal y los costos de alimentación. Se utilizó un diseño completamente aleatorizado con 24 conejos hembras cruzadas Nueva Zelanda x Ruso Californiano, con un peso inicial de 1.806 ± 111 g, distribuidas en tres tratamientos: T0 (control): alimento comercial, T1: alimento balanceado con inclusión de 20% de pulpa de café fresca (PCF) y T2: alimento balanceado con inclusión de 20% de pulpa de café ensilada (PCE). Se determinó el consumo de materia seca (CMS), la ganancia de peso diaria (GPD) y total (GPT), la conversión alimenticia (CA), el rendimiento en canal caliente (%RCC) y el rendimiento de los tres tercios (delantero, medio y trasero), además se halló el costo de alimento consumido (\$AC), costo de 1kg de peso vivo ganado (\$kgPVG) y porcentaje de ahorro. Hubo diferencias significativas en el peso inicial (PI) de los animales entre T0 y T1, por lo que esta se usó como covariable en el análisis estadístico, además, con un nivel de confianza del 95% se encontraron diferencias significativas entre tratamientos para CMS, \$AC, \$kgPVG y rendimiento del tercio trasero; con un ahorro de 37.3% en alimentación con PCF y 30.4% con PCE. El alimento balanceado con un 20% de inclusión de pulpa de café puede ser usado en alimentación de conejos sin afectar desempeño productivo y rendimientos, siendo económicamente más favorable el tratamiento con pulpa de café fresca.

Palabras clave: Alimentación de los animales, costos de producción, desempeño animal, engorde, subproductos.

Coffee pulp used in feeding of fattening rabbits

Abstract

The objective of the study was to evaluate the effect of the inclusion of silage and non-ensiled coffee pulp in the diet of fattening rabbits on the productive performance, carcass composition and feeding costs. A completely randomized design was used with 24 New Zealand x Russian Californian female cross rabbits, with an initial weight of $1,806 \pm 111$ g, distributed in three treatments: T0 (control): commercial feed, T1: balanced feed including 20% pulp of fresh coffee (PFC) and T2: balanced feed with inclusion of 20% silage coffee pulp (SCP). Dry matter consumption (DMC), daily weight gain (DWG) and total weight gain (TWG), feed conversion (FC), hot runner yield (% HRY) and three-thirds yield (forward) were determined. , medium and back), also found the cost of food consumed (\$ FC), cost of 1kg of live weight gained (\$ kgLWG) and percentage of savings. There were significant differences in the initial weight (IW) of the animals between T0 and T1, so this was used as a covariate in the statistical analysis, in addition, with a confidence level of 95% significant differences were found between treatments for DMC, \$ FC, \$ kgPVG and performance of the rear third; with a saving of 37.3% in feeding with PFC and 30.4% with SCP. The balanced feed with a 20% inclusion of coffee pulp can be used in feeding rabbits without affecting production performance and yields, being economically more favorable treatment with pulp of fresh coffee.

Keywords: Animal feeding, production costs, animal performance, fattening, byproducts.



Modelado de Bienestar Animal en gallinas ponedoras en Enciso- Santander

Miguel Ormaza Munevar, Astrid Lizcano González, Diego Ormaza Munevar, Leonardo Avendaño Vásquez

Semillero de Investigación YASKUA. Programa de Zootecnia - IPRED- Centro de Investigaciones para el Desarrollo Agroindustrial (CIAGRO) – Universidad Industrial de Santander – Malaga, Santander. angelormaza-1995@hotmail.com, astrid_fer24@yahoo.com, dago_93@hotmail.com, lavandanov2005@hotmail.com

Resumen

La industria avícola en 2017 tuvo una producción de 12,817 millones de huevos, su consumo per cápita está representado por 263 huevos / persona / año en todo el país. Dentro de los principios de bienestar animal estipulados por la ley 1774 se ha logrado que el sistema de producción se base en el respeto, la solidaridad, la compasión, la ética, la justicia, el cuidado, la prevención del sufrimiento de cualquier forma de violencia, abuso, maltrato y trato cruel. Los sistemas de producción de huevos han incluido estos principios bajo cuatro elementos: comida adecuada, vivienda adecuada, buena salud y comportamiento adecuado. Las crecientes inquietudes de los consumidores con respecto al bienestar animal han diversificado los sistemas de producción (Deep Pit-Jaula convencional, jaula de estiércol-jaula convencional, colonia de Enrichet, aviario alternativo / multi, cubierta plana alternativa, piso alternativo). Con el objetivo de estipular el valor del bienestar animal en la producción de huevos en Enciso - Santander, la evaluación de los criterios y medidas se llevará a cabo de acuerdo con el protocolo de evaluación Welfare Quality®. Al tomar datos de un sistema de producción de aves ponedoras, se evaluarán los criterios para la evaluación del bienestar animal: ausencia prolongada de hambre, ausencia prolongada de sed, instalaciones, confort térmico, espacio, ausencia de lesiones, ausencia de enfermedades, ausencia de dolor inducido por procesos de gestión, expresión social del comportamiento, expresión de otros comportamientos, relación humano-animal, ausencia de miedo. Las fórmulas de protocolo y De Jong et al; 2011, las fórmulas que agregan

puntuaciones ponderadas de bienestar en las medidas vinculadas, miden el atributo de puntaje del sistema WQ y la suma de los atributos de puntuación WQ. Los atributos se calcularán usando la fórmula $WQ-Ajk = \sum (W_{ik} * X_{ij})$, $WQ-Akm = \sum (WQ-Ajk) / n$ y $WQ-Lm = \sum WQ-Akm$) según É. Gocsik et al. (2016).

Palabras clave: Bienestar animal, gallinas ponedoras, modelado, consumo, salud, rentabilidad.

**Modeling of Animal Welfare in laying hens in
Enciso- Santander****Abstract**

The poultry industry in 2017 had a production of 12,817 million eggs; its per capita consumption is represented by 263 Eggs / person / year nationwide. Within the principles of animal welfare stipulated by law 1774 has led to the production system is based on respect, solidarity, compassion, ethics, justice, care, prevention of suffering any form of violence, abuse, mistreatment and cruel treatment. Egg production systems have involved these principles under four elements: adequate food, adequate housing, good health and proper behavior. Increasing consumer concerns regarding animal welfare has diversified production systems (Deep Pit-Conventional Cage, Manure Belt-Conventional Cage, Enriched Colony, Alternative aviary / Multi, Alternative-Flat Deck, Alternative-Floor). With the objective of stipulating the value of animal welfare in egg production in Enciso - Santander, the evaluation of criteria and measures will be carried out according to the Welfare Quality® assessment protocol. By taking data from a production system of laying poultry the criteria for evaluation of animal welfare will be assessed: Prolonged absence of hunger, prolonged absence of thirst, facilities, thermal comfort, space, absence of injuries, absence of diseases, absence of pain induced by management processes, behavioral social expression, expression of other behaviors, human-animal relationship, absence of fear. The formulas of protocol and De Jong et al; 2011, formulas that add weighted welfare scores in the linked measures, measure the WQ system score attribute and sum of the WQ score attributes. The attributes will be calculated using the formula $WQ-Ajk = \sum (Wik * Xij)$, $WQ-Akm = \sum (WQ-Ajk) / n$ and $WQ-Lm = \sum WQ-Akm$ according to É. Gocsik et al. (2016).

Keywords: Animal welfare, laying hens, modeling, Consumption, health, profitability.

Determinación del efecto de Silimarina como aditivo en dietas de alevinos de Trucha Arco iris *Oncorhynchus mykiss* en Monguí, Boyacá

¹Jordan Leonardo Romero Bernal, ¹Ludy Paola Villamil Moreno, ²Elizabeth Rodríguez Caicedo

¹Programa de Medicina Veterinaria, Fundación Universitaria Juan de Castellanos, Grupo IRABI.

²ASOPISBOY. leo_mvz@hotmail.com,
ludypaolavillamil@gmail.com

Resumen

La piscicultura en Colombia ha obtenido un desarrollo de forma progresiva, comportándose como una alternativa pecuaria en el departamento de Boyacá con un auge representativo en trucha arco iris; el objetivo de este estudio es determinar el efecto de Silimarina como aditivo en dietas de alevinos de Trucha Arco iris, *Oncorhynchus mykiss*. Para ello se utilizarán 600 alevines con un peso promedio de 2 gramos, divididos en cuatro grupos, incluyendo el grupo control, separados en tres (3) estanques por grupo, compuestos por 50 alevines cada uno. Para el trabajo se evaluarán parámetros zootécnicos de sobrevivencia, crecimiento en longitud (L, mm), peso (P, g) y conversión alimenticia, adicionalmente se tomarán muestras hemáticas para análisis morfológico y cortes histopatológicos de intestino e hígado, medición del índice hepato y víscero somático, con el fin de determinar qué efectos puede generar la silimarina en dichos parámetros. Se espera establecer el efecto de la Silimarina como hepatoprotector e inmunoestimulante en truchas.

Palabras clave: Silimarina, aditivo, alevines, trucha arcoíris, hepatoprotectores.

Determination of the effect of Silymarin as an additive in diets of rainbow trout fingerling *Oncorhynchus mykiss* in Monguí, Boyacá**Abstract**

The fish farming in Colombia has obtained a progressive development, behaving like a cattle alternative in the department of Boyacá with a representative boom in rainbow trout; The objective of this study is to determine the effect of Silymarin as an additive in diets of rainbow trout fingerlings, *Oncorhynchus mykiss*. To this end, 600 fingerlings with an average weight of 2 grams will be used, divided into four groups, including the control group, separated into three (3) ponds per group, composed of 50 fingerlings each. For the work, zootechnical parameters of survival, growth in length (L, mm), weight (P, g) and feed conversion will be evaluated, additionally, blood samples will be taken for morphological analysis and histopathological sections of intestine and liver, measurement of hepatic index and somatic viscera, in order to determine what effects silymarin can generate in these parameters. It is expected to establish the effect of Silymarin as a hepatoprotective and immunostimulant in trout.

Keywords: Silymarin, Additive, Fry, Rainbow trout, hepatoprotectors.



Evaluación de VIUSID® en la dieta de alevinos de trucha arcoíris (*Oncorhynchus mykiss*) en Viracacha Boyacá

¹Melco Duván Ropero, ¹Ludy Paola Villamil,
²Elizabeth Rodríguez Caicedo

¹Programa de Medicina Veterinaria, Fundación Universitaria
Juan de Castellanos, Grupo IRABI. ²ASOPISBOY.
ludypaolavillamil@gmail.com

Resumen

La acuicultura se está convirtiendo en una de las mayores fuentes de proteína a nivel mundial, en Colombia la trucha arcoíris es una de las especies más explotadas, estas producciones están presentando problemas de mortalidad, disminución de parámetros zootécnicos e incidencia de las enfermedades. Se realizará un estudio en el cual se evaluará la adición de VIUSID® al alimento, utilizando 2500 alevinos de trucha arcoíris (*Oncorhynchus mykiss*) para los que se usará un diseño completamente al azar con una réplica por tratamiento, usando un estanque para grupo control y dos estanques para cada tratamiento, el (T1) 2ml y (T2) 4ml de VIUSID® por cada kg de alimento consumido diluidos en 20ml por cada kg de alimento preparado, en densidades de 500 alevines por estanque mantenidos durante 2 meses; el producto se adicionará diluido en aspersión sobre el alimento. Cada 15 días se pesarán el 10% de alevinos de cada grupo para evaluar su ganancia de peso y su conversión alimenticia, se observará la cantidad de animales muertos por día. Luego de 2 meses de la aplicación del producto se anestesiarán 10 animales por grupo, se les tomará una muestra de sangre en la vena caudal para diferenciación morfo hematológica, bajo protocolo de necropsia se sacrificarán los peces y se tomará muestra de hígado que se almacenará en formol para histopatología. Se espera determinar el efecto en el grado de bienestar y salud de los animales.

Palabras clave: Efecto antioxidante, ganancia de peso, hepatoprotector, inmunoestimulante, ácido glicirrícínico.

Evaluation of VIUSID® in the diet of rainbow trout fingerlings (*Oncorhynchus mykiss*) in Viracacha Boyacá

Abstract

Aquaculture is becoming one of the largest sources of protein worldwide, in Colombia rainbow trout is one of the most exploited species and these productions are presenting problems of mortality, decrease of zootechnical parameters and incidence of diseases. A study will be conducted in which the addition of VIUSID® to the feed will be evaluated, using 2500 rainbow trout fingerlings (*Oncorhynchus mykiss*) for which a completely randomized design was used with one replicate per treatment, using a pond for control group and two tanks for each treatment, the (T1) 2ml and (T2) 4ml of VIUSID® for each kg of food consumed diluted in 20ml per kg of prepared food, in densities of 500 fingerlings per pond maintained for 2 months; the product will be added diluted in aspersion on the food. Every 15 days, 10% of each group will be weighed to evaluate their weight gain and feed conversion. The number of dead animals per day will be observed. After 2 months of application of the product, 10 animals will be anesthetized per group, a blood sample will be taken in the caudal vein for morphological differentiation, under necropsy protocol the fish will be sacrificed and a liver sample will be taken and stored in Formalin for histopathology. It is expected to determine the effect on the degree of welfare and health of the animals.

Keywords: Antioxidant effect, gain weight, liver, hepatoprotector, inmunoestimulant, glycyrrhizinic acid.



Efecto de la suplementación con fresa de rechazo sobre la producción de ganado lechero

Santiago Flórez Rodríguez, Estiven Alejandro Valderrama Restrepo, Juan Camilo Vargas Patiño, Luis Alberto Gallego Castro

Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de Antioquia. e-mail de contacto: luis.gallego@udea.edu.co

Resumen

El objetivo fue analizar la producción de leche y la relación beneficio costo de la sustitución parcial de la energía aportada por el concentrado por tres niveles de energía aportada por fresa de rechazo parcialmente deshidratada (0%, 10% y 20%). En un sistema de producción bovina de leche del trópico alto se utilizaron nueve vacas Holstein (60 a 90 días de lactancia y con dos o más partos), distribuidas en tres grupos que pastoreaban praderas de Kikuyo (*Cenchrus clandestinus*) en la finca La Pastora 2, municipio de La Unión (Antioquia, Colombia) a 2545 msnm. Se recolectó la fresa de rechazo en las comercializadoras del municipio y posteriormente se deshidrató en marquesinas durante un día aproximadamente; se determinó la composición química de la fresa de rechazo, concentrado y Kikuyo en el laboratorio de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia, para determinar la energía aportada por cada alimento y así estimar la cantidad de fresa de rechazo a suministrar a las vacas en cada tratamiento. La medición de las variables se realizó durante 14 días, con un periodo de acostumbramiento previo de diez días; se midió producción de leche corregida al 4% de grasa (28,51, 27,85 y 21,68 litros para 10%, 20% y 0% de sustitución de energía); ante las diferencias presentadas, se estimó la variación porcentual de la producción de leche semanal con respecto a la producción inicial (0,0061%, -0,016% y 0. 0018%, para los tres niveles de sustitución de energía); la proteína (2,70%, 2,93% y 2,86%), grasa (4,11%, 3,52% y 4,01%), nitrógeno ureico en leche MUN (22,07 mg/dl, 19,73 mg/dl y 22,96 mg/dl) y relación beneficio costo (3,14, 2,54 y 2,42). No hubo diferencias significativas entre los tratamientos para variación porcentual en producción de leche, calidad composicional (grasa y proteína), pero si la hubo para MUN entre los tratamientos dos y tres; también se encontró

diferencia significativa en la relación beneficio costo en favor del tratamiento con 20% de fresa de rechazo con respecto a los otros dos. Los resultados muestran la pertinencia de usar subproductos de cosecha en la alimentación ganadera.

Palabras clave: Sustitución, grasa láctea, proteína láctea, relación beneficio costo.

Agradecimientos

Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia. ASEAGRARIAS - Asociación de Egresados de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia.

**Effect of supplementation with rejection strawberry on the production of dairy cattle****Abstract**

The objective was to analyze the milk production and the benefit-cost ratio of the partial substitution of the energy contributed by the concentrate for three levels of energy contributed by partially dehydrated reject strawberry (0%, 10% and 20%). In a bovine milk production system of the high tropic, nine Holstein cows were used (60 to 90 days of lactation and with two or more births), distributed in three groups that pastured Kikuyo grasslands (*Cenchrus clandestinus*) in La Pastora farm 2, municipality of La Unión (Antioquia, Colombia) at 2545 meters above sea level. The strawberry of rejection was collected in the marketers of the municipality and later it was dehydrated in marquees during a day approximately; the chemical composition of the reject strawberry, concentrate and Kikuyo was determined in the laboratory of the Faculty of Agricultural Sciences of the University of Antioquia, to determine the energy contributed by each food and thus estimate the amount of rejection strawberry to be supplied to the cows in each treatment. The measurement of the variables was carried out during 14 days, with a previous accustoming period of ten days; milk production corrected to 4% fat was measured (28.51, 27.85 and 21.68 liters for 10%, 20% and 0% energy substitution); in view of the differences presented, the percentage variation of the weekly milk production was estimated with respect to the initial production (0.0061%, -0.016% and 0.0018%, for the three levels of energy substitution); the protein (2.70%, 2.93% and 2.86%), fat (4.11%, 3.52% and 4.01%), urea nitrogen in MUN milk (22.07 mg / dl, 19.73 mg / dl and 22.96 mg / dl) and benefit-cost ratio (3.14, 2.54 and 2.42). There were no significant differences between the treatments for percentage variation in milk production, compositional quality (fat and protein), but there was a difference between treatments two and three; a significant difference in the benefit-cost ratio was also found in favor of the treatment with 20% rejection strawberry with respect to the other two. The results show the relevance of using crop by-products in livestock feed.

Keywords: Substitution, milk fat, milk protein, cost benefit ratio.

Validación de caninos para pruebas de palatabilidad en un centro de investigación en nutrición de mascotas

Juan Camilo Duque¹; Oliver Restrepo¹; Luis Miguel Gómez^{1,2}

¹Grupo de Investigación y Desarrollo Nutri-Solla, Solla S.A (Código Postal 1272), Itagüí, Colombia. ²Profesor Universidad CES, Medellín, Colombia.

Resumen

La palatabilidad es la medición del consumo de un alimento que indica la aceptación (prueba Monádica o en un solo plato) o la preferencia de un alimento sobre otro (prueba de escogencia en dos platos- A y B). Usualmente, este tipo de pruebas requieren perros entrenados desde cachorros que deben ser validados mediante pruebas de resultado conocido ($A=B$; $A>B$; $A>>>B$). Posterior a las pruebas de entrenamiento, algunos perros podrían no ser aptos para dicha prueba (sesgos por lateralidad, memoria olfativa heredada, pica y coprofagia). El objetivo del estudio fue validar el desempeño de los caninos posterior a un entrenamiento durante 9 meses para pruebas de palatabilidad. El estudio se realizó en el Centro de Investigaciones Caninas de la alianza Empresa Universidad Solla-CES (Envigado, Antioquia, Colombia) con 5 perros de las razas Pastor Shetland, Border Collie, Schnauzer, Criollo y Pastor Australiano, cuya edad y peso promedio fue 13.7 ± 1.4 meses y 14.5 ± 6.2 kg. Los perros fueron alojados individualmente y alimentados dos veces por día (7:30am y 4:30 pm) por períodos de hasta 20 minutos en dos platos en los cuales cada plato contenía los requerimientos nutricionales para su etapa de desarrollo (FEDIAF, 2017); diariamente tuvieron acceso a caminata y ejercicio en zonas verdes. Un total de 24 pruebas de palatabilidad con resultado conocido fueron realizadas por cada perro. Las diferencias en consumo fueron evaluadas mediante el test no paramétrico de Wilcoxon, considerando diferencias estadísticas con $P < 0.05$. Al menos 65% de aciertos fue necesario para considerar al perro como apto para las pruebas de palatabilidad. Los porcentajes de aciertos obtenidos fueron 79, 86, 68, 73 y 83% para el Pastor Shetland, Border Collie, Schnauzer, Criollo y Pastor Australiano, respectivamente. Lo

anterior indica que todos los perros aprobaron el test de validación; los perros fueron aptos para hacer pruebas de palatabilidad.

Palabras clave: Aceptación, palatabilidad, alimento de mascotas, consumo y preferencia.

Canine validation for palatability trials in a center for pet nutrition research

Abstract

Palatability is the measurement of the consumption of a food that indicates the acceptance (Monadic test or in a single dish) or the preference of one food over another (test of choice in two dishes- A and B). Usually, this type of test requires dogs trained from puppies that must be validated by tests of known result ($A = B$, $A > B$, $A >> B$). After the training tests, some dogs may not be suitable for this test (laterality biases, inherited olfactory memory, pica and coprophagy). The objective of the study was to validate the performance of the canines after training for 9 months for palatability tests. The study was carried out at the Canine Research Center of the Solla-CES University Enterprise Alliance (Envigado, Antioquia, Colombia) with 5 dogs of the Shetland Sheepdog, Border Collie, Schnauzer, mutt and Australian Shepherd breeds, whose average age and weight was 13.7 ± 1.4 months and 14.5 ± 6.2 kg. The dogs were housed individually and fed twice a day (7:30 am and 4:30 pm) for periods of up to 20 minutes in two dishes in which each dish contained the nutritional requirements for its stage of development (FEDIAF, 2017); daily they had access to walking and exercise in green areas. A total of 24 palatability tests with known results were performed by each dog. The differences in consumption were evaluated using the nonparametric Wilcoxon test, considering statistical differences with $P < 0.05$. At least 65% correct answers were necessary to consider the dog as suitable for palatability tests. The success percentages obtained were 79, 86, 68, 73 and 83% for Pastor Shetland, Border collie, Schnauzer, mutt and Australian shepherd, respectively. The above indicates that all dogs approved the validation test; the dogs were able to make palatability tests.

Keywords: Acceptance, palatability, pet food, intake and preference.

Efecto del suplemento con diferentes ácidos grasos sobre el ácido linoleico conjugado en vacas lecheras

Luisa Fernanda Cano García; Juan Pablo Sánchez Aguirre; Luis Alberto Gallego Castro

Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de Antioquia.
E-mail de contacto: luisa.canog@udea.edu.co;
juan.sanchez37@udea.edu.co; luis.gallego@udea.edu.co

Resumen

El objetivo del estudio es realizar un meta-análisis para analizar el efecto de la suplementación con diferentes fuentes de ácidos grasos sobre la producción de ácido linoleico conjugado (CLA) en diferentes sistemas de producción bovina de leche, relacionando el contenido de CLA, volumen y grasa en leche encontrados con el tipo de ácidos grasos, sus niveles de inclusión y el tipo racial. Para la ejecución del presente proyecto los estudios serán seleccionados bajo criterios de selección bien definidos, a través de bases de datos científicas que se encuentran suscritas al sistema de bibliotecas e información bibliográfica de la Universidad de Antioquia como son: BioOne, Current Contents, OECD, Science Direct, SciElo, SciFinder, Redalyc, Pubmed, además del buscador especializado Google académico. Consecuentemente los artículos serán filtrados por fecha, para obtener los últimos avances respecto a las dietas utilizadas en vacas lecheras y que determinen la presencia del CLA; estos deben tener fecha de publicación posterior a 2010, ser artículos experimentales y con datos precisos, ya que lo que se busca es poder analizar las variables propuestas. Una vez finalice la búsqueda y selección de los artículos que cumplan con los criterios antes descritos, se realizará un análisis de heterogeneidad entre estos para determinar y reagrupar posibles tratamientos para el modelo estadístico. El modelo estadístico propuesto es un diseño completamente al azar, con la posibilidad de aplicar otros tipos de análisis si la información obtenida lo permite; se buscará determinar si existe diferencia significativa entre los tratamientos identificados. El análisis estadístico se desarrollará en el programa estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Una vez se dé fin al proyecto se espera que la información recolectada pueda

brindar apoyo con respecto a futuras investigaciones que promuevan mejorar el contenido de CLA en leche bovina en función de los suplementos, tipo racial de los animales y condiciones o sistemas productivos.

Palabras clave: Meta-análisis, biohidrogenación, dieta.

Agradecimientos

Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia. ASEAGRARIAS - Asociación de Egresados de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia.

**Effect of supplement with different fatty acids
on the conjugated linoleic acid in dairy cows****Abstract**

The aim of the study is to perform a meta-analysis to analyze the effect of supplementation with different sources of fatty acids on the production of conjugated linoleic acid (CLA) in different systems of bovine milk production, relating the content of CLA, volume and fat in milk found with the type of fatty acids, their inclusion levels and the racial type. For the execution of this project the studies will be selected under well-defined selection criteria, through scientific databases that are subscribed to the library system and bibliographic information of the University of Antioquia such as: BioOne, Current Contents, OECD, Science Direct, SciElo, SciFinder, Redalyc, Pubmed, in addition to the specialized Google academic search engine. Consequently the articles will be filtered by date, to obtain the latest advances regarding the diets used in dairy cows and that determine the presence of the CLA; These must have a publication date after 2010, be experimental articles and with precise data, since what is sought is to be able to analyze the proposed variables. Once the search and selection of articles that meet the criteria described above is completed, an analysis of heterogeneity among them will be carried out to determine and regroup possible treatments for the statistical model. The proposed statistical model is a completely randomized design, with the possibility of applying other types of analysis if the information obtained allows it; it will be sought to determine if there is a significant difference between the treatments identified. The statistical analysis will be developed in the statistical program Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Once the project is finished, it is expected that the information collected can provide support with respect to future research that promotes improving the content of CLA in bovine milk based on supplements, racial type of animals and conditions or production systems.

Keywords: Meta-analysis, biohydrogenation, diet.

Comportamiento del BUN y creatinina por sustitución de frijol caupí en mojarra roja

Luz Dary Yepes Lobo¹ Lic., MBA, Emerson Hurtado Díaz² MVZ.

¹Instituto Universitario de la Paz – luz.yepes@unipaz.edu.co. ²emerhd_1993@hotmail.com

Resumen

Este trabajo tuvo como objetivo evaluar el comportamiento de las variables de química sanguínea, nitrógeno ureico en sangre BUN (siglas en inglés) y creatinina, en mojarra roja *Oreochromis spp* al suplementar frijol caupí *Vigna unguiculata* (20% y 40%) en el alimento de ceba. La investigación se llevó a cabo durante 30 días en la Unidad Académica y de Investigación MVZ Peces del programa de MVZ en el Instituto Universitario de la Paz (Barrancabermeja, Santander), formulándose un diseño aleatorizado unifactorial, siendo la dieta el factor de evaluación a través de las variables respuesta BUN y creatinina. El diseño consistió en tres tratamientos, Testigo (100% alimento balanceado), TFC20 (20% frijol caupí - 80% alimento balanceado) y TFC40 (40% frijol caupí - 60% alimento balanceado), determinándose la composición bromatológica de la dieta por tratamiento. Se utilizaron 300 peces en total, 100 peces por tratamiento distribuidos en 2 jaulas de 4,5 m³ (50 peces en cada una) correspondientes a las réplicas. El alimento se suministró en cuatro raciones al día, proporcionando en los tratamientos experimentales, la cantidad de frijol caupí molido y seco en la primera ración y el alimento balanceado en las 3 raciones restantes. En los días 31 y 32 del experimento, se muestrearon al azar 20 animales por tratamiento (10 animales por réplica) que fueron previamente sedados con Eugenol (1,5 gotas/Lt de agua), realizando la toma de sangre en la vena caudal, utilizando aguja de vacutainer de calibre 22G 1" ½ en tubo al vacío sin anticoagulante, conservándose la muestra en hielo, para su posterior lectura de los niveles plasmáticos de BUN y creatinina en el laboratorio de la clínica veterinaria de UNIPAZ. El análisis de información se llevó a cabo mediante estadística no paramétrica, específicamente a través de la prueba de Kruskal-Wallis, basada en el principio

de normalidad, homocedasticidad y número de datos (< 30). En el BUN y la creatinina no se presentó diferencia estadísticamente significativa ($p>0,05$) entre tratamientos, adjudicándose este comportamiento al valor isoproteíco entre las dietas. Se concluye que la sustitución de frijol caupí en el alimento no afectó el comportamiento del BUN y la creatinina.

Palabras clave: Nitrógeno ureico, creatinina, proteína, dietas alternativas, piscicultura.

Behavior of BUN and creatinine by substitution of cowpea beans in red mojarra

Abstract

The objective of this work was to evaluate the behavior of blood chemistry variables, blood urea nitrogen (BUN) and creatinine, in red molasses *Oreochromis* spp. By supplementing cowpea beans *Vigna unguiculata* (20% and 40%) in the food of fatigued fish. The research was carried out during 30 days in the MVZ Perez Research and Academic Unit of the MVZ program at the University Institute of La Paz (Barrancabermeja, Santander), formulating a unifactorial randomized design, the diet being the evaluation factor through of the response variables BUN and creatinine. The design consisted of three treatments, Witness (100% balanced feed), TFC20 (20% cowpea beans - 80% balanced feed) and TFC40 (40% cowpea beans - 60% balanced feed), determining the bromatological composition of the diet by treatment. A total of 300 fish were used, 100 fish per treatment distributed in 2 cages of 4.5 m³ (50 fish in each) corresponding to the replicas. The food was supplied in four servings a day, providing in the experimental treatments, the amount of ground and dried cowpea beans in the first ration and the balanced feed in the remaining 3 rations. On days 31 and 32 of the experiment, 20 animals were randomly sampled per treatment (10 animals per replica) that were previously sedated with Eugenol (1.5 drops / Lt of water), performing the blood sampling in the caudal vein, using 22 gauge vacutainer needle 1 ½ vacuum tube without anticoagulant, keeping the sample on ice, for later reading of plasma BUN and creatinine levels in the laboratory of the veterinary clinic of UNIPAZ. The information analysis was carried out using nonparametric statistics, specifically through the Kruskal-Wallis test, based on the principle of normality, homoscedasticity and data number (<30). In the BUN and the creatinine there was no statistically significant difference ($p > 0.05$) between treatments, this behavior being attributed to the isoproteic value between the diets. It is concluded that the substitution of cowpea beans in the food did not affect the behavior of BUN and creatinine.

Keywords: Ureic nitrogen, creatinine, protein, alternative diets, fish farming.

Determinación de agroquímicos en los forrajes y la leche producida con estos en el municipio de Pereira

Luz Andrea Guevara Garay¹, Carlos Humberto Montoya Navarrete²

¹Docente investigadora Fundación Universitaria Autónoma de las Américas sede Pereira. Grupo de investigación en Ciencias Agropecuarias GISCA. luz.guevara@uam.edu.co.

²Director Laboratorio de Análisis de Aguas y Alimentos. Universidad Tecnológica de Pereira. Grupo de estudios del recurso hídrico GERH. camontoy@utp.edu.co

Resumen

El presente trabajo tiene por objetivo determinar la presencia de agroquímicos en los forrajes consumidos por las vacas en el municipio de Pereira (Risaralda), así como en la leche producida por estas. Para la definición de las granjas a muestrear, será revisado el listado de predios lecheros registrados ante el ICA seccional Risaralda y se determinará una muestra representativa de acuerdo con la fórmula estadística para poblaciones conocidas. En cada finca seleccionada, se recolectarán muestras de forraje que se encuentren en el punto de consumo por parte de los animales, las muestras de leche serán obtenidas directamente del tanque de refrigeración o de los recipientes que sean utilizados para su almacenamiento. La definición de los agroquímicos a determinar se realizará por medio de un sondeo en almacenes agropecuarios para conocer los plaguicidas y herbicidas de mayor venta. Para la selección de las técnicas de laboratorio, en primer lugar, se realizará una revisión de las metodologías propuestas para la evaluación y cuantificación de los agroquímicos que puedan estar presentes en el forraje y en la leche. Se procederá a una selección y estandarización de una técnica de extracción de los analitos de interés que presente mejores criterios de calidad analítica. La técnica instrumental para realizar la determinación y cuantificación de los agroquímicos será la cromatografía de gases. Allí se empleará la detección por micro captura de electrones (CG-uECD) además de realizar verificaciones y controles a través del empleo de un cromatógrafo de gases con detector de masas (CG-MS). Por medio de este trabajo se espera determinar si

existe presencia de agroquímicos de tipo insecticidas y herbicidas en las muestras de forraje y leche recolectadas en los hatos lecheros incluidos en este análisis.

Palabras clave: Bioacumulación, herbicidas, insecticidas, productos lácteos, cromatografía.

**Determination of agrochemicals in the forage
and milk produced with these in the
municipality of Pereira****Abstract**

The objective of this work is to determine the presence of agrochemicals in the forages consumed by cows in the municipality of Pereira (Risaralda), as well as in the milk produced by them. For the definition of the farms to be sampled, the list of dairy farms registered before the Risaralda sectional ICA (*acronym in Spanish of Colombian Agricultural Institute*) will be reviewed and a representative sample will be determined according to the statistical formula for known populations. In each selected farm, forage samples will be collected that are at the point of consumption by the animals, milk samples will be obtained directly from the cooling tank or from the containers that are used for storage. The definition of the agrochemicals to be determined will be carried out by means of a survey in agricultural warehouses to know the bestselling pesticides and herbicides. For the selection of laboratory techniques, first, a review of the proposed methodologies for the evaluation and quantification of agrochemicals that may be present in the forage and milk will be carried out. We will proceed to a selection and standardization of an analyte extraction technique of interest that presents better analytical quality criteria. The instrumental technique to perform the determination and quantification of agrochemicals will be gas chromatography. There, the detection by electron micro capture (CG-uECD) will be used in addition to verifications and controls through the use of a gas chromatograph with mass detector (CG-MS). Through this work it is expected to determine if there is presence of insecticide and herbicide-type agrochemicals in the forage and milk samples collected in the dairy herds included in this analysis.

Keywords: Bioaccumulation, chromatography, dairy products, herbicides, insecticides.

Evaluación económica de dos raciones para alimentación de cerdos de levante en Briceño, Boyacá

Lina María Flórez Gómez¹, María Isabel Escobar Pedraza², Néstor Raúl Torres Lagos³.

¹Médico veterinario y zootecnista. Msc en Administración de empresas. Docente catedrática Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. linaflorezmvz@gmail.com.

²Médico veterinario y zootecnista. Msc(c) en Ciencias veterinarias. Docente catedrática Fundación Universitaria Juan de Castellanos. mescobarmvz@yahoo.com. ³Médico veterinario y zootecnista. Msc(c) en Ciencias veterinarias. Instructor SENA. mvznestortorres@hotmail.com.

Resumen

El estudio se desarrolló en la finca Alejandría en el municipio de Briceño, Boyacá. El objetivo de este trabajo fue evaluar la ganancia de peso y costo de la ración en cerdos, durante la etapa de levante. En un diseño completamente al azar dentro de un sistema de producción intensivo, se seleccionaron 12 cerdos con pesos entre 20 y 23 kg de la línea genética Hypor-Tecniagro. Estos se distribuyeron en 2 Tratamientos con 6 repeticiones, a los que se les suministró alimentos así: T1 Dieta control con concentrado de Italcol Cerdito levante 1 Naranja y T2 Dieta alternativa con 50% concentrado y 50% plátano *Mussa* sp, que se suministraba pelado, maduro y cocinado para facilitar su consumo. En los dos casos los alimentos fueron suministrados ad libitum. Se realizaron pesajes de todos los animales cada 15 días con báscula electrónica y se tomaron registros de la cantidad de alimento suministrado para cada tratamiento. Al concluir las 14 semanas, los datos de ganancia diaria de peso fueron sometidos a pruebas de normalidad y homogeneidad, y luego analizados estadísticamente con la prueba de Kruskall Wallis. En estos resultados no se encontraron diferencias significativas, pues el T1 presentó una ganancia de peso diaria de 1 kg y el T2 de 0,94 kg, llegando a pesos vivos promedios entre 100 y 93 kg respectivamente. El análisis económico de la ración incluyó costo de la mano de obra, variación en el costo del concentrado y el valor de los cerdos. Los análisis determinaron que el costo ración/día/animal para T1 fue de 2.350 COP y para el T2 de 1.725 COP, calculando una reducción de hasta un 25% para T2. Por tanto, se

concluyó que los cerdos alimentados con concentrado y plátano maduro obtienen una reducción significativa en los costos de producción y mantienen las ganancias de peso similares a aquellos que solo recibieron concentrado. Esto permite al pequeño productor aprovechar los excedentes de producción de plátano en su finca, utilizarlos en la alimentación alternativa de los cerdos en etapa de levante – finalización, mantener las ganancias diarias de peso y disminuir los costos de producción.

Palabras clave: Dietas alternativas, cerdos, suplementación, ganancia de peso, costos de alimentación.

Economic evaluation of two rations for feeding growing – finishing pigs in Briceño, Boyacá

Abstract

The study was carried out at the Alejandría farm in the municipality of Briceño, Boyacá. The objective of this work was to evaluate the weight gain and cost of the ration in pigs, during the lifting stage. In a completely randomized design within an intensive production system, 12 pigs with weights between 20 and 23 kg of the Hypo-Tecniagro genetic line were selected. These were distributed in 2 treatments with 6 repetitions, which were provided with food as follows: T1 Control diet with Italcol concentrate Piglet lift 1 Orange and T2 Alternative diet with 50% concentrate and 50% banana *Mussa sp*, which was supplied peeled, ripe and cooked to facilitate its consumption. In both cases the foods were supplied ad libitum. All animals were weighed every 15 days with an electronic scale and records were taken of the amount of feed supplied for each treatment. At the end of 14 weeks, daily weight gain data were subjected to tests of normality and homogeneity, and then analyzed statistically with the Kruskall Wallis test. In these results no significant differences were found, since T1 presented a daily weight gain of 1 kg and T2 of 0.94 kg, reaching average live weights between 100 and 93 kg respectively. The economic analysis of the ration included labor cost, variation in the cost of the concentrate and the value of the pigs. The analysis determined that the ration / day / animal cost for T1 was 2,350 COP and for the T2 of 1,725 COP, calculating a reduction of up to 25% for T2. Therefore, it was concluded that the pigs fed with concentrate and mature banana obtain a significant reduction in production costs and maintain the weight gains similar to those that only received concentrate. This allows the small farmer to take advantage of surplus plantain production on his farm, use it in the alternative feeding of the pigs in the lifting-finishing stage, and maintain daily weight gains and lower production costs.

Keywords: Alternative diets, pig, supplementation, weight gain, food costs.

Desarrollo larval del pez luchador de Siam asociado a alimento vivo en diferentes intervalos de tiempo

Maria Fernanda Estupiñan Botia, Andrea Tatiana Simbaqueba Becerra, Leonardo Avendaño Vasquez.

Semillero de Investigación Yaskua. Programa de Zootecnia – IPRED- Centro de Investigaciones para el Desarrollo Agroindustrial (CIAGRO) - Universidad Industrial de Santander- Sede Málaga,
Santander. mafestupinan@hotmail.com,
atsimbaqueba@gmail.com, lavandanov2005@hotmail.com.

Resumen

Cada año, la demanda mundial de peces ornamentales está aumentando, como lo demuestra el crecimiento de las exportaciones de los principales países productores en 11.6% en 2015. El pez luchador Siam (*Betta splendens*) es una de las especies más demandadas en el mercado; pertenecen al grupo de peces Anabantidae, buscado por su atractivo, color y tamaño de aleta. La dificultad de alimentar a la especie en etapa larval es uno de los desafíos para el acuarista y el productor; teniendo mortalidades hasta el 95%. El uso de alimento vivo en las primeras etapas de desarrollo permite el desarrollo del tracto gastrointestinal de los animales. Entre los alimentos en vivo que el productor puede utilizar están: Infusoria (INF), *Panagrellus redivivus* (PR), *Artemia salina* (A) y *Daphnia magna* (DM). Sin embargo, el desconocimiento de su aplicación no ha permitido mantener una alta supervivencia en el primer mes de vida de las larvas. Por lo tanto, el presente trabajo tiene como objetivo evaluar diferentes intervalos de tiempo en larvas de *Betta splendens*, sometidas a alimento vivo. 200 larvas de *Betta splendens* estarán sujetas a diferentes intervalos de tiempo de alimento vivo; T0: 45 días A; T1: 5 días INF, 5 días PR, 10 días A, 25 días DM; T2: 15 días INF, 5 días PR, 10 días A, 15 días DM; T3: 20 días INF, 5 días PR, 15 días A, 5 días DM. Las variables productivas evaluadas estarán determinadas por la ganancia de peso (g), la ganancia de tamaño (mm), la supervivencia (%) y la tasa de crecimiento específico. Los datos serán analizados por ANAVA ($p <0.05$) utilizando el complemento del Modelo lineal generalizado.

(GLM) de SAS versión 9.4 (2015) y Tukey para comparación de medias. Los resultados permitirán determinar los protocolos de alimentación para mejorar los parámetros productivos de larvas de 1 a 45 días.

Palabras clave: Pez, nutrición, ornamental, *Panagrellus redivivus*, *Daphnia magna*, *Artemia salina*.

Larval development of the Siam fighting fish associated to live food at different time intervals

Abstract

Each year, the world demand for ornamental fish is increasing, demonstrated by the growth of exportations from the main producing countries in 11.6% in 2015. The Siam fighter fish (*Betta splendens*) is one of the most demanded species in the market; they belong to the group of Anabantidae fish, wanted by its attractiveness, color and fin size. The difficulty of feeding the species in a larval stage is one of the challenges for the aquarist and the producer; having mortalities up to 95%. The use of live feed in the early stages of development allows the development of gastrointestinal tract of animals. Among the live foods of which the producer can make use are: Infusoria (INF), *Panagrellus redivivus* (PR), *Artemia salina* (A) and *Daphnia magna* (DM). However, ignorance of its application has not allowed maintaining a high survival in the first month of life of the larvae. Therefore, the present work aims to evaluate different time intervals in *Betta splendens* larvae, subjected to live food. 200 *Betta splendens* larvae will be subjected to different time intervals of live food; T₀: 45 days A; T₁: 5 days INF, 5 days PR, 10 days A, 25 days DM; T₂: 15 days INF, 5 days PR, 10 days A, 15 days DM; T₃: 20 days INF, 5 days PR, 15 days A, 5 days DM. The productive variables evaluated will be determined by the Weight Gain (g), Size Gain (mm), Survival (%) and Specific Growth Rate. The data will be analyzed by ANAVA (p <0.05) using the Generalized Linear Model complement. (GLM) of SAS version 9.4 (2015) and Tukey for comparison of means. The results will allow determining feeding protocols to improve the productive parameters of larvae from 1 to 45 days.

Keywords: Fish, nutrition, ornamental, *Panagrellus redivivus*, *Daphnia magna*, *Artemia salina*.

Análisis de indicadores metabólicos en ovinos alimentados con forrajes utilizando *Lactobacillus sp.* y *Saccharomyces sp*

María Ligia Roa Vega¹ y Cesar Augusto Navarro Ortiz²

¹Zootecnista Esp. MSc. Docente Universidad de los Llanos de Investigación Agroforestería, Villavicencio-Meta, Colombia Email: mroa@unillanos.edu.co. ²Médico Veterinario Zootecnista, MSc. Docente catedrático Universidad de los Llanos: Email: cesar.navarro@unillanos.edu.co

Resumen

Los microorganismos como *Lactobacillus sp.* y *Saccharomyces sp* se les consideran eficientes porque colaboran con las bacterias en el rumen a la fragmentación de la celulosa y lignina, transformando materiales fibrosos sin causar influencias negativas en el proceso; al contrario, sintetizan sustancias útiles para el crecimiento de los animales a partir de aminoácidos y azúcares secretados por bacterias. Estos microorganismos eficientes (ME) pueden variar la química sanguínea de los animales cuando son suministrados de manera permanente en las raciones durante la ceba de los ovinos, influyendo en los parámetros productivos. Los ME son precursores del ácido linoléico (AL), cuyo valor nutracéutico beneficia la salud humana por su actividad anticancerígena, antidiabética, antiteratógenica y antioxidante, además el AL es considerado como inmunomodulador y regulador de los niveles de colesterol. El objetivo de este trabajo es evaluar indicadores sanguíneos en ovinos de ceba utilizando *Lactobacillus sp.* y *Saccharomyces sp.* con una dieta a base de gramíneas (GR): *Braquiaria decumbens* en pastoreo y *Pennisetum hybridum* suplementados con tres arbustivas: *Hibiscus rosa sinensis*, (HB) *Moringa oleifera* (MO) y *Morus alba* (MA) y salvado de trigo (ST). La investigación se está realizando en Villavicencio, Meta, para lo cual se distribuyeron en un diseño de bloques completamente al azar (BCA), diez ovinos cruzados Camuro por Katahdin. Los tratamientos son T1: GR (BD en pastoreo y un kg fresco de PH), T2: GR, suplementados con HB; T3: GR suplementado con MO; T4: GR suplementados con MA, y T5 GR suplementados con ST. Se esta

suministrando 10 ml diarios por animal de los preparados de EM (*Lactobacillus sp.* y *Saccharomyces sp*) manteniendo 2.0×10^2 unidades formadoras de colonias UFC/litro (Lila et al., 2004); las muestras de sangre se están tomando cada 10 días cuando los ovinos son pesados, este periodo de ceba dura aproximadamente 60 días, obteniéndose siete muestras por animal, que son llevadas al Laboratorio Clínico de la UNILLANOS para ser analizadas en el equipo Mindray BA-88^a y así determinar: glucosa (glicemia), nitrógeno ureico sanguíneo (BUN), creatinina, Alanina transaminasa (ALT), aspartato amino-transferasa (AST), triglicéridos, colesterol, proteínas totales (PT), albúmina, globulinas, y urea.

Palabras clave: Bioquímica sanguínea, ovinos, arbustivas, probióticos

Analysis of metabolic indicators in sheep feeded with forage using *Lactobacillus sp.* and *Saccharomyces sp*

Abstract

Microorganisms such as *Lactobacillus sp.* and *Saccharomyces sp* are considered efficient because they collaborate with bacteria in the rumen to the fragmentation of cellulose and lignin, transforming fibrous materials without causing negative influences in the process; on the contrary, they synthesize useful substances for the growth of animals from amino acids and sugars secreted by bacteria. These efficient microorganisms (EM) can vary the blood chemistry of the animals when they are permanently supplied in the rations during the fattening of the sheep, influencing the productive parameters. EMs are precursors of linoleic acid (LA), whose nutraceutical value benefits human health due to its anticarcinogenic, antidiabetic, antiteratogenic and antioxidant activity, and LA is considered an immunomodulator and regulator of cholesterol levels. The objective of this work is to evaluate blood indicators in ovines of fattening using *Lactobacillus sp.* and *Saccharomyces sp.* with a diet based on grasses (GR): *Braquiaria decumbens* in grazing and *Pennisetum hybridum* supplemented with three shrubs: *Hibiscus rosa sinensis*, (HB) *Moringa oleifera* (MO) and *Morus alba* (MA) and wheat bran (WB). The research is being carried out in Villavicencio, Meta, for which ten crossed sheep Camuro by Katahdin were distributed in a completely randomized block design (BCA). The treatments are T1: GR (BD in grazing and a fresh kg of PH), T2: GR, supplemented with HB; T3: GR supplemented with MO; T4: GR supplemented with MA, and T5 GR supplemented with ST. 10 ml per animal of the preparations of EM (*Lactobacillus sp.* And *Saccharomyces sp*) are being supplied per day maintaining 2.0×10^2 colony forming units CFU / liter (Lila et al., 2004); the blood samples are taken every 10 days when the sheep are heavy, this fattening period lasts approximately 60 days, obtaining seven samples per animal, which are taken to the Clinical Laboratory of UNILLANOS to be analyzed in the Mindray BA-88th equipment and thus determine: glucose (glycemia), blood urea nitrogen (BUN), creatinine, Alanine

transaminase (ALT), aspartate amino-transferase (AST), triglycerides, cholesterol, total protein (TP), albumin, globulins, and urea.

Keywords: Blood biochemistry, sheep, shrubs, probiotics.

El uso correcto de la comunicación visual para el desarrollo de manuales de prácticas en nutrición animal

Marisol Soledad García Cordero, Yesid Camilo Buitrago López

Universidad de Boyacá. msgarcia@uniboyaca.edu.co – yesbuitrago@uniboyaca.edu.co

Resumen

La comunicación visual en diseño gráfico, es un medio de transmisión de mensajes visuales estructurados, que buscan tener un significado fácil de comprender, debido a que la imagen es un factor de reacción, simbolización y percepción. Por tal razón, el objetivo de este proyecto, es disponer de la comunicación visual entre el emisor y el receptor de una forma organizada y estructurada, para facilitar y dinamizar la creación de manuales de prácticas en nutrición animal. Por tanto, se realizó una investigación documental que permitió seleccionar y analizar los escritos que contenían datos de interés relacionados con la nutrición animal para desarrollarlos e interpretarlos mediante el diseño de infografías que permitieran transmitir la información básica de una forma dinámica, atractiva y de fácil lectura. Una vez el manual fue debidamente estructurado y elaborado se realizó un pilotaje de aprobación a diferentes usuarios, los cuales manifestaron su aceptación por el aporte gráfico para su fácil lectura e igualmente presentaron diferentes recomendaciones para obtener un resultado óptimo en cuanto a los procesos y presentación en la publicación de manuales de nutrición animal.

Palabras clave: Comunicación visual, nutrición animal, diseño gráfico.

The correct use of visual communication, for the development of animal feeding practice manuals

Abstract

Visual communication in graphic design is a means of transmitting structured visual messages, which seek to have an easy to understand meaning, because the image is a factor of reaction, symbolization and perception. For this reason, the objective of this project is to have visual communication between the sender and the receiver in an organized and structured way, to facilitate and stimulate the creation of practice manuals on animal nutrition. Therefore, a documentary research was carried out that allowed to select and analyze the writings that contained interesting data related to animal nutrition to develop and interpret them through the design of infographics that allow transmitting the basic information in a dynamic, attractive and easy to read way. Once the manual was properly structured and elaborated, an approval pilot was made to different users, who expressed their acceptance by the graphic contribution for easy reading and also presented different recommendations to obtain an optimal result in terms of processes and presentation in the publication of animal nutrition manuals.

Keywords: Visual communication, animal nutrition, graphic design.

Evaluación de Biofloc en el crecimiento de peces goldfish y bailarinas utilizando lixiviado de humus de lombriz californiana reduciendo tiempo de comercialización

¹Miguel Hernando Marin Silva, ²Adriana Marcela Molano Marin

¹Zootecnista, Especialista en Administración y Gerencia Institucional, Magíster en Reproducción Animal, instructor investigador Sena Regional Risaralda Centro Atención Sector sede Pereira. Grupo de investigación en Ciencias Agropecuarias ICARUS miguel.marins@misen.edu.co.

²Medicina Veterinaria, Especialista en producción ganadera, instructor investigador Sena Regional Risaralda Centro Atención Sector sede Pereira. Grupo de investigación en Ciencias Agropecuarias ICARUS. adriana.molano@misen.edu.co

Resumen

En cualquier explotación acuícola la tecnología Biofloc es una muy buena herramienta para mejorar rendimientos. Consiste en propiciar la formación de flóculos en un cultivo teniendo como fuente lixiviado de humus de lombriz californiana, lo que permite conocer la contribución del Biofloc como fuente de alimento natural in situ, que es tan importante en la dieta de peces como de crustáceos de importancia comercial, sobre todo en estadios larvarios y de peces ornamentales. Con el trabajo se pretende evaluar Biofloc utilizando un litro de humus lixiviado por 10 metros cúbicos de agua, evaluando con un grupo testigo sin el tratamiento durante tres meses promediando peso y crecimiento en peces goldfish y bailarinas que es la edad de venta. Se espera reducir el tiempo de comercialización, mejorando ingresos y optimizando la capacidad instalada de la explotación.

Palabras claves: Comercialización, flóculos, lixiviado

Biofloc evaluation on growing fish, goldfish and bailarina using californian worm humus overflow, reducing commercialization time

Abstract

In any aquaculture farm Biofloc technology is a very good tool to improve yields. It consists of promoting the formation of flocs in a crop having leached as a source of Californian earthworm humus, which allows knowing the contribution of Biofloc as a source of natural food in situ, which is as important in the diet of fish as of crustaceans of commercial importance, especially in larval stages and ornamental fish. The aim of the study is to evaluate Biofloc using a liter of humus leached by 10 cubic meters of water, evaluating with a control group without treatment for three months, averaging weight and growth in goldfish and ballerinas, which is the age of sale. It is expected to reduce the time of commercialization, improving revenues and optimizing the installed capacity of the farm.

Keywords: Commerce, flocs, percolating.

Efecto de la suplementación a base de maíz forrajero (*Zea mays*) sobre parámetros productivos de bovinos en pastoreo

Miguel Alfonso Vergara Tamayo¹, Zoot. Esp.
Norberto Villa Duque², MVZ MSc. Gilliam
Bravo Torres³, Lic. Sociales.

Docentes Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia -
Instituto Universitario de la Paz, UNIPAZ^{1, 2}. Universidad
de Cundinamarca, UDEC³. Email:
miguel.vergara@unipaz.edu.co.

Resumen

En épocas de sequía los animales disminuyen la ingesta en cantidad y calidad nutricional de los forrajes. Suplementar con base en dietas alternativas, se sugiere, mejoraría el índice deficitario de los nutrientes necesarios para su manutención y producción. Este proyecto tiene como objetivo comparar el efecto de la suplementación a base de maíz forrajero (*Zea mays*) con diferentes fertilizantes sobre parámetros productivos de bovinos en pastoreo (ganancia de peso, digestibilidad, conversión alimenticia y consumo de materia seca). El trabajo se realizará en el Centro de Investigación Santa Lucia, Barrancabermeja - Santander, para lo cual se utilizaran 18 machos de levante, distribuidos en 3 tratamientos: T₁: suministro del 25% de la dieta con suplemento de 100% forraje de maíz previamente fertilizado con NPK 15%, T₂: suministro del 25% de la dieta con suplemento de 100% forraje de maíz previamente fertilizado con compost a base de bovinaza, equinaza y *Brachiaria humidicola*, T₃: suministro del 25% de la dieta con suplemento de 100% forraje de maíz previamente fertilizado con porquinaza y *Brachiaria humidicola*. Una semana de acostumbramiento a la suplementación pesando a los animales cada 15 días en el transcurso del proyecto, el cual tendrá una duración de 75 días. El tratamiento de la información se hará mediante estadística no paramétrica. La comparación de medias se hará mediante la prueba de Kruskal – Wallis y para las comparaciones múltiples se utilizará la prueba de Bonferroni. Se espera definir cuál de los suplementos favorece más los parámetros productivos evaluados.

Palabras clave: Alimentación, machos de levante, ganancia de peso, conversión alimenticia, fertilizante.

Effect of food core supplementation (*Zea mays*) on productive parameters of grazing cattle

Abstract

In times of drought the animals reduce the intake in quantity and nutritional quality of the forages. Supplementing based on alternative diets, it is suggested, would improve the deficit index of the nutrients necessary for their maintenance and production. The objective of this project is to compare the effect of forage corn supplementation (*Zea mays*) with different fertilizers on productive parameters of grazing cattle (weight gain, digestibility, feed conversion and dry matter consumption). The work will be carried out at the Santa Lucia Research Center, Barrancabermeja - Santander, for which 18 levante males will be used, distributed in 3 treatments: T₁: supply of 25% of the diet with supplement of 100% corn feed previously fertilized with NPK 15%, T₂: supply of 25% of the diet with supplement of 100% corn feed previously fertilized with compost based on bovinaza, equinaza and *Brachiaria humidicola*, T₃: supply of 25% of the diet with supplement of 100% forage of corn previously fertilized with porquinaza and *Brachiaria humidicola*. One week of accustomed to supplementation weighing the animals every 15 days during the course of the project, which will last for 75 days. The information will be processed using non-parametric statistics. The comparison of means will be made by means of the Kruskal - Wallis test and for the multiple comparisons the Bonferroni test will be used. It is expected to define which of the supplements favors more the productive parameters evaluated.

Keywords: Feeding, lifting males, weight gain, feed conversion, fertilizer.

Efecto del *Cinnamomum zeylanicum* sobre la concentración de metabolitos sanguíneos en perros obesos

Laura Yesenia Velásquez¹; Jorge Enrique Gallego²; Mónica Duque Quintero³.

¹Estudiante de pregrado. Facultad de Medicina Veterinaria.
Uniremington, Medellín, Colombia.

lvelasquezcardona@gmail.com ²Hospital Veterinario de Universidad de Antioquia. Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad de Antioquia. joga07@hotmail.com. ³Profesor de tiempo completo. Facultad de Medicina Veterinaria.

Uniremington, Medellín, Colombia.
monica.duque@uniremington.edu.co

Resumen

El sobrepeso y la obesidad es una de las enfermedades nutricionales más comunes en perros, que están asociadas a otras patologías como la enfermedad músculo esquelética, la enfermedad cardiovascular, la diabetes mellitus, la dermatosis, la intolerancia al ejercicio, el deterioro en la eficiencia reproductiva y la hipertensión, entre otras. Actualmente, algunos productos naturales como el *Cinnamomun* han cobrado especial importancia en la nutrición por sus efectos benéficos en la salud animal y humana. El objetivo de este estudio es evaluar el efecto del *Cinnamomum zeylanicum* sobre el consumo de materia seca, metabolitos sanguíneos y presión arterial en perros adultos con obesidad e hiperglicemia. Se tomarán 24 perros adultos obesos de la raza labrador y se asignarán a uno de los tratamientos. T1: es el grupo control, al que se suplementará 0.75 g de placebo; T2 y T3: grupo suplementado con 0.75 y 2.25 g/día de *Cinnamomum zeylanicum* durante tres meses respectivamente. Se realizará control médico mensualmente y se determinará consumo de materia seca, condición corporal, glucosa, perfil lipídico, presión arterial, aspartato aminotransferasa. Las variables serán evaluadas por medidas repetidas en el tiempo por el PROC MIXED del paquete estadístico SAS. Las cápsulas de placebo y *Cinnamomun* fueron elaboradas en gelatina blanda con olor a jamón, se está realizando la búsqueda de los animales experimentales y hasta el momento se cuenta con un total de diez. De encontrarse un efecto positivo con el uso de la canela, se espera que estos resultados den una solución práctica y económica

a los propietarios de mascotas para controlar el peso de los animales y el desarrollo de patologías debido a la obesidad e hiperglicemia, con el fin de garantizar que los perros tengan una mejor salud y por ende una mejor calidad de vida.

Palabras clave: Canela, obesidad, sobrepeso, productos naturales.

Agradecimiento

Corporación Universitaria Remington por la financiación del proyecto “Efecto de la suplementación con *Cinnamomum zeylanicum* sobre el consumo, concentración de metabolitos sanguíneos y presión arterial en perros adultos con hiperglicemia y obesidad”

Effect of *Cinnamomum zeylanicum* on the concentration of blood metabolites in obese dogs**Abstract**

Overweight and obesity is one of the most common nutritional diseases in dogs, which are associated with other pathologies such as skeletal muscle disease, cardiovascular disease, diabetes mellitus, dermatosis, exercise intolerance, deterioration in reproductive efficiency and hypertension, among others. Currently, some natural products such as *Cinnamomun* have gained special importance in nutrition because of their beneficial effects on animal and human health. The objective of this study is to evaluate the effect of *Cinnamomum zeylanicum* on the consumption of dry matter, blood metabolites and blood pressure in adult dogs with obesity and hyperglycemia. 24 adult obese dogs of the Labrador breed will be taken and assigned to one of the treatments. T1: is the control group, to which 0.75 g of placebo will be supplemented; T2 and T3: group supplemented with 0.75 and 2.25 g / day of *Cinnamomun zeylanicum* for three months respectively. Medical check-up will be carried out monthly and dry matter intake, body condition, glucose, lipid profile, blood pressure, aspartate aminotransferase will be determined. The variables will be evaluated by measures repeated over time by PROC MIXED of the SAS statistical package. The capsules of placebo and *Cinnamomun* were elaborated in soft gelatin with smell of ham, the search of the experimental animals is being carried out and until the moment it is counted on a total of ten. If a positive effect is found with the use of cinnamon, it is expected that these results will give a practical and economic solution to pet owners to control the weight of animals and the development of pathologies due to obesity and hyperglycemia, in order to ensure that dogs have better health and therefore a better quality of life.

Keywords: *Cinnamon*, natural products, obesity, overweight.

Caracterización de los servicios de evaluación nutricional de perros y gatos en las Clínicas Veterinarias de la ciudad de Medellín 2018-2019

Andrés Felipe Cadavid¹, Andrés Jaramillo Múnera¹, Harold Areiza², Mónica Duque Quintero³

¹Estudiante de pregrado de la Facultad de Medicina Veterinaria, Uniremington, Medellín, Colombia. ²Profesor de la Facultad de Medicina Veterinaria. Clínica Veterinaria Santa Elena. Uniremington, Medellín.

harol.areiza@uniremington.edu.co. ³Profesora de la Facultad de Medicina Veterinaria. Uniremington, Medellín. monica.duque@uniremington.edu.co

Resumen

La nutrición es fundamental para prevenir o tratar diferentes enfermedades en las mascotas como la osteocondrosis, displasia de cadera, osteoartritis, anemia, obesidad, reacción adversa a los alimentos, diabetes mellitus II. Actualmente, si una mascota va a una clínica o centro veterinario, la valoración está relacionada a las cuatro señales vitales del examen clínico, como son temperatura, pulso, respiración y evaluación del dolor, que son evaluados en cada interacción con el paciente. Sin embargo, todos los pacientes que llegan al hospital veterinario, deberían pasar por una valoración nutricional y recibir recomendaciones nutricionales específicas cuando visitan un centro médico. El objetivo de este trabajo es caracterizar los servicios de evaluación nutricional de perros y gatos en las Clínicas Veterinarias de la ciudad de Medellín. Serán realizadas encuestas a todas las Clínicas Veterinarias de la ciudad de Medellín, en las cuales se preguntará si se realiza valoración nutricional para determinar la salud de los animales que llegan a la consulta de la clínica veterinaria, qué parámetros son utilizados para la valoración nutricional en caso de ser realizada, qué persona es la encargada de realizar la valoración nutricional de los animales, qué pacientes consultan por problemas nutricionales y cuáles son los más comunes en el centro o clínica veterinaria; hasta el momento, de las encuestas realizadas, en ninguna de ellas se realiza valoración nutricional en la clínica o centro veterinario de la ciudad de Medellín. Este estudio muestra la falta de evaluación nutricional en

algunas clínicas o centros veterinarios de la ciudad de Medellín; es necesario, por lo tanto, implementar metodologías adecuadas que permitan realizar estas valoraciones, con el fin de dar recomendaciones a los propietarios de las macotas y de esta forma prevenir enfermedades relacionadas a la nutrición de los animales de compañía.

Palabras clave: Animales de compañía, nutrición, salud animal

Agradecimientos

A la Corporación Universitaria Remington por la financiación del proyecto de investigación “Caracterización de los servicios de evaluación nutricional de perros y gatos en las Clínicas Veterinarias de la ciudad de Medellín e implementación en la clínica veterinaria de la Corporación Universitaria Remington- Santa Elena y el Hospital Veterinario de la Universidad de Antioquia, el uso de ICC, IMC, ICM en la valoración nutricional de perros entre los años 2018-2019”.

Characterization of nutritional assessment services of dogs and cats in the Veterinary Clinics of Medellin city 2018-2019**Abstract**

Nutrition is essential to prevent or treat different diseases in pets such as osteochondrosis, hip dysplasia, osteoarthritis, anemia, obesity, adverse reaction to food, diabetes mellitus II. Currently, if a pet goes to a clinic or veterinary center, the assessment is related to the four vital signs of the clinical examination, such as temperature, pulse, respiration and pain assessment, which are evaluated in each interaction with the patient. However, all patients who arrive at the veterinary hospital should go through a nutritional assessment and receive specific nutritional recommendations when they visit a medical center. The objective of this work is to characterize the services of nutritional evaluation of dogs and cats in the Veterinary Clinics of the city of Medellín. Surveys will be conducted at all the Veterinary Clinics of the city of Medellín, in which they will ask if nutritional assessment is carried out to determine the health of the animals that come to the veterinary clinic, which parameters are used for the nutritional assessment in if it is done, which person is responsible for carrying out the nutritional assessment of the animals, which patients consult for nutritional problems and which are the most common in the center or veterinary clinic; So far, of the surveys carried out, none of them carried out nutritional assessment in the clinic or veterinary center of the city of Medellín. This study shows the lack of nutritional evaluation in some clinics or veterinary centers of the city of Medellín; it is necessary, therefore, to implement adequate methodologies that allow these assessments to be made, in order to give recommendations to the owners of the pets and in this way prevent diseases related to the nutrition of companion animals.

Keywords: Pet animals, nutrition, animal health.

Suplementación con Zinc y probióticos sobre el desempeño productivo y la salud intestinal de terneras

Santiago Saldarriaga¹, Raúl Mazo², Ana Lucía Castaño², Mónica Duque Quintero²

¹Estudiante de pregrado de la Facultad de Medicina Veterinaria, Uniremington, Medellín, Colombia. ²Profesor (a) de la Facultad de Medicina Veterinaria. Uniremington, Medellín. Contacto: monica.duque@uniremington.edu.co

Resumen

El manejo de las terneras, así como su salud y desarrollo para el reemplazo de vacas adultas, es tarea de gran relevancia en la ganadería. Muchos casos de pérdidas en las fincas lecheras son resultado del mal manejo, alimentación y estrés de los animales, llevando a la generación de infecciones y depresión del sistema inmune en terneros. La diarrea neonatal es una de las enfermedades que, con mayor frecuencia, se presentan en terneros en los primeros días de nacidos y en todos los casos sus consecuencias negativas afectan económicamente a la explotación. La diarrea es la principal causa de mortalidad en terneros llegando incluso hasta un 48%, por lo cual es necesario desde la alimentación prevenir este tipo de problemas en el hato lechero con alternativas diferentes al uso de antibióticos. El objetivo es evaluar los efectos de la suplementación de Zinc y probióticos sobre el desempeño productivo y la salud intestinal de terneras en crecimiento en Antioquia. Serán utilizadas 30 terneras Holstein recién nacidas, las cuales serán distribuidas homogéneamente a uno de los tres tratamientos: T1 o Grupo control, T2: Al cual se le suministrará al destete, al mes y a los dos meses, un probiótico que contiene bacterias como *Bifidobacterium bifidum*, *Lactobacillus lactis*, *Lactobacillus acidophilus*, *Bacillus subtilis* y T3: Al cual se le suministrará al destete, al mes y a los dos meses, zinc (100 ppm) como ZnSO4 y un probiótico que contiene bacterias como *Bifidobacterium bifidum*, *Lactobacillus lactis*, *Lactobacillus acidophilus*, *Bacillus subtilis*. A estos animales se le determinará el peso al nacimiento, al destete y al tercer mes de nacimiento, número de casos de diarrea, consistencia y color de las heces, grado de deshidratación de los terneros con diarrea, tipo de

microorganismos principales encontrados en las muestras de heces, determinación de hematocrito y leucograma. En este momento se esta fase de consecución de las fincas y los animales; se espera con este proyecto generar una solución a la presentación de diarreas y mejorar el desempeño productivo en las terneras de levante en hatos lecheros del departamento de Antioquia.

Palabras clave: Nutrición, salud animal, *Bifidobacterium bifidum*, *Lactobacillus lactis*, terneras jóvenes.

Agradecimientos

A la Corporación Universitaria Remington por la financiación del proyecto de investigación “Efecto de la suplementación de Zinc y probióticos sobre el desempeño productivo y la salud intestinal de terneras en crecimiento”.

Zinc and probiotics supplementation in calves' performance and intestinal health

Abstract

The management of calves, as well as their health and development for the replacement of adult cows, is a task of great relevance in livestock. Many cases of losses in dairy farms are the result of poor management, feeding and stress of animals, leading to the generation of infections and depression of the immune system in calves. Neonatal diarrhea is one of the diseases that most often occur in calves in the first days of birth and in all cases its negative consequences economically affect exploitation. Diarrhea is the main cause of mortality in calves reaching up to 48%, which is why it is necessary from the feeding to prevent this type of problems in the dairy herd with alternatives to the use of antibiotics. The objective is to evaluate the effects of Zinc and probiotic supplementation on the productive performance and intestinal health of growing calves in Antioquia. 30 newborn Holstein calves will be used, which will be distributed homogeneously to one of the three treatments: T1 or Control group, T2: To which we will provide at weaning, at month and two months, a probiotic containing bacteria such as *Bifidobacterium bifidum*, *Lactobacillus lactis*, *Lactobacillus acidophilus*, *Bacillus subtilis* and T3: To which will be supplied at weaning, one month and two months, zinc (100 ppm) as ZnSO₄ and a probiotic containing bacteria such as *Bifidobacterium bifidum*, *Lactobacillus lactis*, *Lactobacillus acidophilus*, *Bacillus subtilis*. These animals will be determined the weight at birth, at weaning and the third month of birth, number of cases of diarrhea, consistency and color of feces, degree of dehydration of calves with diarrhea, type of major microorganisms found in samples stool, determination of hematocrit and leukogram. At this moment this phase of achievement of the farms and the animals; it is expected with this project to generate a solution to the presentation of diarrhea and to improve the productive performance in the calves of the dairy herds of the Department of Antioquia.

Keywords: Animal Health, *Bifidobacterium bifidum*, calves, *Lactobacillus lactis*, nutrition.

Ensilaje liquido de residuos de postcosecha de papa (*Solanum tuberosum*) como alternativa de alimentación animal

Luis Miguel Borras Sandoval¹, Mónica Andrea Moyano Bautista²

¹Zootecnia, Esp, Msc, Ph.D. Docente Programa Medicina Veterinaria y Zootecnia, Investigador Grupo de Investigación en Bioquímica y Nutrición Animal, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. lumib030@gmail.com. ²MVZ, Esp. Docente Programa Medicina Veterinaria y Zootecnia, Investigador Grupo de Investigación en Bioquímica y Nutrición Animal, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. monica.moyano@uptc.edu.co - Moniquitamvz@gmail.com

Resumen

El objetivo del presente trabajo fue preparar y evaluar un alimento por fermentación en estado líquido de residuos de postcosecha de papa (*Solanum tuberosum*) como alternativa en alimentación animal. En la preparación del producto se empleó tubérculos de la papa obtenidos comercialmente, limpios y picados finamente. Se utilizó proporciones de 62% de papa, 30% material fibroso (harina de maíz); 5% de melaza; 2% del preparado microbiano (yogur), 0,5% premezcla mineral y carbonato de calcio (0, 0.25 y 0.50%). Los ingredientes se mezclaron hasta obtener una pasta homogénea completando el volumen de los recipientes con agua. Se distribuyó en recipientes plásticos de 500g sellados no herméticamente. Se procedió a incubar los recipientes plásticos a temperatura ambiente (15°C), durante 10 y 15 días, cada recipiente representó una unidad experimental, con tres repeticiones cada una, según los tratamientos. Se tomaron muestras a las 0 h, y 10 y 15 días de fermentación. Se les realizó análisis microbiológico para aerobios mesófilos, coliformes totales, coliformes fecales, esporas de *Clostridium*, hongos y levaduras, *Salmonella*, bacterias ácido lácticas; y análisis químico para determinar humedad (H), materia seca (MS), proteína bruta (PB) y cenizas (Cz), según métodos establecidos. Finalmente, se realizó análisis de costo. Según características organolépticas el alimento cumplió con lo establecido para un ensilaje bueno. El valor más alto de PB se presentó en el tratamiento con mayor adición de carbonato de calcio. La MS presentó disminución

con el tiempo. El valor de fibra mostró un incremento duplicando el valor reportado para la papa cruda. En el análisis microbiológico se observaron crecimientos deseables de bacterias ácido lácticas en el tiempo siendo las más altas (27×10^6), a los 15 días con 0,5% de CaCo3, ausencia de coliformes, hongos, al igual que *Salmonella* y *Clostridium*, indicadores de inocuidad del alimento. La fermentación de los residuos postcosecha papa con adición de 0,50% de carbonato de calcio a los 15 días de fermentación, presento el mayor valor de proteína. El empleo de esta alternativa alimenticia podría representar un ahorro significativo para el productor.

Palabras clave. Alimentación Animal, proteína, microorganismo.

**Liquid silage of postharvest residues of pope
(*Solanum tuberosum*) as an alternative of
animal feeding****Abstract**

The objective of the present work was to prepare and evaluate a food by liquid fermentation of postharvest potato waste (*Solanum tuberosum*) as an alternative in animal feed. In the preparation of the product, potato tubers obtained commercially, cleaned and finely chopped were used. Proportions of 62% potato, 30% fibrous material (corn flour) were used; 5% molasses; 2% of the microbial preparation (yogurt), 0.5% mineral premix and calcium carbonate (0.25, 0.25 and 0.50%). The ingredients were mixed until a homogeneous paste was obtained by filling the volume of the containers with water. It was distributed in plastic containers of 500g sealed not hermetically. The plastic containers were incubated at room temperature (15 ° C), for 10 and 15 days, each container represented an experimental unit, with three repetitions each, according to the treatments. Samples were taken at 0 h, and 10 and 15 days of fermentation. Microbiological analysis was performed for mesophilic aerobes, total coliforms, fecal coliforms, *Clostridium* spores, fungi and yeasts, *Salmonella*, lactic acid bacteria; and chemical analysis to determine humidity (H), dry matter (DM), crude protein (CB) and ash (Hs), according to established methods. Finally, cost analysis was carried out. According to organoleptic characteristics, the food complied with the provisions for good silage. The highest PB value was found in the treatment with the highest addition of calcium carbonate. The DM presented decrease with time. The fiber value showed an increase doubling the value reported for the raw potato. In the microbiological analysis, desirable growths of lactic acid bacteria were observed in the time being the highest (27×10^6), at 15 days with 0.5% of CaCo3, absence of coliforms, fungi, like *Salmonella* and *Clostridium*, indicators of food safety. The fermentation of post-harvest potato residues with the addition of 0.50% calcium carbonate after 15 days of fermentation showed the highest protein value. The use of this alternative food could represent a significant saving for the producer.

Keywords: Animal Feed, protein, microorganism.

Niveles de inclusión de diatomeas de tierra como una alternativa nutracéutica para pollos de engorde

Nohemí Ortiz Barrera, Liseth Paola Rojas Martínez, Leonardo Avendaño Vásquez.

Semillero de Investigación Yaskua. Programa de Zootecnia – IPRED- Centro de Investigaciones para el Desarrollo Agroindustrial (CIAGRO) - Universidad Industrial de Santander- Sede Málaga, Santander.
nohem.2145128z@gmail.com,
rojasmartinez94@hotmail.com,
lavandanov2005@hotmail.com.

Resumen

La industria avícola colombiana presentó un consumo per cápita de carne de pollo de 32.8 Kg para 2017 comparado con 23.4 kg en 2010. El desequilibrio de macrominerales en la dieta puede tener como resultado el sufrimiento de enfermedades metabólicas como el raquitismo, la discondroplasia tibial y la perosis. La inclusión de minerales traza puede promover el desarrollo de barreras inmunes; mejorar la digestibilidad de TGI y el rendimiento de la canal. La tierra de diatomeas, proporciona minerales que actúan principalmente como cofactores del metabolismo interviniendo en el consumo de alimentos, sus macro minerales forman parte de los componentes estructurales del organismo y elementos menores ayudan a aumentar la resistencia contra enfermedades y son parte de las células sanguíneas, promueven activación enzimática y energética que contribuye a la reducción de problemas locomotores y bienestar animal relacionados con la microbiota TGI. Por lo tanto, el presente estudio pretende determinar el uso de tierra de diatomeas como un nutriente nutracéutico en la dieta de pollos de engorde y su contribución en los parámetros productivos y el bienestar intestinal. 120 Aves de 1 día de nacimientos se distribuirán aleatoriamente en 12 unidades experimentales que se someterán a cuatro tratamientos durante 42 días: T1 = Dieta sin suplementación de tierra de diatomeas, T2 = Dieta + inclusión del 1% de tierra de diatomeas; T3 = Dieta + inclusión del 1.5% de Diatomaceous de la Tierra y T4 = Dieta + inclusión del 2% de Diatomaceous de la Tierra. El pesaje se realizará durante los días 1, 7, 14, 21, 28, 35, 42 para el

proceso de cálculo de la ganancia de peso diaria, la conversión de alimentos, la eficiencia alimentaria y la mortalidad. El bienestar intestinal se determinará por el método ISI descrito por Kraieski et al (2017) y se recogerán las heces fecales para el examen coprológico utilizando la fórmula $hpg = (\text{Número de huevos contados} * 1 \text{ g}) / \text{cantidad recolectada para la muestra}$. Los datos serán analizados por ANAVA ($p < 0.05$) utilizando el modelo lineal generalizado complementario (GLM) de SAS versión 9.4 (2015) y Tukey para comparación de medias. Los resultados permitirán determinar los beneficios en cuanto a parámetros productivos, bienestar intestinal y salud.

Palabras clave: Nutrición, requerimientos, producción, parásitos, alternativas, balance nutricional.



Levels of inclusion of diatomaceous earth as a nutraceutical alternative for broilers

Abstract

The Colombian Poultry Industry presented a per capita consumption of chicken meat of 32.8 Kg for 2017 compared with 23.4 kg in the 2010. The imbalance of macrominerals in diets can have might result in the suffering of metabolic diseases as the rickets, tibial dyschondroplasia and perosis. The inclusion of trace minerals can promote the development of immune barriers; improve TGI digestibility and carcass yield. The diatomaceous earth, provides minerals that act mainly as cofactors of metabolism intervening in the consumption of food, its macro minerals are part of the structural components of the body and minor elements help to increase resistance against diseases and are part of the blood cells, promote enzymatic and energetic activation contributing to the reduction of locomotor problems and animal welfare related to the TGI microbiota. Therefore, the present study pretends determine the use of diatomaceous earth as a nutraceutical nutrient in the broiler diet and its contribution in the productive parameters and intestinal well-being. 120 birds of 1 day of births will be randomly distributed in 12 experimental units that will be subjected to four treatments for 42 days: **T₁**= Diet without Diatomaceous Earth supplementation, **T₂**= Diet + inclusion of 1% of Diatomaceous Earth; **T₃**= Diet + inclusion of 1.5% of Earth Diatomaceous and **T₄**= Diet + inclusion of 2% of Earth Diatomaceous. The Weighing will be performed during days 1, 7, 14, 21, 28, 35, 42 for the process of calculating the Daily Weight Gain, Food Conversion, Food Efficiency and Mortality. The Intestinal Well-being will be determined by the ISI method described by Kraieski *et al* (2017) and fecal stools will be collected for the coprological examination using the formula **hpg** = (Number of eggs counted * 1 g) / quantity collected for the sample. The data will be analyzed by ANAVA ($p <0.05$) using the complement Generalized Linear Model (GLM) of SAS version 9.4 (2015) and Tukey for comparison of means. The results will allow to determine the benefits regarding productive parameters, intestinal welfare and health.

Keywords: Nutrition, requirements, production, parasites, alternatives, balance nutrition.

Inclusión de xilanasa, amilasa, proteasa y manano-oligosacáridos en la dieta de pollos de engorde

Olga Lucia Torres Neira¹, Yesid Orlando González Torres², Livia Esperanza Farfán Lancheros³, Jose Manuel Mora Parada⁴

¹Profesora Asistente. Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Grupo de Investigación INPANTA.

otorres@jdc.edu.co. ²Profesor Titular. Fundación

Universitaria Juan de Castellanos. Grupo de Investigación INPANTA. ygonzalez@jdc.edu.co. ³Estudiante, Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Grupo de Investigación INPANTA. liesfala.jdc@hotmail.com. ⁴Profesor Asistente.

Fundación Universitaria Juan de Castellanos.

jmora@jdc.edu.co.

Resumen

La avicultura es una actividad que se ha intensificado en diversos países del mundo como China, Brasil, Estados Unidos, Japón, México, entre otros. Colombia es uno de los mayores productores de pollo de Latinoamérica, con un consumo per cápita de 32.5kg/persona/año en el 2017, datos que demuestran que es una de las carnes más apetecidas por los pobladores de diferentes estratos sociales. Para suplir dicha demanda, los productores se han esforzado en lograr mayores rendimientos de las aves, mediante el mejoramiento tecnológico, genético y alimenticio implementado en los galpones. Por lo que actualmente, resulta de interés la búsqueda de alternativas viables, siendo los aditivos una opción interesante, que se plantea como objetivo principal de esta investigación al evaluar el efecto de la amilasa, fitasa, proteasa y mananoooligosacáridos (MOS) en la dieta de pollos de engorde. Se utilizaran 100 aves de la línea comercial Cobb por un periodo de 42 días, las cuales serán distribuidas en un diseño completamente al azar, compuesto por 4 tratamientos: T1 control: 100% concentrado comercial, T2: concentrado comercial más la adición de 1.5 kg de MOS/tonelada, T3 concentrado comercial más 500g complejo enzimático/ton y T4 concentrado comercial más la adición de los dos aditivos. Se estudiarán variables zootécnicas como conversión y eficiencia alimenticia, consumo de alimento, porcentaje de mortalidad, ganancia diaria de peso, rendimiento de las canales y presas primarias. Se

tomaran registros semanales, para ser analizados por anova de un factor y por la prueba de Tukey se determinaran las diferencias entre tratamientos. Se espera que este estudio, contribuya al desarrollo de la avicultura haciendo énfasis en el papel de los aditivos como alternativas viables en la alimentación de aves de corral.

Palabras clave: Aditivos, calidad de carne, estrategias de alimentación, indicadores productivos.

Inclusion of xylanase, amylase, protease and manano-oligosaccharides in the chicken diet of chickens**Abstract**

Poultry farming is an activity that has intensified in various countries of the world such as China, Brazil, the United States, Japan, Mexico, among others. Colombia is one of the largest producers of chicken in Latin America, with a per capita consumption of 32.5kg / person / year in 2017, data that shows that it is one of the most desired meats by residents of different social strata. To meet this demand, the producers have strived to achieve higher yields of the birds, through the technological, genetic and nutritional improvement implemented in the sheds. For what is currently of interest is the search for viable alternatives, with additives being an interesting option, which is proposed as the main objective of this research when evaluating the effect of amylase, phytase, protease and mannooligosaccharides (MOS) in the diet of broiler chickens. 100 birds of the Cobb commercial line will be used for a period of 42 days, which will be distributed in a completely random design, consisting of 4 treatments: T1 control: 100% commercial concentrate, T2: commercial concentrate plus the addition of 1.5 kg of MOS / ton, T3 commercial concentrate plus 500g enzymatic complex / ton and T4 commercial concentrate plus the addition of the two additives. Zootechnical variables will be studied, such as conversion and food efficiency, food consumption, percentage of mortality, daily weight gain, yield of carcasses and primary dams. Weekly records will be taken, to be analyzed by anova of a factor and by the Tukey test the differences between treatments will be determined. This study is expected to contribute to the development of poultry by emphasizing the role of additives as viable alternatives in poultry feed.

Keywords: Additives, meat quality, feeding strategies, productive indicators.

Elaboración de un alimento a base de fermentación en estado sólido como alternativa de alimentación animal

Mora-Vargas Rafael¹, Borrás Luis Miguel², Cala Deisy Carolina³, Saavedra Gabriel Fernando⁴

¹Investigador, Grupo de Investigación en Bioquímica y Nutrición Animal, Facultad de ciencias Agropecuarias, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Tunja, Colombia. rafael.mora@uptc.edu.co. ²Docente Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC. Grupo de Investigación GIBNA. Colombia.

luis.borras@uptc.edu.co. ³Investigador, Grupo de Investigación en Bioquímica y Nutrición Animal, Facultad de ciencias Agropecuarias, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Tunja, Colombia. deisycala_186@htomail.com. ⁴Investigador, Grupo de Investigación en Bioquímica y Nutrición Animal, Facultad de ciencias Agropecuarias, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Tunja, Colombia. gafesamo@gmail.com

Resumen

En el campo de la nutrición animal, los altos gastos en la alimentación comercial representan entre el 60% y 70% de los costos de producción, debido principalmente a los altos precios de las materias primas tradicionales usadas para la elaboración de los piensos, como es el caso del maíz, sorgo, soya, entre otros, que en su mayoría son importados. En esta situación particular, radica la importancia de desarrollar nuevas y mejores alternativas de alimentación animal. Se hace necesaria la implementación de estrategias tecnológicas como la fermentación en estado sólido que permitan la obtención de alimentos de alto valor nutricional a bajo costo. El objetivo de esta investigación fue elaborar un alimento mediante FES zanahoria (*Daucus carota L.*) mezclados con otros ingredientes como alternativa para la alimentación en cerdos. El principal objetivo de este estudio es elaborar un alimento a base de fermentación en estado sólido evaluando la calidad composicional y crecimiento microbiológico de este. Se obtuvo un producto fermentado con las siguientes inclusiones: zanahoria: 20%, arroz 15%, maíz 8%, carbonato de calcio: 0,25%, minerales 1%, melaza: 10%, inoculo: 5%, torta de palmiste: 25%, café: 5%, alfalfa 10% y urea: 1%. El estudio se realiza en el Laboratorio de Nutrición Animal de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de

Colombia Uptc, en donde se realizó análisis composicional y microbiológico del alimento, se evaluará la variación del pH durante el proceso fermentativo y se evaluarán parámetros como: proteína, cenizas, FDN, FDA, materia seca, humedad, crecimiento de Enterobacterias (EC), levaduras (YM), mesofilos Totales (MT); a partir de los datos obtenidos se realizará una estadística de tipo descriptiva. Se espera que la zanahoria (*Daucus caretta L.*) como producto agrícola, sea una alternativa de alimentación animal por su alto contenido de carbohidratos fermentables y su porcentaje de humedad, lo que permitirá llevar a cabo procesos de fermentación en estado sólido.

Palabras clave: Fermentación, microorganismos, alimentación

Production of a food based on solid-state as alternative fermentation of animal feed

Abstract

In the field of animal nutrition, high expenditures on commercial feed account for between 60% and 70% of production costs, mainly due to the high prices of traditional raw materials used for the production of feed, as is the case of corn, sorghum, soybeans, among others, which are mostly imported. In this particular situation, lies the importance of developing new and better alternatives for animal feed. It is necessary to implement technological strategies such as fermentation in solid state that allow obtaining high nutritional value foods at low cost. The objective of this investigation was to elaborate a food by means of FES carrot (*Daucus carota L.*) mixed with other ingredients as an alternative for feeding in pigs. The main objective of this study is to prepare a food based on solid state fermentation, evaluating the compositional quality and microbiological growth of this. A fermented product was obtained with the following inclusions: carrot: 20%, rice 15%, corn 8%, calcium carbonate: 0.25%, minerals 1%, molasses: 10%, inoculum: 5%, palm kernel cake: 25%, coffee: 5%, alfalfa 10% and urea: 1%. The study is carried out in the Animal Nutrition Laboratory of the Pedagogical and Technological University of Colombia Uptc, where the compositional and microbiological analysis of the food was carried out, the variation of the pH during the fermentation process will be evaluated and parameters such as protein, ashes will be evaluated. , NDF, FDA, dry matter, humidity, growth of Enterobacteria (EC), yeasts (YM), Total mesophiles (TM); From the data obtained, a statistic of a descriptive type will be made. It is expected that the carrot (*Daucus mask L.*) as an agricultural product, is an alternative animal feed because of its high content of fermentable carbohydrates and its percentage of moisture, which will allow to carry out fermentation processes in solid state.

Keywords: Fermentation, microorganisms, food.

Pulpa de café ensilada en alimentación, desempeño productivo y rendimiento en canal de corderos

Raúl Velásquez V^{1,2}. Z. MSc. Ph.D; Julian Maya R¹. Ing. Agrop

¹Grupo GIBA, Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. ²Departamento de Producción Animal, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.
Raulvelas10@gmail.com.

Resumen

La caficultura genera cerca del 45% de desechos en forma de pulpa, la cual es una gran fuente de contaminación del entorno natural. La ovino-cultura es una alternativa de producción donde se pueden utilizar subproductos y residuos agroindustriales como suplemento de la ración. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la suplementación con ensilaje de pulpa de café sobre el desempeño productivo y rendimiento en canal de corderos, para lo cual se utilizaron 12 corderos machos en la Granja Román Gómez Gómez con un peso promedio de $21,35 \pm 4,29$ Kg, se separaron en tres lotes de 4 individuos cada uno y asignados a un diferente tipo de tratamiento. El tratamiento 1 fue el tratamiento control, forraje a voluntad más 300 g. de alimento balanceado comercial con 18% de proteína cruda. Los tratamientos 2 y 3 se suplementaron con un alimento balanceado que incluyó en su elaboración 20 y 40% de pulpa de café ensilada seca y molida. Fueron alimentados con forraje a voluntad y suplementados a razón de 300 g/día con alimentos balanceados antes mencionado. Además se les suministró sal mineralizada y agua a voluntad. No se presentaron diferencias significativas entre tratamientos ($p>0,05$) para ganancias de peso total ni diario (GPT, GPD). Así mismo, no se presentaron diferencias significativas ($p>0,05$) para las variables morfométricas entre tratamientos, siendo numéricamente mayores los del tratamiento control. Así mismo, los pesos de canal caliente (PCC) fueron numéricamente superiores, sin encontrar diferencias, lo cual lo corrobora el porcentaje de rendimiento en canal (RCC), que presentó un promedio de 45,8%, el cual es adecuado para el tamaño corporal y la edad en que se encontraban estos animales. La

pulpa de café es una materia prima que puede ser utilizada en la suplementación de ovinos de carne hasta en un 40% en la elaboración del alimento balanceado para suplementación.

Palabras clave: Alimentación, subproductos, rendimiento en canal, ovinos.

Coffee pulp used in feeding, productive performance and carcass yield in lambs**Abstract**

The coffee industry generates about 45% waste in the form of pulp, which is a great source of contamination of the natural environment. The livestock is a production alternative where you can use by-products and agroindustrial waste as a supplement to the ration. The objective of this work was to evaluate the effect of the supplementation with silage of coffee pulp on the productive performance and lamb carcass yield, for which 12 male lambs were used in Granja Román Gómez Gómez with an average weight of $21,35 \pm 4.29$ Kg, were separated into three lots of 4 individuals each and assigned to a different type of treatment. Treatment 1 was the control treatment, forage at will plus 300 g. of commercial balanced feed with 18% crude protein. Treatments 2 and 3 were supplemented with a balanced feed that included 20 and 40% of dried and milled silage coffee pulp. They were fed with forage at will and supplemented at a rate of 300 g / day with balanced feed mentioned above. In addition, they were supplied with mineralized salt and water at will. There were no significant differences between treatments ($p > 0.05$) for total or daily weight gains (TWG, DWG). Likewise, there were no significant differences ($p > 0.05$) for the morphometric variables between treatments, being numerically greater those of the control treatment. Likewise, the hot channel weights (HCW) were numerically superior, without finding differences, which is corroborated by the percentage of performance in channel (PPC), which presented an average of 45.8%, which is adequate for the size body and the age at which these animals were found. The coffee pulp is a raw material that can be used in the supplementation of sheep meat up to 40% in the production of balanced feed for supplementation.

Keywords: Feeding, byproducts, carcass yield, sheep.

Comportamiento ingestivo y consumo de ovinos en crecimiento recibiendo dos tipos de suplemento alimenticio

Diego Armando Navas Salgado¹, René Mauricio Patiño Pardo^{1*}, Luis Eduardo Castro Castro²

¹Universidad de Sucre, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Semillero INNOVAR, Sincelejo. *Profesor Asociado, Universidad de Sucre. rene.patino@unisucre.edu.co.

²Asistente técnico Somex S.A

Resumen

El objetivo del estudio fue evaluar el efecto de la oferta de dos tipos de suplemento comercial (mezcla mineral y mezcla múltiple -7.5% de N-) sobre las conductas de ingestión y el consumo de ovinos de pelo en crecimiento alimentados a base de heno de calidad inferior (5.1% de PB y 80.2% de FDN). Se utilizaron 16 animales de ambos sexos con peso (PC) de 24.5 kg (± 0.69) alojados en corrales. El estudio de comportamiento ingestivo se llevó a cabo durante 72 horas continuas de observación y medición del consumo; los datos se analizaron según un diseño en medidas repetidas en el tiempo. El consumo de suplemento varió ($p<0.001$) entre tratamientos, siendo de 43.5 g dia^{-1} para la mezcla mineral y de 105.8 g dia^{-1} para la mezcla múltiple, equivalentes a 0.18 y 0.44 % del peso corporal, respectivamente. El consumo de heno (1.98% PC), de FDN (1.55% PC) y de materia seca (MS) total (2.32% PC) no fueron afectados por los tratamientos ($p>0.05$), evidenciando un efecto aditivo del suplemento sobre el consumo total de MS, sin estímulo sobre el consumo de forraje. El tiempo dedicado al consumo de heno no varió entre tratamientos, y presentó en promedio un valor de $448.3 \text{ minutos dia}^{-1}$. Se observó una tendencia ($p=0.075$) de mayor tiempo de rumia en los animales suplementados con mezcla mineral, al igual que en el tiempo de rumia invertido por cada gramo de MS consumida, que fue de 0.9 minutos en el caso de la mezcla mineral y de 0.8 minutos para los animales suplementados con la mezcla múltiple. En promedio, los animales rumiaron 1.37 minutos por cada gramo de FDN consumido, sin diferencia entre tratamientos ($p>0.05$). Se concluye que, bajo las condiciones del estudio, el mayor consumo de suplemento múltiple ocasiona un efecto aditivo sobre el

consumo total de MS, sin estimular el consumo de forraje, y disminuye el tiempo de rumia.

Palabras clave: Alimentación, minerales, rumiantes.

Ingestive behavior and intake of growing sheep fed two types of supplement**Abstract**

The objective of the study was to evaluate the effect of the offer of two types of commercial supplement (mineral mixture and multiple mixture -7.5% of N-) on ingestion behaviors and consumption of growing hair sheep fed with hay from lower quality (5.1% PB and 80.2% NDF). We used 16 animals of both sexes with weight (PC) of 24.5 kg (± 0.69) housed in pens. The study of ingestive behavior was carried out during 72 continuous hours of observation and measurement of consumption; the data was analyzed according to a design in measures repeated over time. Supplement consumption varied ($p < 0.001$) between treatments, being 43.5 g dia-1 for the mineral mixture and 105.8 g dia-1 for the multiple mixture, equivalent to 0.18 and 0.44% of body weight, respectively. The consumption of hay (1.98% PC), NDF (1.55% PC) and dry matter (DM) total (2.32% PC) were not affected by the treatments ($p > 0.05$), evidencing an additive effect of the supplement on the total DM consumption, without stimulation on forage consumption. The time spent on hay consumption did not vary between treatments, and presented on average a value of 448.3 minutes day-1. A tendency ($p = 0.075$) of longer rumination time was observed in the animals supplemented with mineral mixture, as in the time of inverted rumination for each gram of DM consumed, which was 0.9 minutes in the case of the mineral mixture and of 0.8 minutes for the animals supplemented with the multiple mixture. On average, the animals ruminated 1.37 minutes for each gram of NDF consumed, with no difference between treatments ($p > 0.05$). It is concluded that, under the conditions of the study, the greater consumption of multiple supplement causes an additive effect on the total DM consumption, without stimulating the consumption of forage, and decreases the rumination time.

Keywords: Food, minerals, ruminants.

Composición láctea de vacas Gyr en Toledo, Norte de Santander, suplementadas con ensilaje integral de naranja

Wilmer Cuervo¹, Sandra Milena Quintero².

¹ Líder Nacional Especialización en Nutrición Animal Sostenible - UNAD wilmer.cuervo@unad.edu.co. ² Tutora Virtual UNAD Cúcuta – Pamplona - Especialista en Nutrición Animal Sostenible - UNAD sandra.quintero@unad.edu.co

Resumen

Esta investigación buscó determinar el efecto de la inclusión del ensilaje integral de naranja (ENA) sobre la producción y la calidad de la leche en bovinos raza Gyr en el municipio de Toledo, Norte de Santander ($7^{\circ}18'37''N$ $72^{\circ}28'59''O$; 1642msnm, 19°C, 94% Humedad). Para ello se asignaron 9 hembras Gyr (400 ± 10 Kg, 4 años) pastoreando *Cynodon plectostachyus*, *Brachiaria radicans plantaginea*, *Pennisetum* y sal mineral comercial, a uno de tres suplementos; 0g/d(TC), 250g/d(T25) o 500g/d(T50) de ENA (fermentado en caneca industrial por 21 días). Se midió volumen diario de leche (V) y semanalmente Grasa (G), proteína (P), sólidos no grasos (SNG) y acidez (AC) en leche (laboratorio de Control de Calidad - Universidad de Pamplona). Se utilizó un diseño completamente al azar (SAS 2002) con arreglo de medidas repetidas en el tiempo y Prueba de Tukey para la significancia de diferencias entre medias. El tiempo de muestreo y la suplementación afectaron simultáneamente V, SNG y G (<0,001) siendo mayores en T50 especialmente al final del experimento. P en leche fue superior (0,001) en T50 Con respecto a T0. Ni el momento de muestreo ni la adición de ensilaje afectaron significativamente el nivel de acidez. Nivel de G pudo relacionarse con mayor contenido de azúcares solubles y menor de fibrosos en ENA en T50, generando a su vez un mejor ambiente para el aprovechamiento ruminal de nitrógeno y mayor síntesis de proteína bacteriana. Reemplazar el 50% del Alimento concentrado comercial por ENA aumenta G y especialmente P en Vacas Gyr en Trópico medio. El aumento en G (30%) en T50 permite postular que la fibra presente en el ENA (32%) pudo mejorar la disponibilidad de precursores de ácidos grasos a nivel de la glándula mamaria.

Suplementar ENA para vacas en pastoreo es viable para sostener la producción de leche y mejorar significativamente su composición.

Palabras clave: Carbohidratos fibrosos, carbohidratos no estructurales, proteína en leche, grasa en leche, ácidos grasos volátiles.

**Milk composition of Gyr cows in Toledo
Santander, Using two levels of orange silage
as a diet supplement**

Abstract

This research aimed to determine the effect of the inclusion of integral orange silage (ENA) on the production and quality of milk in cattle Gyr breed in the municipality of Toledo, Norte de Santander ($7^{\circ} 18'37''\text{N}$ $72^{\circ} 28'59''\text{O}$; 1642msnm, 19°C, 94% Humidity). For this, 9 Gyr females (400 ± 10 Kg, 4 years old) were assigned grazing *Cynodon plectostachyus*, *Brachiaria radicans* *plantaginea*, *Pennisetum* and commercial mineral salt, to one of three supplements; 0g / d (TC), 250g / d (T25) or 500g / d (T50) of ENA (fermented in industrial caneca for 21 days). Daily volume of milk (V) and weekly fat (F), protein (P), non-fatty solids (NFS) and acidity (AC) in milk were measured (Quality Control laboratory - University of Pamplona). We used a completely randomized design (SAS 2002) according to measures repeated over time and Tukey test for the significance of differences between means. The sampling time and the supplementation affected simultaneously V, SNG and G (<0.001) being higher in T50 especially at the end of the experiment. P in milk was higher (0.001) in T50 with respect to T0. Neither the sampling time nor the addition of silage significantly affected the level of acidity. F level could be related to higher content of soluble sugars and less fibrous in ENA in T50, generating in turn a better environment for the ruminal use of nitrogen and higher synthesis of bacterial protein. Replacing 50% of the commercial concentrate feed with ENA increases F and especially P in Gyr Cows in the Middle Tropics. The increase in F (30%) in T50 allows us to postulate that the fiber present in the ENA (32%) could improve the availability of fatty acid precursors at the level of the mammary gland. Supplementing ENA for grazing cows is viable to sustain milk production and significantly improve its composition.

Keywords: Fiber carbohydrates, non-fiber carbohydrates, milk protein, milk fat, volatile fatty acids.

Producción y composición láctea de vacas mestizas suplementadas con Sacharina y Solicaña en trópico bajo colombiano

Wilmer Cuervo¹, Octavio Jaramillo².

¹ Líder Nacional Especialización en Nutrición Animal Sostenible - UNAD wilmer.cuervo@unad.edu.co ²Tutor SENA Risaralda - Especialista en Nutrición Animal Sostenible – UNAD adeagrojaramillo@gmail.com

Resumen

El presente estudio buscaba evaluar el efecto de la inclusión de dos suplementos de caña (Sacharina y Solicaña) sobre la cantidad y calidad de leche producida por vacas mestizas en la vereda del Valle de Risaralda del municipio de Viterbo, Risaralda (998 msnm, 28°c, 78%; 5°03'38"N 75°52'24"O). Para ello se identificaron 12 vacas mestizas (Tercer tercio de lactancia), 422 Kg ± 30 Kg de peso vivo (PV), en pastoreo de *Cynnodon nlemfuensis*, las cuales fueron asignadas aleatoriamente a uno de tres grupos; suplementación con concentrado comercial (TC-2Kg/d de CC), Sacharina tradicional (TSac-2Kg/d) o Solicaña (TSol-2Kg/d), siendo tratamientos isoprotéicos e isocalóricos. Durante 8 semanas se evaluó diariamente volumen de leche (**V**) y cada 2 semanas el contenido de proteína (**P**) grasa (**G**), Sólidos totales (**ST**), Sólidos no grasos (**SNG**), Lactosa (**L**), Nitrógeno ureico en leche (**NUS**), Recuento de células somáticas (**RCS**) Unidades formadoras de colonia (**UFC**) en leche, condición corporal (**CC**), peso vivo (**PV**) y Ganancia diaria de peso (**GDP**). Se utilizó un diseño completamente al azar con arreglo de medidas repetidas en el tiempo, para determinar diferencias significativas entre medias se utilizó una prueba de Tukey. El consumo de forraje en materia seca (% del PV) no difirió entre tratamientos (TC-2,27%), (TSol-2,29%) y (TSac-2,3%). Sin ser significativo, se observó que tanto V como GDP de vacas del TC (9.1L/d, - 53g/d) fue numéricamente inferior que TSac (9,9L/d, 347g/d) y que TSol (10L/d, 428g/d). Los SNG fueron estadísticamente inferiores en TC (8,66%) que en TSac (8,52%) y TSol (8,45%), tendencia que coincidió con la reducción diaria promedio en V a lo largo del estudio (TC -218mL/d, TSAC - 201 mL/d, TSol -38mL/d). Suplementar solicaña redujo L (4,95%-TC, 4,81%-TSol) pero aumento

NUS (12,61mg/dL-TC 14,62Mg/dL-TSol). El periodo de muestreo (días en lactancia) afectó estadísticamente la composición de leche (p 0,001). Reducción en P, G, L, ST pudo relacionarse con reducción en fibra asociada con preparación de Solicaña y especialmente sacharina. Así mismo el aumento de urea dietaria pudo generar mayor V en vacas suplementadas. Es recomendable utilizar Sacharina como substituto parcial del alimento concentrado de vacas mestizas en trópico medio – bajo.

Palabras clave: Urea - melaza, fibra dietaria, carbohidratos no estructurales, metabolismo ruminal, NUS.



Milk yield and composition of crossed cows supplemented with sacharina and solicaña in Colombian low tropic

Abstract

The present study sought to evaluate the effect of the inclusion of two cane supplements (Sacharina and Solicaña) on the quantity and quality of milk produced by crossbred cows in the village of Risaralda Valley of the municipality of Viterbo, Risaralda (998 masl, 28°c, 78%; 5 ° 03'38 "N 75 ° 52'24" W). For this purpose, 12 mestizo cows (third third of lactation), 422 Kg ± 30 Kg of live weight (LW), were grazed in *Cynnodon nlemfuensis* grazing, which were assigned randomly to one of three groups; supplementation with commercial concentrate (TC-2Kg / d of CC), traditional Sacharina (TSac-2Kg / d) or Solicaña (TSol-2Kg / d), being isoproteic and isocaloric treatments. During 8 weeks milk volume (V) was evaluated daily and every two weeks the content of protein (P) fat (F), total solids (TS), non-fatty solids (NFS), lactose (L), urea nitrogen in milk (UNM), Somatic cell count (SCC) Colony forming units (CFU) in milk, body condition (BC), live weight (LW) and daily weight gain (DWG). A completely randomized design was used with an arrangement of measures repeated over time. To determine significant differences between means, a Tukey test was used. The forage intake in dry matter (% of the PV) did not differ between treatments (TC-2.27%), (TSol-2.29%) and (TSac-2.3%). Without being significant, it was observed that both V and GDP of TC cows (9.1L / d, - 53g / d) were numerically lower than TSac (9.9L / d, 347g / d) and that TSol (10L / d, 428g / d). The NFSs were statistically lower in TC (8.66%) than in TSac (8.52%) and TSol (8.45%), a trend that coincided with the average daily reduction in V throughout the study (TC -218mL / d, TSAC -201 mL / d, TSol -38mL / d). Supplement solicaña reduced L (4.95% -TC, 4.81% -TSol) but increase NUS (12.61mg / dL-TC 14.62Mg / dL-TSol). The sampling period (days in lactation) statistically affected the milk composition ($p < 0.001$). Reduction in P, F, L, TS could be related to reduction in fiber associated with preparation of Solicaña and especially sacharina. Likewise, the increase in dietary urea could generate higher V in supplemented cows. It

is advisable to use Sacharina as a partial substitute for the concentrated feed of mestizo cows in the mid - low tropics.

Keywords: Urea – molasses, dietary fiber, non-fiber carbohydrates, ruminal metabolism, MUN.

Efecto de manano-oligosacáridos y un complejo enzimático en calidad del huevo de aves de postura

Yesid Orlando González Torres¹, Olga Lucia Torres Neira², Magda Alejandra Rodríguez Niño³

¹Profesor Titular. Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Grupo de Investigación INPANTA.

ygonzalez@jdc.edu.co. ²Profesora Asistente. Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Grupo de Investigación INPANTA. otorres@jdc.edu.co. ³Estudiante, Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Grupo de Investigación INPANTA. marodriguez@jdc.edu.co.

Resumen

El uso de aditivos en la dieta de las aves se ha intensificado en los últimos años, debido a la necesidad de mejorar los sistemas de alimentación para la obtención de productos de mejor calidad. Por ello, resulta de interés, evaluar el efecto de mananooligosacáridos (MOS) y un complejo enzimático sobre indicadores productivos y calidad del huevo de 60 gallinas de postura de línea comercial Isa Brown de 20 semanas de edad, las cuales se alojarán durante 8 semanas en un sistema tradicional y serán distribuidas en un diseño completamente al azar, compuesto por 4 tratamientos: T1 control: 100% concentrado comercial, T2: concentrado comercial más la adición de 1.5 kg de MOS/tonelada, T3 concentrado comercial más 50g complejo enzimático/ton y T4 concentrado comercial más la adición de los dos aditivos. Las variables a estudiar serán: porcentaje de postura y mortalidad, conversión alimenticia de las aves, espesor de cáscara, peso, masa e índice morfológico del huevo. Se tomarán registros diarios, los cuales serán analizados por anova de un factor, las diferencias entre tratamientos se determinarán por la prueba de Tukey. Se espera que este proyecto de investigación beneficie a medianos y pequeños productores del sector avícola, al permitir la inclusión de MOS y de enzimas dentro de sus modelos productivos como una estrategia que mejore los rendimientos de las gallinas ponedoras comerciales.

Palabras clave: Aditivos, calidad del huevo, estrategias de alimentación, gallinas.

Effect of mannan-oligosaccharides and an enzymatic complex in the egg quality of hens

Abstract

The use of additives in the diet of birds has intensified in recent years, due to the need to improve feeding systems to obtain better quality products. Therefore, it is of interest to evaluate the effect of mannan-oligosaccharides (MOS) and an enzymatic complex on productive indicators and egg quality of 60 stallions of Isa Brown commercial line of 20 weeks of age, which will be housed for 8 weeks in a traditional system and will be distributed in a completely randomized design, consisting of 4 treatments: T1 control: 100% commercial concentrate, T2: commercial concentrate plus the addition of 1.5 kg of MOS / ton, T3 commercial concentrate plus 50g enzyme complex / ton and T4 commercial concentrate plus the addition of the two additives. The variables to be studied will be: percentage of posture and mortality, feed conversion of the birds, thickness of the shell, weight, mass and morphological index of the egg. Daily records will be taken, which will be analyzed by anova of a factor, the differences between treatments will be determined by the Tukey test. It is expected that this research project will benefit medium and small producers of the poultry sector, by allowing the inclusion of MOS and enzymes within their production models as a strategy that improves the yields of commercial laying hens.

Keywords: Additives, egg quality, feeding strategies, hens.

Efecto de la suplementación de harina de *Eichhornia crassipes* en la producción de vacas lecheras

Yesid Orlando González Torres¹, Olga Lucia Torres Neira², Laura Estefanía Ávila Jiménez³

¹Docente Titular, Fundación Universitaria Juan De Castellanos, Grupo INPANTA, ygonzalez@jdc.edu.co.

²Docente Asociado, Fundación Universitaria Juan De Castellanos, Grupo INPANTA, otorres@jdc.edu.co.

³Estudiantes, Fundación Universitaria Juan De Castellanos, Grupo INPANTA. lauavila9621@gmail.com.

Resumen

La alimentación de vacas lecheras se basa principalmente en el uso de forrajes, sin embargo, se hace necesaria la suplementación con alimentos comerciales que aumenta los costos de producción. La *Eichhornia crassipes* es una planta de aguas léticas y crecimiento acelerado, que podría ser empleada en la alimentación de bovinos lecheros. Es por eso que se pretende evaluar el efecto de la inclusión de harina *Eichhornia crassipes* sobre la producción y calidad composicional de la leche de vacas. Para lo anterior, se diseñó un cuadrado latino 3x3 con 12 animales y 3 semanas por periodo, una semana de acostumbramiento y dos de experimentación. Serán asignados tres tratamientos T1, T2 y T3. Los datos de producción, se registrarán diariamente; el porcentaje de grasa, proteína, lactosa, sólidos no grasos de la leche y el nitrógeno ureico sanguíneo (NUS) se determinarán tres veces por semana. Los resultados se tabularán en una base de datos y serán analizados por una prueba de latin square Anova, las diferencias entre tratamientos con la prueba de Tukey ($p < 0.05$) usando Real Statistics. Se espera que la inclusión de *Eichhornia crassipes* mejore los parámetros de producción y calidad de la leche.

Palabras clave: Calidad de la leche, grasa de la leche, alimentación suplementaria.

Effect of supplementation of *Eichhornia crassipes* flour in the production of dairy cows

Abstract

The feeding of dairy cows is mainly based on the use of fodder, however, it is necessary to supplement with commercial feed that increases production costs. The *Eichhornia crassipes* is a plant of lentic waters and accelerated growth, which could be used in the feeding of dairy cattle. That is why we intend to evaluate the effect of the inclusion of *Eichhornia crassipes* flour on the production and compositional quality of cow's milk. For the above, a 3x3 Latin square was designed with 12 animals and 3 weeks per period, one week of habituation and two weeks of experimentation. Three treatments T1, T2 and T3 will be assigned. The production data will be recorded daily; the percentage of fat, protein, lactose, non-fat milk solids and blood urea nitrogen (BUN) will be determined three times a week. The results will be tabulated in a database and analyzed by a Latin square Anova test, the differences between treatments with the Tukey test ($p < 0.05$) using Real Statistics. It is expected that the inclusion of *Eichhornia crassipes* will improve milk production and quality parameters.

Keywords: Milk quality, supplements, milk fat, supplementary feeding.



Resúmenes para el área de
FISIOLOGÍA Y BIENESTAR ANIMAL

Constantes fisiológicas, lactato sérico y creatinkinasa antes y después de una prueba Cross-Country en caballos

Francy Ximena Bustamante Fajardo¹, Ángela Cristina Ariza Suárez², Jason Nicolay

Martínez Suárez³

¹Estudiante X semestre M.V. Grupo IRABI, Fundación Universitaria Juan de Castellanos,
ximena.fajardo.20@hotmail.com. ²MV, Ph.D. Grupo IRABI, Docente Fundación Universitaria Juan de Castellanos, aariza@jdc.edu.co. ³MV, Grupo IRABI, Docente Fundación Universitaria Juan de Castellanos, jsuarez@jdc.edu.co

Resumen

Los deportes ecuestres ponen a prueba los músculos, agilidad y resistencia de los equinos, sin embargo, para llegar a ser un animal competitivo se requiere de esfuerzo, locomoción, movimientos sincronizados. En atletas humanos es bien conocido el síndrome de sobre ejercitación que se manifiesta con dolencias físicas y retiro de la actividad. En equinos, el estudio de la fisiología del ejercicio permite entender los mecanismos necesarios para lograr un adecuado aporte energético, excelente circulación y ante todo una buena eliminación de metabolitos para evitar daños físicos causados por la fatiga crónica. El objetivo de este estudio fue comparar las variaciones de las constantes fisiológicas (frecuencias cardiaca FC y respiratoria FR), lactato sérico LS y creatinkinasa CK en reposo y al terminar el entrenamiento en una prueba de Cross country en 5 caballos (4 machos y una hembra) raza Argentina del batallón Silva Plazas. La FC, FR, CK y LS fueron medidos en reposo (T0), inmediatamente finalizada la prueba (T1), a los 10 minutos (T2) y a los 60 minutos (T3) postfinalización. La FC y FR fueron evaluadas por auscultación del tórax; las muestras sanguíneas fueron colectadas de la vena yugular y procesadas dentro de las ocho horas siguientes de ser colectadas, para medición de LS y CK mediante espectrofotometria. Los resultados fueron analizados por estadística descriptiva, prueba de T-student para muestras pareadas y el coeficiente de correlación de Pearson. Los valores de FC y FR, mostraron una pronta recuperación después de T2 llegando casi a sus niveles durante

T0. El LS y CK tuvieron una tendencia al aumento después de T3, coincidiendo con estudios previos, sin embargo, dicho aumento se mantuvo dentro de un rango indicador de un adecuado metabolismo aerobio y funcionamiento muscular, reflejando un buen acondicionamiento físico al ejercicio en los equinos evaluados.

Palabras clave: Lactato, creatinkinasa, desempeño atlético, daño muscular, caballos

Physiological constants, serum lactate and creatinin kinase before and after of a Cross Country test in horses

Abstract

Equestrian sports test the muscles, agility and endurance of equines; however, to become a competitive animal requires effort, locomotion, synchronized movements. In human athletes, the over-exercise syndrome manifested with physical ailments and withdrawal of activity is well known. In equines, the study of the physiology of exercise allows us to understand the mechanisms necessary to achieve an adequate energy intake, excellent circulation and above all a good elimination of metabolites to avoid physical damage caused by chronic fatigue. The aim of this study was to compare the variations of the physiological constants (heart rate HR and respiratory RR), serum lactate SL and creatine kinase at rest and at the end of training in a cross country test in 5 horses (4 males and one female)) Argentine race of Silva Plazas battalion. The HR, RR, CK and SL were measured at rest (T0), immediately after the test (T1), at 10 minutes (T2) and at 60 minutes (T3) post-finalization. HR and RR were evaluated by chest auscultation; the blood samples were collected from the jugular vein and processed within eight hours of being collected, for SL and CK measurement by spectrophotometry. The results were analyzed by descriptive statistics, T-student test for paired samples and the Pearson correlation coefficient. The values of HR and RR, showed a quick recovery after T2 reaching almost their levels during T0. The SL and CK had a tendency to increase after T3, coinciding with previous studies, however, this increase remained within a range indicating an adequate aerobic metabolism and muscular functioning, reflecting a good physical conditioning to exercise in the horses evaluated.

Keywords: Lactate, creatinin kinase, athletic performance, muscle damage, horses.

Efecto de la altitud en la producción hepática de energía en pollos de engorde

Liseth Carolina Pachón León¹; María Elena Belalcazar Zafra² y Carolina Bespalhok Jacometo³

¹Estudiante Programa de Zootecnia, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad de La Salle, Bogotá, DC – lpachon06@unisalle.edu.co. ²Docente Programa de Medicina Veterinaria, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad de La Salle, Bogotá, DC – mebelalcazar@unisalle.edu.co. ³Docente Programa de Zootecnia, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad de La Salle, Bogotá, DC – cbespalhok@unisalle.edu.co

Resumen

El objetivo del proyecto es evaluar el efecto del piso térmico sobre la expresión hepática de genes relacionados a la producción endógena de energía en pollos de engorde. Se seleccionaron 2 unidades productivas no climatizadas, una ubicada en clima cálido (temperatura superior a 24°C, altitud 0 – 1000 msnm) y otra en clima frio (temperatura hasta 17°C, altitud 2000 – 3000 msnm), que poseen el mismo manejo nutricional. Los animales fueron sacrificados a los 37 ± 3 días de edad en una planta de beneficio comercial. Se colectó el hígado de los machos recién sacrificados, los cuales fueron pesados en su totalidad, una fracción fue almacenada en formaldehído 10% y otra fracción almacenada en criotubos previamente identificados, congelados inmediatamente en nitrógeno líquido, para garantizar la integridad del ARNm, posteriormente transportados al laboratorio de Biología Molecular (Genmejor) de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de la Salle en Bogotá, en donde se almacenaron en ultracongelador (-80°C) hasta su procesamiento. La extracción y purificación del ARNm se realizó con el kit InviTrap Spin universal RNA siguiendo los procedimientos indicados por el fabricante. El material extraído se cuantificó a través de espectrofotometría (NanoDrop 2000) y la integridad del material se verificó a través de electroforesis en gel de agarosa. Posteriormente se realizará la construcción del cDNA y la PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR) a través de kits de New Englands BioLabs, en termocicladores BioRad. Los genes seleccionados para evaluación

están relacionados con el proceso de gluconeogénesis (PC, PCK1, G6PC y FBP1) y oxidación de ácidos grasos (PPARA, ACOX1 y CPT1A). Los pollos de la granja ubicada en el clima cálido presentaron un peso promedio de los hígados de 63,6 g, mientras los de clima frío presentaron peso promedio de 52,7g. En las extracciones de RNA realizadas se obtuvo una concentración promedio de 860 ng/μl, lo que indica las muestras son viables para los análisis propuestos. Se espera que en el clima cálido los pollos presenten mayor eficiencia en la gluconeogénesis y oxidación de ácidos grasos. Como producto se pretende proponer un manejo nutricional que potencialice el metabolismo animal según la altitud.

Palabras clave: Clima, expresión génica, gluconeogénesis, fisiología, hígado.



Effect of the altitude on the hepatic energy production in broiler chickens

Abstract

The objective of the project is to evaluate the effect of thermal floor on hepatic expression of genes related to endogenous energy production in broiler chickens. Two unheated productive units were selected, one located in warm weather (temperature higher than 24°C, altitude 0 - 1000 meters above sea level) and another one in cold weather (temperature up to 17°C, altitude 2000 - 3000 meters above sea level), which have the same nutritional management. The animals were sacrificed at 37 ± 3 days of age in a commercial benefit plant. The liver of the newly slaughtered males was collected, which were weighed in their entirety, one fraction was stored in 10% formaldehyde and another fraction stored in previously identified cryotubes, frozen immediately in liquid nitrogen, to guarantee the integrity of the mRNA, subsequently transported to the laboratory of Molecular Biology (Genmejor) of the Faculty of Agricultural Sciences of the Universidad de la Salle in Bogotá, where they were stored in ultra-freezer (-80°C) until processing. The extraction and purification of the mRNA was performed with the InviTrap Spin universal RNA kit following the procedures indicated by the manufacturer. The extracted material was quantified through spectrophotometry (NanoDrop 2000) and the integrity of the material was verified through agarose gel electrophoresis. Later, the construction of the cDNA and the quantitative real-time PCR (qPCR) will be carried out through New Englands BioLabs kits, in BioRad thermocyclers. The genes selected for evaluation are related to the gluconeogenesis process (PC, PCK1, G6PC and FBP1) and oxidation of fatty acids (PPARA, ACOX1 and CPT1A). The chickens of the farm located in the warm climate presented an average weight of the livers of 63.6 g, while those of cold climate presented an average weight of 52.7 g. In the extractions of RNA, an average concentration of 860 ng / µl was obtained, which indicates that the samples are viable for the proposed analyzes. It is expected that in the warm climate the chickens present greater efficiency in gluconeogenesis and

oxidation of fatty acids. As a product, it is proposed to propose a nutritional management that potentiates animal metabolism according to altitude.

Keywords: Climate, gene expression, gluconeogenesis, physiology, liver.

Parámetros bioquímicos en ovinos (*Ovis aries*) de pelo en el departamento de Córdoba*

Rubén Chávez¹ cMVZ, Elisa Brunal² MVZ cMSc, Clara Rugeles³ MVZ, MSc, Teresa Oviedo³ MVZ, MSc, PhD, Laura Jiménez¹ cMVZ, Yonairo Herrera² MVZ, MSc, Misael Oviedo³ MVZ, MSc, PhD

*Grupo de Investigación en producción animal tropical GIPAT. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad de Córdoba. Colombia. ¹Semillero de Investigación Taurus. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad de Córdoba.

rubenchavez@gmail.com, lauhernandez065@gmail.com.

²Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad de Córdoba. elisabrunal@gmail.com,

yonairoherrera@gmail.com. ³Maestría en Ciencias Veterinarias del Trópico. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad de Córdoba, Córdoba.

crugeles@correo.unicordoba.edu.co,

toviedo@correo.unicordoba.edu.co

Resumen

La población de ovinos está en gran parte en manos de pequeños productores, cumpliendo una importante función económica en las comunidades agrícolas y otras zonas de concentración de pobreza. Con el fortalecimiento de la cadena de ovinos-caprina, se espera incremento en la producción de carne, además del estímulo positivo en el hábito de consumo, el cual se debe acompañar del apoyo técnico y monitoreo de la salud y del balance nutricional de los animales, por lo cual con este estudio se pretende determinar los valores promedio de los metabolitos sanguíneos asociados al perfil proteico en ovinos de pelo. Se evaluará el perfil proteico sanguíneo en ovinos en el departamento de Córdoba, en un total de 100 animales de 10 rebaños en 5 municipios, manejados en sistema semiextensivo. Se tomarán muestras de sangre de la vena yugular por el sistema vacutainer, la cual será centrifugada a 3500 rpm por 15min para la separación del suero. Los sueros se conservarán a -20°C (Nuaire, ILS-DF8513G, Korea) hasta el análisis de los metabolitos sanguíneos: proteínas totales, albúmina, urea y BUN por medio de fotocolorimetría (Metrolab-1600, WINNER) con la ayuda de kits comerciales específicos para cada variable (BIOSYSTEM). Los resultados

obtenidos serán analizados mediante estadística descriptiva para cada una de las variables utilizando el software Infostat. Los resultados obtenidos a partir de 60 animales provenientes de 6 rebaños de los municipios de Momil (2 rebaños), Purísima (2 rebaños) y Chimá (2 rebaños) son 65,7mg/dL de proteinas totales, (PT), 32,7mg/dL de albúminas que se encuentran de los rangos normales para la especie de acuerdo con lo referido por Avellanet et al. (2007) en ovinos de raza Xisqueta y por Bustamante et al. (2016) en ovino criollo de pelo. Sin embargo, los valores determinados de 48,79mg/dL y 22,93mg/dL de urea y BUN, respectivamente, son diferentes a los hallados por Avellanet et al. (2007) y Bustamante et al. (2016), siendo esta diferencia resultado posiblemente, de la inclusión de animales adultos y jóvenes. Los valores de referencia hallados, pueden ser utilizados por los profesionales para describir el comportamiento de variables en animales sanos.

Palabras clave: Proteínas totales, carneros, albúmina, urea, BUN.

Biochemical parameters in hair sheep (*Ovis aries*) in Córdoba department**Abstract**

The population of sheep is largely in the hands of small producers, fulfilling an important economic role in agricultural communities and other areas of concentration of poverty. With the strengthening of the sheep-goat chain, an increase in meat production is expected, in addition to the positive stimulus in the habit of consumption, which must be accompanied by technical support and monitoring of the health and nutritional balance of the animals., which is why this study aims to determine the average values of blood metabolites associated with the protein profile in hair sheep. The blood protein profile in sheep in the department of Córdoba will be evaluated, in a total of 100 animals of 10 herds in 5 municipalities, managed in a semi-extensive system. Blood samples will be taken from the jugular vein by the vacutainer system, which will be centrifuged at 3500 rpm for 15 min for serum separation. The sera will be stored at -20°C (Nuairé, ILS-DF8513G, Korea) until the analysis of the blood metabolites: total proteins, albumin, urea and BUN by means of photocolorimetry (Metrolab-1600, WINNER) with the help of specific commercial kits for each variable (BIOSYSTEM). The results obtained will be analyzed by descriptive statistics for each of the variables using the Infostat software. The results obtained from 60 animals from 6 herds of the municipalities of Momil (2 flocks), Purísima (2 flocks) and Chimá (2 flocks) are 65,7mg / dL of total protein, (PT), 32,7mg / dL of albumins that are of the normal ranges for the species according to that referred by Avellanet et al. (2007) in sheep of the Xisqueta breed and by Bustamante et al. (2016) in Creole hair sheep. However, the determined values of 48.79mg / dL and 22.93mg / dL of urea and BUN, respectively, are different from those found by Avellanet et al. (2007) and Bustamante et al. (2016), this difference possibly being the result of the inclusion of adult and young animals. The reference values found can be used by professionals to describe the behavior of variables in healthy animals.

Keywords: Total proteins, rams, albumin, urea, BUN.

Perfil proteico sanguíneo en gallinas de Guinea (*Numida meleagris*)

Ricardo José Páez Osorio¹ eMVZ; Mercedes Margarita Narváez Sánchez¹ eMVZ; Clara Rugeles Pinto²MVZ, MSc

¹Semillero de Investigación Taurus, Grupo de Investigación en producción animal tropical-GIPAT. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad de Córdoba.
ricardojpaezo1967@hotmail.com,

mercedesnarvaezsanchez@hotmail.com. ²Laboratorio de Andrología. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad de Córdoba, Córdoba, Colombia. Asesora del Semillero de investigación TAURUS, Investigador Asociado adscrito al Grupo de investigación en producción Animal Tropical –GIPAT- crugeles@correo.unicordoba.edu.co.

Resumen

Con el propósito de evaluar el estado de salud en gallinas de Guinea (*Numida meleagris*) se determinarán los niveles promedio de proteínas totales, albúminas, urea y nitrógeno ureico sanguíneo (NUS). Se tomaron muestras de sangre por sistema de vacío (BD Vacutainer®), de la vena braquial de 30 gallinas de Guinea hembras manejadas al aire libre con un sistema de alimentación no balanceado en los municipios de Montería y Sincelejo. Las muestras de sangre fueron centrifugadas a 3500rpm (Z306 Hermle) durante 15min y el suero fue conservado a -20°C hasta la determinación de los analitos. Se determinaron las proteínas totales (método de Biuret), albúminas (método Verde de bromocresol), además de la urea (método Urea color) y el NUS (calculado a partir de la urea) por fotocolorimetría (Metrolab 1600 de Winner) con ayuda de kits comerciales de la marca Biosystem. La información obtenida fue consignada en tablas de Microsoft Excel® (2013) y analizada utilizando estadística descriptiva para cada una de las variables con ayuda del programa estadístico InfoStat® 2016. Los valores promedio de los analitos sanguíneos provenientes de muestras de sangre de 20 gallinas de Guinea (*Numida meleagris*) fueron $36,2 \pm 9,0$ mg/dL de proteínas totales, $17,6 \pm 6,7$ mg/dL de Albúminas y $18,6 \pm 6,8$ mg/dL de globulinas. Los resultados parciales permiten considerar que los valores promedio de proteínas totales se encuentran dentro del rango

referido por Kaneko en 1997 (de 25 a 45 mg/dL para aves y en gallinas domésticas y de Guinea (de 6 a 49 mg/dL) por Ataja, en 1996, siendo superiores a lo referido para gallinas ponedoras en Brasil por De Sousa en 2011 (12 a 29 mg/dL). Sin embargo, Díaz López en 2014, refiere un comportamiento similar de los valores promedio de albúminas (18,02 mg/dL) y globulinas (19,05 mg/dL) en pollos de engorde bajo estrés calórico con mayor promedio de globulina. Con base en los resultados parciales se podría sugerir un inadecuado aporte de nutrientes a partir de la dieta, como consecuencia del manejo en pastoreo sin suplementación.

Palabras clave: Proteínas totales, albumina, analitos sanguíneos, aves silvestres.

**Blood protein profile in hens of Guinea
(*Numida meleagris*)****Abstract**

In order to assess the health status of guinea fowl (*Numida meleagris*), average levels of total protein, albumin, urea and blood urea nitrogen (NUS) will be determined. Blood samples were taken by vacuum system (BD Vacutainer®) from the brachial vein of 30 female guinea hens managed outdoors with an unbalanced feeding system in the municipalities of Montería and Sincelejo. The blood samples were centrifuged at 3500rpm (Z306 Hermle) for 15min and the serum was stored at -20°C until the analytes were determined. The total proteins (Biuret method), albumins (bromocresol green method), in addition to urea (Urea color method) and NUS (calculated from urea) were determined by photocalorimetry (Metrolab 1600 from Winner) with the help of commercial kits of the brand Biosystem. The information obtained was recorded in tables of Microsoft Excel® (2013) and analyzed using descriptive statistics for each of the variables with the help of the statistical program InfoStat® 2016. The average values of the blood analytes from blood samples from 20 hens of Guinea (*Numida meleagris*) were 36.2 ± 9.0 mg / dL of total proteins, 17.6 ± 6.7 mg / dL of Albumins and 18.6 ± 6.8 mg / dL of globulins. The partial results allow to consider that the average values of total proteins are within the range referred by Kaneko in 1997 (from 25 to 45 mg / dL for birds and in domestic and Guinea hens (from 6 to 49 mg / dL) by Ataja , in 1996, being superior to that referred to laying hens in Brazil by De Sousa in 2011 (12 to 29 mg / dL) However, Díaz López in 2014, refers to a similar pattern of average values of albumins (18.02 mg / dL) and globulins (19.05 mg / dL) in broiler chickens under heat stress with higher globulin average, based on the partial results, an inadequate contribution of nutrients could be suggested from the diet, as a consequence of the grazing management without supplementation.

Keywords: Total proteins, albumin, blood analytes, wild birds.

Efecto de la temperatura y humedad relativa sobre el consumo y huevo en gallinas ponedoras

Claudia Liliana Santos León¹, MVZ, Esp; Ana Leonor Silvera Sarmiento², MVZ; Yazmin Andrea Calvo Rodríguez³, MVZ, Esp; Ricci Terraza Martínez⁴, Bact; Darwin Antonio García Rojas⁵, MVZ, Esp; Jorge Humberto Contreras Castro⁶, Biól. Mar., Mg; Jorge Eliecer Franco Rodríguez⁷, MVZ, Esp.

¹Docente Escuela de M.V.Z, Instituto Universitario de la Paz, Barrancabermeja-Santander.
liliana.santos@unipaz.edu.co

²Egresado Escuela de M.V.Z, Instituto Universitario de la Paz, Barrancabermeja-Santander. anysilver@gmail.com. ³Docente Escuela de M.V.Z, Instituto Universitario de la Paz, Barrancabermeja-Santander. yazmin.calvo@unipaz.edu.co. ⁴Docente Escuela de M.V.Z. Instituto Universitario de la Paz, Barrancabermeja-Santander. ricci.terraza@unipaz.edu.co.

⁵Docente Escuela de M.V.Z. Instituto Universitario de la Paz, Barrancabermeja-Santander.
darwin.garcia@unipaz.edu.co. ⁶Docente Escuela de M.V.Z. Instituto Universitario de la Paz, Barrancabermeja-Santander. jorge.contreras@unipaz.edu.co. ⁷Docente Escuela de M.V.Z, Instituto Universitario de la Paz, Barrancabermeja-Santander. dir.mvz@unipaz.edu.co

Resumen

La avicultura en Colombia es una actividad en continuo crecimiento del sector agropecuario, tecnificando los procesos en función del confort animal en sus sistemas de producción, ya sea en piso o en pastoreo. El presente estudio propone evaluar el bienestar animal en gallinas ponedoras, a partir del índice de temperatura y humedad relativa en relación a la libertad de incomodidad, expresado en el consumo y grosor de la cascara de huevo en sistemas de piso y pastoreo. Se utilizarán 240 gallinas de línea criolla del género *Gallus domesticus* x subespecie *morus*, *Gallus domesticus* x subespecie *ecaudatus*, divididas en 120 animales en dos sistemas de producción (piso y pastoreo), que se distribuirán en tres réplicas de 40 gallinas en cada uno en un periodo de tiempo de 60 días. Las réplicas para el sistema de producción en piso se distribuirán dentro del galpón en tres corrales de 6,6 m² con una densidad de 6 gallinas/m²; las gallinas se alimentarán a base de concentrado a ración de acuerdo a la tabla de alimento según peso, y agua a voluntad. Las réplicas para el sistema de producción en pastoreo

se distribuirán dentro y fuera del galpón en corrales de 13,33m² con una densidad de 3 gallinas/m²; las gallinas se mantendrán en pastoreo durante 4 horas diarias, alimentándose predominantemente con grama natural, leguminosas, arvenses y forrajes. Diariamente, por réplica de cada sistema de producción, se determinará el consumo, como también el grosor de la cáscara de huevo con el micrómetro, lo que equivaldrá a 60 huevos por réplica y 180 huevos por sistema de producción; asimismo, se establecerán los valores de temperatura y humedad relativa a una hora en la mañana y en la tarde. La información de consumo y grosor se procesará mediante ANAVA y la relación de consumo o grosor vs temperatura y humedad a través de regresión múltiple. Se espera que en el sistema de producción en pastoreo, la temperatura y humedad relativa influyan positivamente en el consumo y el grosor respecto al sistema de producción en piso.

Palabras clave: Bienestar animal, *Gallus domesticus*, libertades, consumo, grosor de la cascara de huevo, sistemas de producción.

**Effect of temperature and relative humidity
on consumption and egg in laying hens****Abstract**

The aviculture in Colombia is an activity in continuous growth of the agricultural sector, technifying the processes in function of the animal comfort in its production systems, either in floor or in pasture. The present study proposes to evaluate animal welfare in laying hens, based on the index of temperature and relative humidity in relation to the freedom of incompetence, expressed in the consumption and thickness of the eggshell in floor and grazing systems. 240 Creole line chickens of the genus *Gallus domesticus* x subspecies *morus*, *Gallus domesticus* x subspecies *ecaudatus*, divided into 120 animals in two production systems (floor and grazing) will be used, which will be distributed in three replicas of 40 chickens in each one in a 60-day time period. The replicas for the floor production system will be distributed inside the house in three pens of 6.6 m² with a density of 6 hens / m²; the hens will be fed based on concentrate according to the food table according to weight, and water at will. Replicas for the grazing production system will be distributed inside and outside the shed in pens of 13.33m² with a density of 3 hens / m²; the chickens will remain in pasture for 4 hours a day, predominantly feeding on natural grass, legumes, weeds and fodder. Daily, by replica of each production system, the consumption will be determined, as well as the thickness of the egg shell with the micrometer, which will be equivalent to 60 eggs per replica and 180 eggs per production system; Likewise, the values of temperature and relative humidity will be established at one hour in the morning and in the afternoon. The information of consumption and thickness will be processed through ANAVA and the ratio of consumption or thickness vs. temperature and humidity through multiple regressions. It is expected that in the grazing production system, the temperature and relative humidity positively influence the consumption and the thickness with respect to the floor production system.

Keywords: Animal welfare, *Gallus domesticus*, freedoms, consumption, thickness of the egg shell, production systems.

Evaluación de factores de riesgo asociado al bienestar animal en un modelo semi intensivo de producción ovina en la FUJDC municipio de Soracá Boyacá

Liseth Camelo¹, Erika Eliana Toloza Gordillo²,
Daniel Fernando González Mendoza³

¹Estudiante V Semestre Medicina Veterinaria Fundación Universitaria Juan De Castellanos Grupo investigación INPANTA E-mail: Lkcamelo@jdc.edu.co. ²Matemática. MsC. Matemáticas Aplicadas Asesora estadística Docente UPTC, Grupo investigación INPANTA Fundación Universitaria Juan de Castellanos. E – mail: erika.toloza@uptc.edu.co. ³M.V.Z., Esp. En Producción Animal. Docente tiempo completo Grupo investigación INPANTA Fundación Universitaria Juan de Castellanos. E – mail: dgonzales@jdc.edu.co.

Resumen

La producción animal semi intensiva está sujeta a estrictos requisitos como alojamiento y cuidados de los animales, requisitos de capacitación y formación del personal, evaluación de los proyectos: órganos encargados del bienestar, comités de ética. De acuerdo a esto se ha adoptado las tres R y protocolos para su evaluación como el sistema de clasificación del protocolo Welfare Quality® para evaluar bienestar animal en granjas. Dado que la evaluación del bienestar debe tender cada vez más a ser una medición cuantitativa, por esta razón los investigadores han tratado de plantear protocolos de evaluación numérica, que se basa en la determinación y valoración de cierto número de parámetros fundamentados bajo 4 criterios de las libertades de bienestar animal; por esto se adaptó a ovinos y se aplicó en el aprisco de la FUJDC. Evaluación de parámetros que se integran en 12 criterios de bienestar reunidos en cuatro principios básicos (buena alimentación, buen alojamiento, buena salud y comportamiento adecuado). La calificación o resultado de las mediciones obtenidas en el rebaño se transforman en puntuaciones basadas en una escala (0 = no apto, no hay ningún bienestar en los animales, y 100 = bienestar excelente al mejor bienestar animal). Se recopilan todas las puntuaciones dentro de un mismo principio, la granja puede clasificarse en una de estas cuatro categorías: bienestar excelente, bienestar bueno, bienestar aceptable y no apto. El sistema de producción presenta las

principales vulnerabilidades al bienestar de los animales a nivel de alojamiento en parámetros como: cama, limpieza y sombra en potrero. Se deben crear protocolos de manejo (alimentación, sanidad, ordeño, entre otros) para de esta forma disminuir los procedimientos empíricos y apegarse más a las medidas, también se deben establecer cronogramas o bitácoras de labores para los operarios, de esta forma propender a que se realicen las tareas en una secuencia lógica y se cumplan con los parámetros de limpieza, sanidad, nutrición, bienestar y ética. Una vez terminada la evaluación se ejecutarán medidas para mejorar el bienestar animal de los ovinos de la FUJDC y sus condiciones de confort sean las óptimas para beneficio de los animales y productores.

Palabras clave: Bienestar animal, comportamiento, Welfare Quality®, confort, sistema productivo, ovinos.

Evaluation of the risk factors associated with animal welfare in a semi-intensive model of sheep production in FUJDC municipality of Soracá Boyacá**Abstract**

The semi-intensive animal production is subject to strict requirements such as housing and care of animals, training requirements and training of personnel, evaluation of projects: bodies responsible for welfare, ethics committees. Accordingly, the three Rs and protocols for its evaluation have been adopted as the classification system of the Welfare Quality® protocol to evaluate animal welfare in farms. Given that the evaluation of well-being should tend increasingly to be a quantitative measurement, for this reason researchers have tried to establish numerical evaluation protocols, which is based on the determination and evaluation of a certain number of parameters based on four criteria of the liberties of animal welfare; for this reason it was adapted to sheep and was applied in the sheepfold of the FUJDC. Evaluation of parameters that are integrated into 12 welfare criteria, grouped into four basic principles (good nutrition, good accommodation, good health and adequate behavior). The qualification or result of the measurements obtained in the flock are transformed into scores based on a scale (0 = not suitable, there is no welfare in the animals, and 100 = excellent welfare to the best animal welfare). All the scores are compiled within the same principle, the farm can be classified into one of four categories: excellent well-being, good well-being, acceptable and unfitness. The production system presents the main vulnerabilities to the welfare of animals at the accommodation level in parameters such as: bedding, cleaning and shade in pasture. Management protocols must be created (feeding, sanitation, milking, among others) in order to diminish the empirical procedures and to be more attached to the measures, you must also establish schedules or work logs for the workers, in this way you tend to the tasks are carried out in a logical sequence and the parameters of cleanliness, health, nutrition, well-being and ethics are met. Once the evaluation is completed, measures will be implemented to improve the

animal welfare of the sheep of the FUJDC and their comfort conditions are optimal for the benefit of the animals and producers.

Keywords: Animal welfare, behavior, Welfare Quality®, comfort, productive system, sheep.

Efecto del Polen Apícola sobre Dinámica Gastrointestinal y Morfometría de Pollos de Engorde*

Lina Marcela Ríos Peña¹, Ana Milena Sierra Suárez¹, Daniel Rodríguez-Aguilar²

¹Zootecnistas. ²Zootecnista, MSc. Producción Animal, Universidad Nacional de Colombia-sede Bogotá.

*Trabajo para optar por título de Zootecnista en la Universidad Industrial de Santander-sede Málaga.

Resumen

La prohibición de algunos antibióticos promotores de crecimiento es una realidad que impacta los sistemas de producción avícola del país, dado el potencial de residualidad que puede presentarse en el producto final que llega al consumidor. El polen de abeja puede potencializar la respuesta inmune y antioxidante, siendo alternativa frente a los antibióticos promotores de crecimiento, impactando positivamente la salud y el desarrollo intestinal de las aves. Este ensayo evaluó el efecto de la inclusión del polen de abeja como aditivo funcional sobre morfometria y la dinámica del tracto gastrointestinal (TGI) de pollos de engorde. Se utilizaron 200 pollitos mixtos (Ross 308) de un día de edad, asignados aleatoriamente a cuatro tratamientos (5 réplicas y 10 animales por replica) con tres niveles de inclusión de polen (T0: testigo, T1: 0.5% polen abeja, T2: 1.0% polen abeja, T3: 1.5% polen abeja). Se utilizó un diseño completamente al azar, con una prueba de Tukey ($p<0.05$). En la morfometría intestinal al día 42 se colectaron 2cm^2 de las diferentes secciones del ID para medir altura de la vellosidad, profundidad de cripta, ancho de la vellosidad y relación vellosidad/cripta. En la dinámica del TGI al día 28 y 42 se pesaron: corazón, hígado, páncreas, proventrículo, ventrículo, duodeno, yeyuno, íleon, ciego y colon relacionados con el peso vivo corporal. Adicional se midió la longitud de las secciones del intestino delgado (ID). El polen 1.5% mostro el mejor desarrollo de las vellosidades a nivel de duodeno y yeyuno, presentando una menor profundidad de cripta, una mayor área aparente de absorción, relación vellosidad cripta y altura de la vellosidad. A nivel del íleon, el control mostro una mayor altura de

vellosidad, mientras el polen 1.5% una menor profundidad cripta. El polen 0.5% y 1.0% una mayor área aparente comparado con los tratamientos control y polen 1.5%, presentando este último una mayor relación vellosidad/cripta ($p<0.05$). El polen 1.5% presento un menor peso a nivel del hígado, páncreas y peso del intestino delgado al día 42 de edad, mientras el control mostro mayores valores al día 28 para estas variables junto al peso del intestino grueso ($p<0.05$).

Palabras clave: Intestino, alometría, productividad, alimentación, aves de corral.

Effect Bee pollen inclusion as Functional Additive on Dynamic Gastrointestinal and Morphometry to Broilers

Abstract

The prohibition of some antibiotics growth promoters is a reality that impacts the poultry production systems of the country, given the potential for residuability that can occur in the final product that reaches the consumer. Bee pollen can potentiate the immune and antioxidant response, being an alternative to antibiotic growth promoters, positively impacting the health and intestinal development of birds. This trial evaluated the effect of the inclusion of bee pollen as a functional additive on morphometry and the gastrointestinal tract (GIT) dynamics of broiler chickens. Two 200-day-old mixed chicks (Ross 308) were randomly assigned to four treatments (5 replicates and 10 animals per replica) with three levels of pollen inclusion (T0: control, T1: 0.5% bee pollen, T2: 1.0% bee pollen, T3: 1.5% bee pollen). A completely randomized design was used, with a Tukey test ($p < 0.05$). In the intestinal morphometry at day 42, 2cm² of the different sections of the SI were collected to measure villus height, crypt depth, villus width and villus / crypt ratio. In the dynamics of GIT on day 28 and 42 were weighed: heart, liver, pancreas, proventriculus, ventricle, duodenum, jejunum, ileum, caecum and colon related to body weight. Further, the length of the sections of the small intestine (SI) was measured. Pollen 1.5% showed the best development of the villi at the duodenum and jejunum level, presenting a lower depth of crypt, a greater apparent area of absorption, villus crypt ratio and villus height. At the level of the ileum, the control showed a greater height of villus, while the pollen 1.5% had a lower depth crypt. Pollen 0.5% and 1.0% a greater apparent area compared to control and pollen treatments 1.5%, the latter presenting a higher hairiness / crypt ratio ($p < 0.05$). The pollen 1.5% presented a lower weight at the level of the liver, pancreas and weight of the small intestine at day 42 of age, while the control showed higher values at day 28 for these variables together with the weight of the large intestine ($p < 0.05$).

Keywords: Intestine, alometry, productivity, food, poultry.

Gasometría, electrolitos y anión gap en chigüiros (*Hydrochaeris hydrochaeris*) de vida silvestre

Edgar Edilberto Fuentes Reyes¹; Daniel Alexander Céspedes Sanabria²

¹MVZ, MSc, PhD; ²MVZ, Esp ,cMSc; Grupo de Investigación en Sistemas de Producción de Especies Silvestre (GISPES), Departamento de Producción Animal, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, Universidad de los Llanos, Villavicencio, Meta , Colombia, efuentes@unillanos.edu.co

Resumen

El chigüiro (*Hydrochaeris hydrochaeris*), es una de las especies más promisorias para la explotación zootécnica. Sin embargo, el conocimiento sobre gasometría, electrolitos y anión GAP es limitado. Se determinaron los valores de referencia de gasometría, electrolitos y anión gap en chigüiros (*Hydrochaeris hydrochaeris*) de vida silvestre. Esta investigación se realizó en época de verano, se muestrearon 30 chigüiros adultos: hembras (n: 16) y machos (n: 14) de la especie (*Hydrochaeris hydrochaeris*) de vida silvestre con peso promedio de 35 ± 5.0 Kg de peso vivo, ubicados en el Municipio de Paz de Ariporo, Casanare, a 270 m.s.n.m y temperatura ambiental de 28°C. Las muestras fueron obtenidas por venopunción; se utilizó el analizador de gases sanguíneos y electrolitos EPOC. Los datos fueron analizados estadísticamente mediante el análisis de varianza (ANOVA) con un nivel de significancia de ($p<0.05$), y se compararon los valores de las medias entre hembras y machos. Se evidenció que los chigüiros hembras y machos de vida silvestre presentan: Gasometría: pH de 7.00 ± 0.05 y 7.12 ± 0.05 ; pCO₂ (mmHg) 44.38 ± 2.80 y 41.04 ± 2.99 ; tCO₂ (mmol/L) 13.38 ± 1.13 y 16.83 ± 2.05 ; cSO₂ (%) 67.08 ± 4.13 y 66.48 ± 5.51 ; Bicarbonato (mmol/L) 11.97 ± 1.12 y 15.57 ± 2.00 ; cEB (mmol/L) -5.93 ± 1.15 y -2.43 ± 1.98 , respectivamente. Se observaron diferencias significativas en hembras y machos en tCO₂, Bicarbonato y cEB, respectivamente. Electrolitos: Sodio (mmol/L) 131 ± 1.30 y 133.00 ± 0.83 ; Potasio (mmol/L) 6.39 ± 0.60 y 5.62 ± 0.42 ; Cloro (mmol/L) 96.65 ± 1.35 y 95.11 ± 2.55 ; Calcio (mmol/L) 1.04 ± 0.06 y 1.03 ± 0.05 ; Fósforo (mmol/L) 9.56 ± 1.66 y 10.02 ± 1.70 ;

Magnesio (mmol/L) 1.47 ± 0.34 y 1.75 ± 0.58 , respectivamente. Se observaron diferencias significativas en hembras y machos en sodio, cloro y magnesio ($p<0.05$), respectivamente. Anión GAP Corregido (mmol/L) 30.91 ± 8.19 y 29.54 ± 10.44 , respectivamente. Los resultados obtenidos pueden ser utilizados como referentes en sistemas de salud y producción animal de esta especie.

Palabras clave: Chigüiro, equilibrio acido-base, iones fuertes, brecha aniónica.

Blood gases, electrolytes and anion gap in capybaras (*Hydrochaeris hydrochaeris*) wildlife**Abstract**

The capybaras (*Hydrochaeris hydrochaeris*), is one of the most promising species for zootechnical exploitation. However, knowledge about gasometry, electrolytes and GAP anion is limited. The reference values of gasometry, electrolytes and anion gap in capybaras (*Hydrochaeris hydrochaeris*) of wildlife were determined. This research was carried out in the summer season, 30 adult capybaras were sampled: females (n: 16) and males (n: 14) of the species (*Hydrochaeris hydrochaeris*) of wildlife with average weight of 35 ± 5.0 Kg of live weight, located in the Municipality of Paz de Ariporo, Casanare, at 270 masl and ambient temperature of 28°C. The samples were obtained by venipuncture; The blood gas and electrolyte analyzer EPOC was used. The data were analyzed statistically by the analysis of variance (ANOVA) with a level of significance of ($p < 0.05$), and the values of the means between females and males were compared. It was evidenced that female capybaras and males of wild life present: Gasometry: pH of 7.00 ± 0.05 and 7.12 ± 0.05 ; pCO₂ (mmHg) 44.38 ± 2.80 and 41.04 ± 2.99 ; tCO₂ (mmol / L) 13.38 ± 1.13 and 16.83 ± 2.05 ; cSO₂ (%) 67.08 ± 4.13 and 66.48 ± 5.51 ; Bicarbonate (mmol / L) 11.97 ± 1.12 and 15.57 ± 2.00 ; cEB (mmol / L) -5.93 ± 1.15 and -2.43 ± 1.98 , respectively. Significant differences were observed in females and males in tCO₂, Bicarbonate and cEB, respectively. Electrolytes: Sodium (mmol / L) 131 ± 1.30 and 133.00 ± 0.83 ; Potassium (mmol / L) 6.39 ± 0.60 and 5.62 ± 0.42 ; Chlorine (mmol / L) 96.65 ± 1.35 and 95.11 ± 2.55 ; Calcium (mmol / L) 1.04 ± 0.06 and 1.03 ± 0.05 ; Phosphorus (mmol / L) 9.56 ± 1.66 and 10.02 ± 1.70 ; Magnesium (mmol / L) 1.47 ± 0.34 and 1.75 ± 0.58 , respectively. Significant differences were observed in females and males in sodium, chlorine and magnesium ($p < 0.05$), respectively. GAP Anion Corrected (mmol / L) 30.91 ± 8.19 and 29.54 ± 10.44 , respectively. The results obtained can be used as references in health systems and animal production of this species.

Keywords: Capybara, acid-base balance, strong ion gap anionic.



Estimación del peso de cerdos de acuerdo a género y genotipo por análisis de imagen

María Alejandra Atara Ruiz¹, Eliana María Ruiz Bayona².

Estudiante Ingeniería Mecatrónica. Universidad Militar Nueva Granada. Mail: u1802287@unimilitar.edu.co.
Semillero de investigación Granja Villa Alejandra.²MVZ, Esp. Grupo de investigación Granja Villa Alejandra. Mail: elmaru.mvz@gmail.com Líder semillero de investigación Granja Villa Alejandra.

Resumen

El manejo continuo de cerdos durante el proceso de pesaje, en las etapas de levante y engorde, produce estrés y dolor en algunas ocasiones, y es de vital importancia para el monitoreo del desarrollo de los animales; además puede ser un proceso riesgoso si no es bien desarrollado por el operario de la granja. El objetivo de este estudio es disminuir el estrés y mejorar el bienestar animal de los cerdos, al determinar el peso de los animales por género, genotipo y edad, para lo cual a 60 cerdos (30 machos y 30 hembras), iniciando desde la etapa de levante (24 ± 2 kg hasta 50 ± 2 kg de peso vivo) hasta la finalización (52 ± 2 kg hasta 105 ± 2 kg de peso vivo), que se identificarán y ubicarán en corrales por 10 animales cada uno, alimentados con concetrado comercial de acuerdo a sus necesidades por etapa; se realizará un análisis de imagen a partir de un monitoreo de cada corral usando una cámara con vista aérea, capturando una serie de imágenes que posteriormente se procesaran sin conexión en el entorno MATLAB 2017B y así extraer el contorno del área del cuerpo, en el que como primera medida, los cerdos, serán localizados y segmentados en la imagen usando un algoritmo de ajuste de elipse, uno para el cuerpo y otro para la cabeza; posteriormente se pesará cada lote de animales para poder confrontar los resultados de cada metodología cada 20 días, durante el desarrollo de los animales en las dos etapas propuestas. En este ensayo se espera poder determinar el porcentaje de precisión del análisis de imagen, a nivel de grupo (género y genotipo) y a nivel individual; al igual que disminuir mano de obra y estrés de los cerdos durante este proceso del pesaje, mejorando así el bienestar animal de los animales en la granja.

Palabras clave: Bienestar animal, cerdos, control de peso, manejo, estrés, tecnología.

Agradecimientos

Los autores expresan sus agradecimientos a la empresa porcícola Granja Villa Alejandra en Corrales-Boyacá por su apoyo económico para el desarrollo de esta propuesta de investigación.

Estimation of the weight of pigs according to gender and genotype by image analysis**Abstract**

The continuous handling of pigs during the weighing process, in the stages of lifting and fattening, produces stress and pain in some occasions, and is of vital importance for the monitoring of the development of the animals; It can also be a risky process if it is not well developed by the farm operator. The objective of this study is to reduce stress and improve the animal welfare of the pigs, by determining the weight of the animals by gender, genotype and age, for which 60 pigs (30 males and 30 females), starting from the stage of lift (24 ± 2 kg up to 50 ± 2 kg of live weight) until completion (52 ± 2 kg up to 105 ± 2 kg of live weight), which will be identified and placed in pens by 10 animals each, fed with concentrate commercial according to your needs per stage; an image analysis will be made from a monitoring of each pen using a camera with aerial view, capturing a series of images that will later be processed offline in the MATLAB 2017B environment and thus extract the contour of the body area, in which As a first measure, the pigs will be located and segmented in the image using an ellipse adjustment algorithm, one for the body and one for the head; Later each batch of animals will be weighed to be able to compare the results of each methodology every 20 days, during the development of the animals in the two proposed stages. In this essay it is expected to be able to determine the percentage of accuracy of the image analysis, at the group level (gender and genotype) and at the individual level; as well as reducing labor and stress of the pigs during this weighing process, thus improving the animal welfare of the animals on the farm.

Keywords: Animal welfare, pigs, weight control, management, stress, technology.

Evaluación del lactato en líquido sinovial de caninos en la Clínica Veterinaria Francisco de Asís

Ingrid Liliana Casallas Cuervo¹, Fabian Rodrigo Sánchez Cuervo²

¹Estudiante de X semestre de Medicina Veterinaria en la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, E-mail: Liliana_cassallas@yahoo.es. ²Docente asistente en el área de Anatomía e Imagenología en el programa de Medicina Veterinaria en la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. E-mail: fsanchez@jdc.edu.co

Resumen

El lactato se produce de forma natural en el interior del organismo, se encuentra involucrado en el proceso de glucólisis y por lo tanto en la producción de energía, sus concentraciones no aumentan en condiciones normales, por lo que su medición resulta ser una buena herramienta diagnóstica dado que dichas concentraciones se elevan en procesos patológicos. Con base en lo anterior, el presente proyecto de investigación se centra en estudiar el lactato como biomarcador articular, determinando los valores normales de lactato en líquido sinovial de caninos aparentemente sanos que ingresan al servicio de pequeños animales de la Clínica Veterinaria Francisco de Asís, teniendo en cuenta las siguientes variables: lugar anatómico de la punción articular, género, edad y tamaño del animal. Inicialmente, los propietarios del paciente firmarán un consentimiento informado, donde se describe con detalle cómo se realizará el estudio; después se realizará un examen clínico completo, haciendo énfasis en el sistema osteoarticular, verificando criterios de inclusión como que el paciente no presente signos o síntomas de enfermedad articular como claudicaciones, aumentos de tamaño o dolor articular. Los animales seleccionados ingresarán al área de preanestesia donde se realizarán los procedimientos de sedación, tricotomía de la zona, asepsia y antisepsia de la zona de punción y anestesia local, posteriormente serán llevados al quirófano, donde se realizará el proceso de artrocentesis por el cual se extrae el líquido sinovial de las articulaciones de rodilla, cadera y codo, las muestras se analizarán en un medidor de lactato portátil y finalmente los pacientes se dan

de alta por ser un procedimiento ambulatorio. Al concluir el estudio se espera evidenciar si existen diferencias entre los niveles promedio según la articulación puncionada, género, edad y tamaño del animal, también determinar si existe concordancia con los valores ya registrados por la literatura, obtenidos de diferentes zonas corporales como líquido cefalorraquídeo, líquido peritoneal y a nivel sérico.

Palabras clave: Artrocentesis, biomarcadores, extracción, artrología, ácido láctico.

**Evaluation of the lactate in the synovial liquid
of canines in Francisco de Asís Veterinary
Clinic**

Abstract

Lactate is produced naturally in the interior of the body, is involved in the process of glycolysis and therefore in the production of energy, its concentrations do not increase under normal conditions, so that its measurement is a good diagnostic tool since these concentrations are elevated in pathological processes. Based on the above, this research project focuses on studying the lactate as an articular biomarker, determining the normal values of lactate in synovial fluid of apparently healthy canines that enter the service of small animals of the Veterinary Clinic Francisco de Asís, having Consider the following variables: anatomical location of the joint puncture, gender, age and size of the animal. Initially, the owners of the patient will sign an informed consent, where the study will be described in detail; Afterwards, a complete clinical examination will be carried out, emphasizing the osteoarticular system, verifying inclusion criteria such that the patient does not present signs or symptoms of joint disease such as claudication, enlargement or joint pain. The selected animals will enter the pre-anesthesia area where the sedation procedures, area trichotomy, asepsis and antisepsis of the puncture site and local anesthesia will be performed, and then they will be taken to the operating room, where the arthrocentesis process will be carried out. It removes the synovial fluid from the knee, hip and elbow joints, the samples will be analyzed in a portable lactate meter and finally the patients are discharged because it is an outpatient procedure. At the conclusion of the study, it is expected to show if there are differences between the average levels according to the punctured joint, gender, age and size of the animal, also to determine if there is agreement with the values already recorded by the literature, obtained from different body areas such as cerebrospinal fluid, peritoneal fluid and at the serum level.

Keywords: Arthrocentesis, biomarkers, extraction, arthrology, lactic acid.

Análisis físico-químico de la leche bovina para la prospección de un sensor que determine cetosis

Fredy Javier Angarita Alonso¹, María Isabel Arteaga Orozco², Luis Daladier Guerreo Otoya³, Zuly Yuliana Delgado Espinoza³, Héctor Oliver Navia Gómez⁴.

¹ Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia - Universidad Antonio Nariño. freangarita@uan.edu.co.

²Facultad de Ingeniería Mecánica - Electrónica y Biomédica - Universidad Antonio Nariño. isabel.arteaga@uan.edu.co.

³Programa de Ingeniería Industrial - Corporación Universitaria Comfacaucá.

lguerrero@unicomfacaucá.edu.co;

zdelgado@unicomfacaucá.edu.co. ⁴Asociación de

productores Lacteos y Agroganaderos del Municipio de Popayán – ASPROLGAN- olivernaviagomez@hotmail.com

Resumen

La cetosis es un trastorno metabólico que afecta al ganado lechero durante el periodo de transición y con un mayor énfasis en las primeras tres semanas de lactancia. Esta enfermedad se produce como consecuencia de un trastorno en el metabolismo de los carbohidratos y los lípidos y se caracteriza por la producción y acumulación de cuerpos cetónicos (acetona, acetoacetato y el β -hidroxibutirato) que se caracteriza por la hipercetonemia y cetonuria. Conviene señalar que los productores no identifican que la cetosis, principalmente la subclínica, causa pérdidas económicas como consecuencia de la disminución de la producción de leche, aumento del riesgo de enfermedades periparto (metritis, mastitis) y reducción del rendimiento reproductivo. Por otra parte la cetosis subclínica representa para el ganadero un problema en su valoración temprana, porque se incrementan las concentraciones sanguíneas de cuerpos cetónicos, sin la presencia de signos clínicos. El objetivo principal consiste en identificar las características fisicoquímicas de la leche bovina con cuerpos cetónicos para la prospección de un sensor con la finalidad de diagnosticar cetosis bovina de forma no invasiva. Para tal fin se plantea realizar una investigación experimental con análisis correlacionales, donde se identificarán vacas con cetosis clínica y subclínica para caracterizar fisicoquímicamente la leche, realizar análisis cromatográficos, analizar pruebas enzimáticas de

los cuerpos cetónicos en leche para determinar la respuestas eléctricas asociadas y establecer diseños de ingeniería básica del prototipo del sensor que determine cetosis en muestras de leche de una forma automática y no invasiva. Los resultados de esta investigación servirán para formular un próximo proyecto que tendrá como finalidad diseñar un prototipo de sensor electrónico portátil (dispositivo no invasivo) que permita detectar el β -hidroxibutirato en la leche de forma automática en la leche durante las prácticas rutinarias de ordeño.

Palabras clave: β -hidroxibutirato, cetosis, sensor, leche, cromatografía, propiedades fisicoquímicas.

Agradecimientos

Los autores expresan su agradecimiento al Proyecto Red de Formación del Talento Humano para la Innovación Social y Productiva en el departamento del Cauca -Innovación Cauca por el apoyo y cofinanciamiento de la presente investigación.

**Physical-chemical analysis of bovine milk for
the prospection of a sensor that determines
ketosis**

Abstract

Ketosis is a metabolic disorder that affects dairy cattle during the transition period and with a greater emphasis on the first three weeks of lactation. This disease occurs as a result of a disorder in the metabolism of carbohydrates and lipids and is characterized by the production and accumulation of ketone bodies (acetone, acetoacetate and β -hydroxybutyrate) which is characterized by hypercetonemia and ketonuria. It should be noted that producers do not identify that ketosis, mainly subclinical, causes economic losses as a result of decreased milk production, increased risk of peripartum diseases (metritis, mastitis) and reduced reproductive performance. On the other hand, subclinical ketosis represents a problem for the farmer in his early assessment, because blood concentrations of ketone bodies are increased, without the presence of clinical signs. The main objective is to identify the physicochemical characteristics of bovine milk with ketone bodies for the prospection of a sensor in order to diagnose bovine ketosis in a non-invasive way. For this purpose, an experimental investigation with correlational analysis is proposed, where cows with clinical and subclinical ketosis will be identified to physicochemically characterize the milk, perform chromatographic analyzes, analyze enzymatic tests of the ketone bodies in milk to determine the associated electrical responses and establish designs of basic engineering of the sensor prototype that determines ketosis in milk samples in an automatic and non-invasive way. The results of this research will serve to formulate an upcoming project that will aim to design a portable electronic sensor prototype (non-invasive device) that allows the detection of β -hydroxybutyrate in milk automatically in milk during routine milking practices.

Keywords: β -hydroxybutyrate, ketosis, sensor, milk, chromatography, physico-chemical properties.

Hallazgos ecográficos en el rumen y retículo durante el período de transición en vacas Holstein

Fredy Javier Angarita Alonso¹, Nelitza Marelys Linares Álvarez², Arizaldo Majin Anacona³, Hernán Garcés Sandoval⁴

¹Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia - Universidad Antonio Nariño. freangarita@uan.edu.co.

²Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia - Universidad Antonio Nariño. nelinarez@uan.edu.co.

³Asociación de Productores de Leche de Sotará — ASPROLESO. asproleso@gmail.com. ⁴Comité de Ganaderos del Cauca.

comitedeganaderosdelcauca@hotmail.com

Resumen

Las alteraciones de la función digestiva son muy frecuentes en los bovinos y constituye un área de importancia médica relevante, porque la estructura anatómica rumen-retículo participa en la obtención del 90% de la energía utilizable por parte del animal. Cualquier patología que involucre estas estructuras afecta la salud del rumiante e implica grandes pérdidas económicas para el productor. En la actualidad los médicos veterinarios, zootecnistas y productores vinculados con la ganadería de leche en la meseta de Popayán, no tienen referencias de investigaciones previas relacionadas con la aplicabilidad del ultrasonido como herramienta de diagnóstico a nivel del rumen y retículo que permitan estandarizar procesos de evaluación no invasiva para la prevención y manejo de enfermedades que afecten estas estructuras anatómicas. El objetivo principal es evaluar los hallazgos ecográficos del rumen y retículo durante el período de transición en vacas Holstein bajo condiciones de producción del trópico colombiano. Para tal fin, las evaluaciones ecográficas del rumen y retículo se llevarán a cabo una vez por semana durante el período de transición (tres semanas antes del parto y cuatro semanas postparto) realizándose una vez finalizado el ordeño de la mañana. El modelo estadístico utilizará un diseño de medidas repetidas con arreglo factorial, los datos serán registrados en una plantilla de Excel y se analizarán con estadística descriptiva referenciando la media (X), desviación estándar (DE) y error estándar (EE). La normalidad de los

errores se comprobará con la prueba de Shapiro-Wilk y de homocedasticidad mediante la prueba de Bartlett. Las diferencias estadísticas se analizarán mediante un análisis de varianza (ANOVA) para medidas repetidas y las medias se compararán mediante una prueba t pareada. Los resultados de este estudio se direccionarán a sensibilizar y educar a los productores del sector lechero de la meseta de Popayán para que validen la ultrasonografía como una herramienta de diagnóstico ideal para diagnosticar y prevenir enfermedades que afecten al rumen y al retículo.

Palabras clave: Rumen; retículo; ultrasonografía; período de transición; pared ruminal; bienestar animal.

Agradecimientos

Los autores expresan su agradecimiento a la Vicerrectoría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Antonio Nariño por el apoyo y financiamiento de la presente investigación.

**Ultrasound findings in the rumen and
reticulum during the transition period in
Holstein cows**

Abstract

The alterations of the digestive function are very frequent in bovines and constitute an area of relevant medical importance, because the rumen-reticulum anatomical structure participates in obtaining 90% of the usable energy on the part of the animal. Any pathology that involves these structures affects the health of the ruminant and implies great economic losses for the producer. At present the veterinarians, zootechnicians and producers linked to the dairy farming in the Popayán plateau, do not have references of previous investigations related to the applicability of ultrasound as a diagnostic tool at the level of the rumen and reticulum that allow to standardize evaluation processes non-invasive for the prevention and management of diseases that affect these anatomical structures. The main objective is to evaluate the sonographic findings of the rumen and reticulum during the transition period in Holstein cows under production conditions of the Colombian tropics. For this purpose, the sonographic evaluations of the rumen and reticulum will be carried out once a week during the transition period (three weeks before delivery and four weeks postpartum) taking place once the morning milking is finished. The statistical model will use a design of repeated measures with a factorial arrangement, the data will be recorded in an Excel template and analyzed with descriptive statistics, referencing the mean (X), standard deviation (SD) and standard error (SE). The normality of the errors will be checked with the Shapiro-Wilk test and homoscedasticity by the Bartlett test. The statistical differences will be analyzed by means of an analysis of variance (ANOVA) for repeated measures and the means will be compared by means of a paired t-test. The results of this study will be aimed at sensitizing and educating producers in the dairy sector of the Popayán plateau to validate ultrasonography as an ideal diagnostic tool to diagnose and prevent diseases that affect the rumen and the reticulum.

Keywords: Rrumen; reticle; ultrasonography; transition period; ruminal wall, animal welfare.

Comparación entre el método directo y precipitado para la determinación de los niveles de colesterol HDL en búfalos

José Henry Osorio¹, Yoccner Edilson Quenan²,
Ginés Fernando Ramírez³

¹MD, DVM, PhD. Investigador. Laboratorio de Investigación en Metabolismo. Universidad de Manizales. Cra. 9^a Nro. 19 – 03. Laboratorio de Bioquímica Clínica y Patología Molecular. Universidad de Caldas. Calle 65 No 26-10 Manizales-Caldas, Colombia.

jose.osorio_o@ucaldas.edu.co. ²BSc. Asistente de Investigación, Laboratorio de Investigación en Metabolismo Universidad de Manizales. Cra. 9^a Nro. 19 – 03. ³DVM, MA. Docente. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad de Caldas. Calle 65 No 26-10 Manizales-Caldas, Colombia.

Resumen

La valoración del estado metabólico y salud de los animales se puede realizar mediante análisis de química sanguínea, por tanto, el perfil lipídico es una ayuda diagnóstica para identificar las enfermedades de la producción y el metabolismo. La medición del perfil lipídico consiste en la cuantificación analítica de una serie de lípidos que son transportados en la sangre por los diferentes tipos de lipoproteínas plasmáticas, estas son complejos macromoleculares formados por lípidos y proteínas específicas (apolipoproteínas). Existen diversas técnicas para determinar el perfil lipídico en los mamíferos, a saber se tienen el método de precipitación y el directo para determinar niveles de colesterol HDL. Se compararon el método de precipitación y el método directo para determinar los niveles de colesterol HDL en ovinos, teniendo en cuenta que esta especie pertenece al patrón metabólico HDL; se obtuvieron 50 muestras de sangre de búfalos en ayunas sin discriminación de sexo y edad. El colesterol HDL se midió por el método directo, enzimático-colorimétrico y por el método de precipitación con ácido fosfotungstico. Los resultados fueron analizados a través del programa estadístico IBM SPSS Statistics 23, donde se aceptaba diferencia estadísticamente significativa cuando $p < 0,05$. Los valores de la media, mínimo, máximo y desviación estándar de colesterol HDL, por el método directo en mg/dl fueron: 33,41; 17,20; 49 y 7,72 respectivamente, y por el de precipitado en mg/dl fueron: 33,54;

16,58; 48,80 y 7,89 respectivamente. El valor de p en la prueba t student fue de 0,933 lo cual indica que no existe diferencia estadísticamente significativa a un nivel de confiabilidad del 95% entre los valores obtenidos por los dos métodos. Al no existir diferencia significativa, puede ser utilizado cualquiera de los dos métodos analizados para la determinación del colesterol HDL en esta especie.

Palabras clave: Colesterol HDL; búfalo; método directo; método precipitado.

Comparison between the direct and precipitated method for the determination of HDL cholesterol levels in buffaloes

Abstract

The assessment of the metabolic state and health of the animals can be carried out by blood chemistry analysis, therefore, the lipid profile is a diagnostic aid to identify the diseases of production and metabolism. The measurement of the lipid profile consists in the analytical quantification of a series of lipids that are transported in the blood by the different types of plasma lipoproteins, these are macromolecular complexes formed by lipids and specific proteins (apolipoproteins). There are several techniques to determine the lipid profile in mammals, namely the precipitation method and the direct method for determining HDL cholesterol levels. We compared the precipitation method and the direct method to determine HDL cholesterol levels in sheep, taking into account that this species belongs to the HDL metabolic pattern; 50 blood samples were obtained from fasting buffaloes without discrimination of sex and age. HDL cholesterol was measured by the direct, enzymatic-colorimetric method and by the phosphotungstic acid precipitation method. The results were analyzed through the statistical program IBM SPSS Statistics 23, where a statistically significant difference was accepted when $p < 0.05$. The values of the mean, minimum, maximum and standard deviation of HDL cholesterol, by the direct method in mg / dl were: 33.41; 17.20; 49 and 7.72 respectively, and by the precipitate in mg / dl were: 33.54; 16.58; 48.80 and 7.89 respectively. The p-value in the student t test was 0.933, which indicates that there is no statistically significant difference at a 95% confidence level between the values obtained by the two methods. When there is no significant difference, any of the two methods analyzed for the determination of HDL cholesterol in this species can be used.

Keywords: HDL cholesterol; buffalo; direct method; precipitate method.

Comparación de los valores de pH, pCO₂ y pO₂ de acuerdo al sexo en caninos adultos a 2150 msnm

José Henry Osorio¹, Mario Andrés López²

¹MD, DVM, PhD. Investigador. Laboratorio de Investigación en Metabolismo. Universidad de Manizales. Cra. 9^a Nro. 19 – 03. Laboratorio de Bioquímica Clínica y Patología Molecular. Universidad de Caldas. Calle 65 No 26-10 Manizales-Caldas, Colombia.

jose.osorio_o@ucaldas.edu.co. ²DVM, Programa de Maestría en Ciencias Biomédicas. Universidad de Caldas. Calle 65 No 26-10 Manizales-Caldas, Colombia.

Resumen

La determinación de los valores de gases arteriales y de PH en caninos, debe ser una medida rutinaria en todos los procesos donde se administre sedación o anestesia general. Se compararon los valores de pH, pCO₂ y pO₂ de acuerdo al sexo en caninos adultos a 2150 msnm, como marco de referencia para valores de gases arteriales a esta altitud en caninos normales. Fueron tomadas muestras de la arteria femoral a 50 caninos de diferentes razas, clínicamente sanos (25 machos y 25 hembras), con edades comprendidas entre 1 y 7 años de edad y pesos comprendidos entre 5 y 33 kg, los cuales no estaban bajo efecto de pre-medicación o de anestesia, y que asistieron a controles anuales de vacunación, previa firma de consentimiento informado por parte del propietario. Se les determinó los valores de pH, pCO₂ y pO₂ utilizando un equipo portátil Epoch^R (Epochal Inc 2015). Los resultados fueron analizados a través del programa estadístico IBM SPSS Statistics 23, donde se aceptaba diferencia estadísticamente significativa cuando p valor es < 0,05. Los valores obtenidos de pH de media, desviación estándar, mínimo y máximo para machos, fueron: 7,41; 0,04; 7,32 y 7,49; de pO₂ (mmHg) fueron: 68,6; 7,76; 53,8 y 85,7; y de pCO₂ (mmHg) fueron: 32,4; 3,29; 27,9 y 38,4, respectivamente. Para las hembras, los valores obtenidos de pH de media, desviación estándar, mínimo y máximo, fueron: 7,41; 0,04; 7,30 y 7,49; de pO₂ (mmHg) fueron: 70,4; 7,79; 55 y 84,6; y de pCO₂ (mmHg) fueron: 31,5; 3,91; 24 y 41,8, respectivamente. Al no existir diferencia estadísticamente significativa de acuerdo al sexo, se aportan valores para gases

arteriales en caninos a 2150 msnm de pH 7,4; pCO₂ (mmHg) 31,93; pO₂ (mmHg) 69,50.

Palabras clave: Perros; gases; análisis de los gases de la sangre; concentración de iones de hidrógeno.

Comparison of the values of pH, pCO₂ and pO₂ according to sex in adult canines at 2150 masl

Abstract

The determination of the values of arterial gases and PH in canines should be a routine measure in all the processes where sedation or general anesthesia is administered. The values of pH, pCO₂ and pO₂ were compared according to sex in adult canines at 2150 masl, as a reference frame for arterial gas values at this altitude in normal canines. Samples were taken from the femoral artery to 50 dogs of different breeds, clinically healthy (25 males and 25 females), with ages between 1 and 7 years of age and weights between 5 and 33 kg, which were not under the effect of pre-medication or anesthesia, and attended annual vaccination controls, after signing the informed consent by the owner. The pH, pCO₂ and pO₂ values were determined using a portable EpochR device (Epochal Inc 2015). The results were analyzed through the statistical program IBM SPSS Statistics 23, where a statistically significant difference was accepted when p value is <0.05. The obtained values of pH of mean, standard deviation, minimum and maximum for males, were: 7.41; 0.04; 7.32 and 7.49; of pO₂ (mmHg) were: 68.6; 7.76; 53.8 and 85.7; and of pCO₂ (mmHg) were: 32.4; 3.29; 27.9 and 38.4, respectively. For the females, the obtained values of pH of mean, standard deviation, minimum and maximum, were: 7.41; 0.04; 7.30 and 7.49; of pO₂ (mmHg) were: 70.4; 7.79; 55 and 84.6; and of pCO₂ (mmHg) were: 31.5; 3.91; 24 and 41.8, respectively. When there is no statistically significant difference according to sex, values are provided for arterial gases in canines at 2150 meters above sea level of pH 7.4; pCO₂ (mmHg) 31.93; pO₂ (mmHg) 69.50.

Keywords: Dogs; blood gas analysis; hydrogen-ion concentration.

Validación del uso del kit humano de adiponectina para su uso en muestras séricas de aves comerciales

José Henry Osorio

MD, DVM, BSc, DEA, MSc, MPhil, MMB, PhD.
Investigador. Laboratorio de Investigación en Metabolismo.
Universidad de Manizales. Cra. 9^a Nro. 19 – 03.
Laboratorio de Bioquímica Clínica y Patología Molecular.
Universidad de Caldas. Calle 65 No 26-10 Manizales-
Caldas, Colombia. jose.osorio_o@ucaldas.edu.co

Resumen

La adiponectina corresponde a la familia de las citosinas y es producida por el tejido adiposo, en respuesta al balance energético positivo, donde su concentración sérica está relacionada directamente con la cantidad de grasa corporal. A diferencia de las demás adipocitoquinas conocidas, sus niveles se encuentran disminuidos en estados asociados con resistencia insulínica, tal como obesidad, diabetes tipo 2 y síndrome metabólico. A esta proteína se le ha atribuido un rol antidiabético, antiinflamatorio y antiaterogénico. Usualmente se utiliza un kit multiespecie para la determinación de adiponectina en varias especies animales, pero es de difícil consecución y costoso. El objetivo fue validar el uso del kit humano de adiponectina en muestras séricas de aves comerciales. Para la determinación de la adiponectina se utilizó la prueba de Elisa tipo sándwich en fase sólida (InvitrogenTM Human adiponectin Elisa kit); donde un anticuerpo monoclonal específico para la adiponectina humana ha sido revestido sobre los pocos de las tiras de microtitulación proporcionadas. La lectura se hizo en un equipo lector de micro ELISA (TitertekMultiscan™) a una absorbancia de 450 nm; las absorbancias obtenidas de los estándares se graficaron junto con las concentraciones, y de la curva de calibración se obtuvieron las concentraciones de leptina de las respectivas muestras. Los resultados fueron analizados a través del programa estadístico IBM SPSS Statistics 23. Para la validación del uso del kit humano en aves comerciales se tuvo en cuenta la precisión, la exactitud y el límite de detección (Jensen, 2006; Guidance for Industry, 2001). Precisión: el coeficiente de variación (CV) intraensayo fue

calculado después de analizar 10 muestras (5 de pollos y 5 de gallinas) 5 veces en un solo ensayo, obteniéndose un valor del 16%. El coeficiente de variación (CV) interensayo fue determinado analizando las mismas muestras en cinco ensayos separados, obteniéndose un valor del 17%. Exactitud: fue evaluada indirectamente por linearidad luego de preparar varias diluciones. Cinco muestras de gallinas y 5 de pollos fueron diluidas con el correspondiente buffer de dilución utilizado en cada ensayo, obteniendo concentraciones de 0%, 20%, 50%, 80% y 100%, obteniendo los siguientes resultados: pollos: ($Y=0.9440X+0.0343$, $r^2= 0.9997$) y gallinas: ($Y=0.9555X+0.0253$, $r^2 = 0.9997$). El límite de detección fue de 0.097 ug/ml y para las muestras de pollos y de 0.060 ug/ml para las muestras de las gallinas; durante los ensayos además se trabajó con 10 muestras de humanos, obteniendo unos valores (ug/ml) de promedio, mínimo, máximo y desviación estándar de: 6,13, 2,87, 8,69, y 1,59 respectivamente, mostrando un CV del 11% intraensayo y del 10% inter-ensayo. El kit puede ser usado de adiponectina humana para la medición su sérica en muestras de aves comerciales.

Palabras clave: Adiponectina, ELISA, validación.

Validation of the use of the human adiponectin kit for use in commercial poultry serum samples

Abstract

Adiponectin corresponds to the family of cytosines and is produced by adipose tissue, in response to positive energy balance, where its serum concentration is directly related to the amount of body fat. Unlike the other known adipocytokines, their levels are decreased in states associated with insulin resistance, such as obesity, type 2 diabetes and metabolic syndrome. This protein has been attributed an anti-diabetic, anti-inflammatory and anti-atherogenic role. Usually a multispecies kit is used for the determination of adiponectin in several animal species, but it is difficult to achieve and expensive. The objective was to validate the use of the human adiponectin kit in serum samples from commercial birds. For the determination of adiponectin, the sandwich type Elisa test in solid phase (Invitrogen™ Human adiponectin Elisa kit) was used; wherein a monoclonal antibody specific for human adiponectin has been coated onto the wells of the microtitre strips provided. The reading was made in a micro-ELISA reader (TitertekMultiscan™) at an absorbance of 450 nm; the absorbances obtained from the standards were plotted together with the concentrations, and from the calibration curve the leptin concentrations of the respective samples were obtained. The results were analyzed through the statistical program IBM SPSS Statistics 23. For the validation of the use of the human kit in commercial birds, accuracy, accuracy and detection limit were taken into account (Jensen, 2006, Guidance for Industry, 2001). Accuracy: the intraassay coefficient of variation (CV) was calculated after analyzing 10 samples (5 of chickens and 5 of chickens) 5 times in a single test, obtaining a value of 16%. The interassay coefficient of variation (CV) was determined by analyzing the same samples in five separate trials, obtaining a value of 17%. Accuracy: was evaluated indirectly by linearity after preparing several dilutions. Five samples of chickens and 5 chickens were diluted with the corresponding dilution buffer used in each test, obtaining concentrations of 0%, 20%, 50%, 80% and 100%, obtaining the following results:

chickens: ($Y = 0.9440 X + 0.0343$, $r^2 = 0.9997$) and chickens: ($Y = 0.9555X + 0.0253$, $r^2 = 0.9997$). The limit of detection was 0.097 ug / ml and for chicken samples and 0.060 ug / ml for chicken samples; During the tests, we also worked with 10 human samples, obtaining values (ug / ml) of average, minimum, maximum and standard deviation of: 6.13, 2.87, 8.69, and 1.59 respectively, showing a CV of 11% intra-assay and of 10% inter-assay. The kit can be used for human adiponectin for the measurement of its serum in commercial poultry samples.

Keywords: Adiponectin, ELISA, validation.

Caracterización clínica y hormonal de pacientes caninos hipotiroideos en una clínica ubicada al norte Bogotá

García-Martínez A. M.¹, Castro-Guzmán A. D.¹, & Córdoba-Parra J. D.^{1,2}

¹Programa de Medicina Veterinaria, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad de La Salle, Bogotá, Colombia.

²Compañía California S. A. Bogotá, Colombia.
cientifica@ciacalifornia.com.co

Resumen

El hipotiroidismo canino es la endocrinopatía diagnosticada con más frecuencia en esta especie, y se debe a la deficiente producción, secreción o acción de las hormonas tiroideas. Esta enfermedad es multisistémica, ya que tiene impacto sobre distintos órganos. A través de un análisis de la actividad hormonal junto con el examen clínico, se permite realizar una clasificación y un diagnóstico más certero de esta enfermedad. Se caracterizó de forma clínica y hormonal a los pacientes caninos con hipotiroidismo en una clínica veterinaria al norte de Bogotá. Se recopilaron 40 historias clínicas de pacientes caninos diagnosticados con hipotiroidismo en una clínica veterinaria ubicada al norte de Bogotá durante el periodo de febrero a septiembre del año 2017. Se realizó una recolección y tabulación de los valores hormonales, raza, sexo, edad, peso, variaciones cardíacas, estado físico y de la piel. Finalmente, se comparó las características más destacadas y frecuentes. Los valores de T3 (Triyodotironina) Total fueron de $0.46 \text{ ng/dL} \pm 6.84$ (referencia: $0.8 - 1.5 \text{ ng/dL}$) y de T4 (Tetrayodotironina) fueron de $0.77 \text{ } \mu\text{g/dL} \pm 0.39$ (referencia: $1.5 - 3.5 \text{ } \mu\text{g/dL}$). En 35 (100%) pacientes se midió T3, de los cuales 20 (57%) estaban por debajo del valor de referencia. En los 40 pacientes se midió T4 y 23 (57.5%) estaban por debajo del rango de referencia. La Hormona Estimulante de la Tiroides se midió en 16 animales (100%), resultando en un promedio de $0.5 \pm 0.29 \text{ ng/mL}$ (referencia mayor a 0.59 ng/mL), con un 43.75% de animales con un resultado inferior al de referencia. El signo de obesidad se presentó en un 98%, alopecia en el 83%, pelaje seco en el 73% y disminución del ritmo cardíaco en el 35%. Finalmente, las hembras (60%), las razas Beagle (32.5%) y

Bulldog (20%) y adultos senior de 8 años (57.5%) fueron los individuos con mayor frecuencia de presentación de hipotiroidismo en este estudio. Los pacientes con hipotiroidismo pueden tener una o varias hormonas tiroideas en valores inferiores a los de referencia. Los signos más frecuentes son obesidad, alopecia y pelaje seco. Las hembras son más propensas y los animales mayores de 8 años son los de mayor frecuencia de presentación. Las razas Beagle y Bulldog fueron las más diagnosticadas. La relación clínico patológica y la evaluación hormonal son herramientas vitales para el diagnóstico temprano y toma de decisiones terapéuticas integrales y completas para mejorar la salud y calidad de vida de los pacientes hipotiroideos.

Palabras clave: Hipotiroidismo, caninos, hormonas, signos.

Clinical and hormonal characterization of hypothyroid canine patients in a veterinary clinic located in the north of Bogota

Abstract

Canine hypothyroidism is the endocrinopathy diagnosed most frequently in this species, and is due to the deficient production, secretion or action of thyroid hormones. This disease is multisystemic, since it has an impact on different organs. Through an analysis of the hormonal activity together with the clinical examination, a more accurate classification and diagnosis of this disease is allowed. Clinically and hormonally, canine patients with hypothyroidism were characterized in a veterinary clinic north of Bogotá. We collected 40 medical records of canine patients diagnosed with hypothyroidism in a veterinary clinic located north of Bogotá during the period from February to September 2017. A collection and tabulation of the hormonal values, breed, sex, age, weight, cardiac variations, physical condition and skin were made. Finally, the most outstanding and frequent characteristics were compared. The total T3 (Triiodothyronine) values were $0.46 \text{ ng / dL} \pm 6.84$ (reference: 0.8 - 1.5 ng / dl) and T4 (Tetrayodotironin) were $0.77 \mu\text{g / dl} \pm 0.39$ (reference: 1.5 - 3.5 $\mu\text{g / dl}$). T3 was measured in 35 (100%) patients, of which 20 (57%) were below the reference value. In the 40 patients, T4 was measured and 23 (57.5%) were below the reference range. The Thyroid Stimulating Hormone was measured in 16 animals (100%), resulting in an average of $0.5 \pm 0.29 \text{ ng / mL}$ (reference greater than 0.59 ng / mL), with 43.75% of animals with a result lower than the reference . The sign of obesity was presented in 98%, alopecia in 83%, dry hair in 73% and decrease in heart rate in 35%. Finally, the females (60%), the Beagle (32.5%) and Bulldog (20%) and the 8 year old senior (57.5%) were the individuals with the highest frequency of hypothyroidism in this study. Patients with hypothyroidism may have one or more thyroid hormones below the reference values. The most frequent signs are obesity, alopecia and dry fur. The females are more prone and the animals older than 8 years are the ones with the highest frequency of presentation. The Beagle and Bulldog breeds were the most diagnosed. The

clinical pathological relationship and hormonal evaluation are vital tools for early diagnosis and comprehensive and comprehensive therapeutic decisions to improve the health and quality of life of hypothyroid patients.

Keywords: Hypothyroidism, canines, hormones, signs.

Efecto en parámetros zootécnicos sobre libertad hambre/sed en gallinas ponedoras bajo dos sistemas de producción

Ana Leonor Silvera Sarmiento¹. MVZ, Claudia

Liliana Santos León². MVZ, Esp, Yazmín

Andrea Calvo Rodríguez³. MVZ, Esp, Darwin

Antonio García Rojas⁴. MVZ, Esp, Jorge

Humberto Contreras Castro⁵. Biólogo Marino,

Msc, Ricci Terraza Martínez⁶. Bacteriólogo,

Jorge Elicer Franco Rodríguez⁷. MVZ, Esp.

¹Egresada Escuela de M.V.Z, Instituto Universitario de la Paz, Barrancabermeja-Santander. anysilver@gmail.com.

²Docente Escuela de M.V.Z, Instituto Universitario de la Paz, Barrancabermeja-Santander.

liliana.santos@unipaz.edu.co. ³Docente Escuela de M.V.Z,

Instituto Universitario de la Paz, Barrancabermeja-

Santander. yazmin.calvo@unipaz.edu.co ⁴Docente Escuela

de M.V.Z. Instituto Universitario de la Paz,

Barrancabermeja-Santander. darwin.garcia@unipaz.edu.co.

⁵Docente Escuela de M.V.Z. Instituto Universitario de la

Paz, Barrancabermeja-Santander.

jorge.contreras@unipaz.edu.co. ⁶Docente Escuela de

M.V.Z. Instituto Universitario de la Paz, Barrancabermeja-

Santander. ricci.terraza@unipaz.edu.co ⁷Director Escuela

de M.V.Z, Instituto Universitario de la Paz,

Barrancabermeja-Santander. dir.mvz@unipaz.edu.co

Resumen

El bienestar animal se ha convertido en el aspecto con gran influencia en los sistemas productivos pecuarios, la avicultura es uno de éstos sistemas y en especial la producción en gallinas ponedoras, teniendo en cuenta que la producción de huevos ocupa un lugar muy importante en la economía colombiana, con el bienestar animal se propende un estado sano, confort de las aves, en donde puedan producir pero al mismo tiempo mantengan un estado óptimo, por consiguiente el presente estudio pretende evaluar el efecto en los parámetros zootécnicos sobre la libertad hambre/sed en gallinas ponedoras bajo dos sistemas de producción (piso y pastoreo). Se utilizaron 240 gallinas criollas del género *Gallus domesticus* x subespecie *morus*, *Gallus domesticus* x subespecie *ecaudatus*, divididas en 120 aves bajo dos sistemas (piso y pastoreo), distribuidas en tres réplicas de 40 gallinas, cada una por un período de 60 días, los animales del sistema en pastoreo se distribuirán por fuera del galpón en 3 corrales de 13,33m² con una densidad de 3 gallinas/m²; se mantendrán en pastoreo

durante 4 horas diarias, alimentándose con grama natural, leguminosas, arvenses y forrajes, para el grupo en sistema en piso estarán dentro del galpón en tres corrales de 6,6m² con una densidad de 6 gallinas/m². Para la medición de las variables de la libertad de hambre/sed se medirán los siguientes indicadores: peso vivo, consumo de alimento, ganancia de peso, conversión alimentaria, mortalidad y porcentaje de postura, los datos se tomarán diariamente por cada réplica. Para comparar los resultados de la evaluación de las variables se realizará estadística inferencial (ANAVA), estadística descriptiva la cual busca establecer la relación entre la libertad de hambre/sed, con un nivel de significancia del 95%. Se utilizará el programa SPSS 21.0 para el análisis estadístico de los datos. Se espera relacionar y/o comparar el efecto sobre los parámetros zootécnicos sobre la libertad de hambre/sed bajo los dos sistemas de producción en cuestión.

Palabras clave: Bienestar animal, gallinas ponedoras, parámetros zootécnicos, conversión alimenticia, libertad, hambre

**Effect on zootechnical parameters on
hungry/thirst freedom in laying hens under
two production system**

Abstract

Animal welfare has become the aspect with great influence in the livestock production systems, poultry farming is one of these systems and especially the production in laying hens, taking into account that egg production occupies a very important place in the economy Colombian, with the animal welfare a healthy state, comfort of the birds, where they can produce but at the same time maintain an optimal state, therefore the present study tries to evaluate the effect in the zootechnical parameters on the freedom hunger / thirst in laying hens under two production systems (floor and grazing). 240 Creole chickens of the genus *Gallus domesticus* x subspecies *morus*, *Gallus domesticus* x subspecies *ecaudatus*, divided into 120 birds under two systems (floor and grazing), distributed in three replicates of 40 chickens, each for a period of 60 days, will be used. animals of the grazing system will be distributed outside the house in 3 pens of 13.33m² with a density of 3 hens / m²; they will stay in grazing for 4 hours a day, feeding on natural grass, legumes, weeds and forages, for the group in floor system they will be inside the house in three pens of 6.6m² with a density of 6 hens / m². For the measurement of the freedom / hunger freedom variables, the following indicators will be measured: live weight, feed intake, weight gain, feed conversion, mortality and posture percentage, the data will be taken daily for each replication. In order to compare the results of the evaluation of the variables, inferential statistics (ANAVA), descriptive statistics which seeks to establish the relationship between freedom from hunger / freedom from thirst, with a level of significance of 95%, will be carried out. The SPSS 21.0 program will be used for the statistical analysis of the data. It is expected to relate and / or compare the effect on zootechnical parameters on the freedom of hunger / thirst under the two production systems in question.

Keywords: Animal welfare, laying hens, zootechnical parameters, feed conversion, freedom, hungry.

Evaluación de modelos de la curva de crecimiento en pollos de engorde comerciales

Oscar David Múnera¹, Luis-Miguel Gómez^{1,2}, Luis Fernando Galeano³, Clara Roselina Ángel^{1,4}

¹Grupo de Investigación Nutri-Solla, Solla S.A (Código Postal 1272), Itagüí, Colombia. ²Universidad CES, Medellín Colombia. ³Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias Agrarias, Medellín, Colombia. ⁴Department of Animal and Avian Sciences, University of Maryland, USA.

Resumen

En Colombia, no existe suficiente información sobre el patrón o curva de crecimiento de los pollos de engorde y por ende su predicción se basa en datos de países con otras latitudes y con sistemas de alimentación diferentes. El presente trabajo tuvo por objetivo modelar la curva de crecimiento del pollo de engorde de la línea Ross AP utilizando modelos lineales y modelos no lineales. Se llevaron a cabo 18 pesajes entre el día 1 y el 42 de vida a 96 corrales de 50 pollos cada uno, a una densidad aproximada de 14 aves por metro cuadrado, para un total de 1728 registros de peso promedio de pollo. En el ajuste de la curva de crecimiento se utilizaron los modelos no lineales logístico, Gompertz, Richards y Von Bertalanffy y el modelo lineal cuadrático. Los análisis fueron realizados en el Software R Project con las librerías nlstools y nls2 para los modelos no lineales y la librería stats para el modelo lineal. Los modelos se compararon a través del criterio de información Akaike (AIC) y el criterio de información Bayesiano (BIC). Los valores de AIC para los modelos evaluados variaron entre 20795.53 y 33613.4, mientras que para BIC estuvieron entre 20817.35 y 33640.67. El modelo más preciso con base en los criterios seleccionados fue el modelo cuadrático ya que presentó los menores valores (AIC de 20795.53 y BIC de 20817.35). Los parámetros del modelo seleccionado fueron: peso = $72.75329 + 0.78976(\text{día}) + 1.76232(\text{día}^2)$. El mejor modelo para la predicción de la curva de crecimiento de pollos comerciales de la línea Ross AP hasta el día 42 de edad, con múltiples mediciones por el animal en el tiempo, fue el modelo cuadrático.

Palabras clave: Modelación animal, modelo cuadrático, modelo Gompertz, modelo logístico; modelo Richards; modelo Von Bertalanffy.

Evaluation of the growth curve of commercial broilers

Abstract

In Colombia, there is not enough information on the pattern or growth curve of broilers and therefore their prediction is based on data from countries with other latitudes and with different feeding systems. The objective of this work was to model the growth curve of the broiler of the Ross AP line using linear models and nonlinear models. 18 weighings were carried out between day 1 and 42 of life to 96 pens of 50 chickens each, at an approximate density of 14 birds per square meter, for a total of 1728 records of average chicken weight. In the adjustment of the growth curve, the non-linear logistic, Gompertz, Richards and Von Bertalanffy models and the linear quadratic model were used. The analysis were carried out in the R Project Software with the nlstools and nls2 libraries for the non-linear models and the stats library for the linear model. The models were compared through the Akaike information criterion (AIC) and the Bayesian information criterion (BIC). The AIC values for the models evaluated varied between 20795.53 and 33613.4, while for BIC they were between 20817.35 and 33640.67. The most accurate model based on the selected criteria was the quadratic model since it presented the lowest values (AIC of 20795.53 and BIC of 20817.35). The parameters of the selected model were: weight = $72.75329 + 0.78976(\text{day}) + 1.76232(\text{day}^2)$. The best model for the prediction of the growth curve of commercial chickens of the Ross AP line until day 42 of age, with multiple measurements by the animal over time, was the quadratic model.

Keywords: Animal modelling; quadratic model; Gompertz model; logistic model; Richards model; Von Bertalanffy model.

Concentraciones séricas y en leche de B-hidroxibutirato y acetona de vacas lecheras y búfalas Murrah

Santiago Gómez Velilla¹, Tatiana Alejandra Ortiz², Mónica Duque Quintero³

¹Estudiante de pregrado de la Facultad de Medicina Veterinaria, Uniremington, Medellín, Colombia. santiago7gv@gmail.com. ²Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. Tatiana.ortiz@udea.edu.co. ³Profesora de la Facultad de Medicina Veterinaria, Uniremington, Medellín, Colombia. monica.duque@uniremington.edu.co

Resumen

La cetosis subclínica es un importante desorden metabólico en la lactancia temprana en vacas lecheras y está asociada a una reducción en la producción de leche, al desempeño reproductivo y puede incrementar el riesgo de que el animal sufra cetosis clínica y desplazamiento del abomaso. Sin embargo, no se han realizado en Colombia estudios sobre la determinación de estos dos metabolitos en búfalas. El objetivo de este estudio es determinar la correlación entre los valores de betahidroxibutirato (BHB) y acetona (Ac) en sangre y leche en vacas y búfalas y crear valores de referencia para estas últimas. Fueron incluidas 124 vacas Holstein y 72 búfalas Murrah entre 2-5 partos y en los primeros 100 días de lactancia. Se tomaron muestras de leche en el ordeño de la mañana para determinar la composición y las concentraciones de BHB y Ac. Para las determinaciones de BHB y Ac en sangre fueron tomadas muestras de la vena coccígea en un tubo vacutainer de 5ml. Un análisis descriptivo fue realizado para reportar la media, desviación estándar, mediana y moda. Una prueba de correlación de Spearman será realizada para evaluar el grado de asociación entre concentraciones de BHB y Ac en sangre y leche. Se encontró que, de las 124 vacas muestreadas, el 29,9% y 0,9% presentaron cetosis subclínica determinada en las muestras de leche, por las concentraciones de acetona ($>0,15$ cetosis subclínica) y BHB ($> 0,10$ cetosis subclínica) respectivamente. Por otra parte, el 6,1% de las búfalas presentó cetosis subclínica por Ac en leche y el 3,4% de las búfalas presentó cetosis subclínica por BHB en leche. Se encontró que en

vacas lecheras hay una alta presentación de cetosis subclínica, la acetona parece ser un mejor metabolito en leche para la detección de cetosis subclínica según los resultados anteriores, ya que se detectó mayor cantidad de animales. Los resultados muestran también, que las búfalas son animales que presentan cetosis subclínica.

Palabras claves: Acetona, acidosis, betahidroxibutirato, cetosis, leche, sangre.

Agradecimientos

A la corporación universitaria Remington por la financiación del proyecto de investigación “Correlación entre las concentraciones séricas y en leche de B-hidroxibutirato y acetona durante la lactancia temprana en vacas Holstein y búfalas Murrah”.

Serum and milk concentrations of B-hydroxybutyrate and acetone in dairy cows and buffaloes Murrah

Abstract

Subclinical ketosis is an important metabolic disorder in early lactation in dairy cows and is associated with a reduction in milk production, reproductive performance and may increase the risk of the animal suffering clinical ketosis and displacement of the abomasum. However, studies on the determination of these two metabolites in buffaloes have not been carried out in Colombia. The objective of this study is to determine the correlation between the values of betahydroxybutyrate (BHB) and acetone (Ac) in blood and milk in cows and buffaloes and to create reference values for the latter. We included 124 Holstein cows and 72 Murrah buffaloes between 2-5 births and in the first 100 days of lactation. Milk samples were taken in the morning milking to determine the composition and concentrations of BHB and Ac. For the determinations of BHB and Ac in blood, samples of the coccygeal vein were taken in a 5ml vacutainer tube. A descriptive analysis was carried out to report the mean, standard deviation, median and fashion. A Spearman correlation test will be performed to evaluate the degree of association between BHB and Ac concentrations in blood and milk. It was found that, of the 124 cows sampled, 29.9% and 0.9% presented subclinical ketosis determined in the milk samples, by acetone concentrations (> 0.15 subclinical ketosis) and BHB (> 0.10 subclinical ketosis) respectively. On the other hand, 6.1% of buffaloes presented subclinical ketosis for Ac in milk and 3.4% of buffalos presented subclinical ketosis for BHB in milk. It was found that in dairy cows there is a high presentation of subclinical ketosis, acetone seems to be a better metabolite in milk for the detection of subclinical ketosis according to the previous results, since more animals were detected. The results also show that buffaloes are animals that present subclinical ketosis.

Keywords: Acetone, acidosis, betahydroxybutyrate, ketosis, milk, blood.

Peso, condición corporal y calidad de leche en vacas Holstein en periodo de transición

Jairo Andrés Tobón^{1,2}, Oscar David Múnera¹,
Alexánder Balbin¹, Daniel Echavarría²,

Luis-Miguel Gómez^{1,2}

¹Grupo de Investigación Nutri-Solla, Solla S.A (Código Postal 1272), Itagüí, Colombia. ²Universidad CES, Medellín Colombia.

Resumen

El período de transición en vacas requiere de atención especial en cuanto a manejo nutricional y zootécnico; comprende el preparto, parto y postparto. Se evaluaron variables productivas y de calidad de leche en vacas Holstein en transición en pastoreo. Fueron seleccionadas 27 vacas Holstein con partos entre febrero y mayo de 2018 de la Granja experimental Betania de la Empresa Solla. Se registró información de condición corporal (CC) y peso vivo (PV) en los días 21 pre parto, parto y 21 postparto. Para los días 5, 7, 10, 14, 18 y 21 postparto se registró información de producción de leche (litros ordeño am), porcentaje de grasa, proteína, sólidos totales (ST) y lactosa. Se incluyeron mediciones de nitrógeno ureico en leche (MUN) (mg/dL) y Betahidroxibutirato (mM/L). Análisis descriptivos fueron empleadas para evaluar la distribución de los datos por día de control. Se encontró que para PV los mayores valores se observaron al día 21 preparto (604.11 ± 59.87 kg) y los menores al día 21 post parto (503.81 ± 54.74 kg), peso después del parto fue de 532.26 ± 5710 kg. Para CC el mayor valor se registró el día 21 preparto con 3.87 ± 0.20 , al parto de 3.92 ± 0.19 y al día 21 postparto de 3.19 ± 0.35 . Producciones de leche promedio para el ordeño am variaron entre los 10.42 ± 4.48 litros al día 5 hasta 15.49 ± 3.98 litros (día 21). La producción de grasa varió entre $3.57 \pm 0.8\%$ (día 18) y $4.11 \pm 0.69\%$ el día 7. Niveles promedio de proteína entre $3.09 \pm 0.24\%$ (día 21) y 3.91 ± 0.32 fueron observados. Relaciones bajas entre grasa y proteína se observaron al día 5 (1.05 ± 0.40) y las mayores el día 7 (1.23 ± 0.88). Valores porcentuales de ST estuvieron entre 12.36 ± 0.72 y $13.20 \pm 1.22\%$ (días 18 y 5, respectivamente); el MUN presentó rangos entre 15.91 ± 4.95 y 17.86 ± 5.22 mg/dL

para los días 10 y 5, respectivamente. Los valores de BHB promedio por día estuvieron entre 0.0033 ± 0.0087 y 0.035 ± 0.046 Mm/L (días 18 y 5, respectivamente). Para las variables evaluadas no se encontraron valores promedio fuera de los rangos normales para la raza, sin embargo, se deben revisar casos puntuales por vaca. Este trabajo aporta valores de referencia para sistemas de producción en pastoreo.

Palabra clave: Calidad de leche, día de control, ganado de leche, producción de leche, trastornos metabólicos, trastornos nutricionales.



Weight, body condition scoring and milk quality in Holstein dairy cows in transition period

Abstract

The period of transition in cows requires special attention in terms of nutritional and zootechnical management; includes prepartum, parturition and postpartum. Productive and milk quality variables were assessed in Holstein cows in grazing transition. Twenty-seven Holstein cows were selected with births between February and May 2018 from the Betania experimental farm of Solla Company. Body condition (BC) and live weight (LW) information was recorded on days 21 before labor, delivery and 21 postpartum. For days 5, 7, 10, 14, 18 and 21, postpartum information was recorded on milk production (liters milking am), percentage of fat, protein, total solids (TS) and lactose. Measurements of urea nitrogen in milk (MUN) (mg / dL) and Betahydroxybutyrate (mM / L) were included. Descriptive analyzes were used to evaluate the distribution of the data per day of control. It was found that for LW the highest values were observed at day 21 prepartum (604.11 ± 59.87 kg) and the lowest at day 21 after parturition (503.81 ± 54.74 kg), weight after delivery was 532.26 ± 5710 kg. For BC, the highest value was recorded on the 21st prepartum day with 3.87 ± 0.20 , at delivery of 3.92 ± 0.19 and on the 21st postpartum day of 3.19 ± 0.35 . Average milk yields for milking am varied between 10.42 ± 4.48 liters per day 5 to 15.49 ± 3.98 liters (day 21). Fat production varied between $3.57 \pm 0.8\%$ (day 18) and $4.11 \pm 0.69\%$ on day 7. Average protein levels between $3.09 \pm 0.24\%$ (day 21) and 3.91 ± 0.32 were observed. Low fat-protein ratios were observed at day 5 (1.05 ± 0.40) and the highest at day 7 (1.23 ± 0.88). TS percentage values were between 12.36 ± 0.72 and $13.20 \pm 1.22\%$ (days 18 and 5, respectively); the MUN ranged between 15.91 ± 4.95 and 17.86 ± 5.22 mg / dL for days 10 and 5, respectively. The average BHB values per day were between 0.0033 ± 0.0087 and 0.035 ± 0.046 mM / L (days 18 and 5, respectively). For the variables evaluated, no average values were found outside the normal ranges for the breed; however, punctual cases should be reviewed per cow. This

work provides reference values for grazing production systems.

Keywords: Milk quality, test day, dairy cattle, milk production, metabolic disorders, nutritional disorders.



Ajuste e implementación del protocolo de calidad de bienestar para medir el bienestar animal en caballos Criollo Colombiano

Sandra Bautista Jaimes, Shirley Andrea Flórez Rodriguez*

Universidad Industrial de Santander. Headquarters: Málaga (Street 20 N ° 6 - 20 B. The University). *Corresponding author: e-mail: saflorez@uis.edu.co, phone (+57-7 660 72 65) ext. 6503 Málaga – Santander

Resumen

Cuando un animal experimenta dolor, estrés u otras formas de sufrimiento, altera significativamente su calidad de vida, rendimiento y productividad. El objetivo fue adaptar e implementar un protocolo para medir el bienestar animal en criollo colombino equino basado en el protocolo de Calidad del Bienestar. Se evaluó una población de 46 caballos del criadero en Málaga Santander, bajo un sistema de estabulación y entrenamiento diario. El período de investigación fue de febrero a mayo de 2018. El protocolo evaluó cuatro principios: (1) Buena nutrición, (2) Buen ambiente, (3) Buena salud y (4) Comportamiento apropiado. Se establecieron evaluaciones y puntajes de los 11 criterios y 55 indicadores de bienestar; que fueron considerados como Suficiente / normal o Insuficiente / anormal. Los procedimientos fueron realizados por el mismo evaluador, siguiendo la misma secuencia y tiempo, según establece el protocolo. Los resultados revelaron que: (1) Buena nutrición; el promedio de la población fue alto ($76.55 \pm 7.8\%$); pero con reducción en el estado corporal de los animales debido a que su dieta solo satisface las necesidades de mantenimiento y no las de producción. (2) El buen ambiente se evaluó como bajo ($51.4 \pm 9.9\%$) debido a que la dimensión del refugio es insatisfactoria y los espacios y áreas son insuficientes para garantizar la comodidad y la dispersión. 3) Buena salud evaluada como alta ($75.0 \pm 8.0\%$), encontrando solo enfermedades inducidas por el manejo ya que es el caso de la conjuntivitis debida a contaminantes del ambiente. (4) El buen comportamiento fue de $79.5 \pm 11.3\%$, se observaron algunas estereotipias debido al estrés por el estacionamiento y la imposibilidad de pasar tiempo fuera de la caja. La proporción de caballos que presenta bienestar

según los cuatro principios es promedio con $70.6 \pm 5.2\%$, sin diferencia entre mujeres y hombres ($P \geq 0.05$). Concluimos que nuestro protocolo permitió determinar fácilmente el bienestar animal de una población de equinos y es una herramienta útil para identificar los problemas en el sistema de manejo, con el cual proponer futuras intervenciones para la mejora del bienestar animal y facilitar su eficiencia productiva.

Palabras clave: Bienestar animal, producción animal, sistema intensivo, estrés, estereotípicas.



Adjustment and implementation of the protocol welfare quality to measure the animal welfare in Creole Colombian horses

Abstract

When an animal experience pain, stress or other forms of suffering, it alters significantly their quality of life, performance and productivity. The aim was to adapt and to implement a protocol to measure the animal well-being in equine Colombian Creole based on the protocol Welfare Quality. Were evaluated a population of 46 horses of the breeding-place in Málaga Santander, under a system of stabling and daily training. The period of investigation went from February to May, 2018. The protocol evaluated four principles: (1) Good nutrition, (2) Good environment, (3) Good health and (4) appropriate Behavior. Assessment and scoring of the 11 criteria and 55 welfare indicators were established; which were considered as Sufficient / normal or Insufficient / abnormal. The procedures were realized by the same assessor, following the same sequence and time, as the protocol establishes. The results revealed that: (1) Good nutrition; the average for the population was high ($76.55 \pm 7.8\%$); but with reduction in the corporal condition of the animals due to the fact that his diet only satisfies the needs of maintenance and not those of production. (2) Good environment was evaluated like down ($51.4 \pm 9.9\%$) due to that shelter dimension are unsatisfactory and the spaces and areas are insufficient to guarantee the comfort and the scattering. (3) Good health evaluated as discharge ($75.0 \pm 8.0\%$), finding only diseases induced by the managing since it is the case of the conjunctivitis due to pollutants of the environment. (4) Good behavior was of $79.5 \pm 11.3\%$, some stereotypies were observed due to the stressfor stabling and the impossibility to spend time outside the box. Proportion of horse presented welfare according to the four principles is average with $70.6 \pm 5.2\%$, without difference between females and males ($P \geq 0.05$). We conclude that our protocol allowed to determine easily the animal welfare of a population of equine and it is a useful tool to identify the problems in the management system, with which to propose future interventions for the

improvement the animal welfare and facilitate his productive efficiency.

Keywords: Animal well-being, animal production, intensive system, stress, stereotypies.

Determinación de la masa corporal de caninos a partir de un instrumento indirecto de medición

Sneider Téllez Gamba¹, Gisseth Viviana Montoya Pisco², Laura Victoria Ruiz García², Paula Alejandra Yunda Cubillos², Alejandra Valencia Villamarín²

¹Zootecnista Universidad Nacional de Colombia, Aspirante a título de Especialización en Nutrición Animal Sostenible UNAD, Docente de Planta Corporación Educativa Nacional – Email: h.tellez@cen.edu.co, sneider.tellez@gmail.com.

²Aspirantes a título de Auxiliar en clínica veterinaria, Corporación Educativa Nacional, Bogotá, Colombia

Resumen

La estimación del peso en los animales domésticos se constituye como un elemento esencial en la construcción de la historia clínica y además como parte indispensable en la formulación y dosificación de medicamentos. Existen casos en los que se requiere la atención médica veterinaria a pacientes caninos, pero no se cuenta en el momento con herramientas de obtención del peso. Con el objetivo de determinar la masa corporal de un canino, sin poseer básculas o dinamómetros se decidió construir un instrumento indirecto de predicción del peso del animal a partir de dos medidas corporales. Para ello fue necesario establecer las medidas anatómicas a utilizar y su relación con el peso. Para ello se recolectó la información morfológica de 600 caninos, dicha información se sometió a análisis estadístico a través de un modelo de regresión lineal múltiple. Para la elaboración del modelo de regresión se desarrollaron pruebas pareadas de medidas corporales donde se utilizaron dos de estas para la predicción del peso. Se pudo establecer que las variables de longitud corporal y perímetro torácico (variables independientes) tenían una predicción más acertada ($r^2=0,76$) respecto a las que usaban otras medidas corporales. Es así como se logró determinar un modelo que permite predecir el peso utilizando las medidas de longitud corporal y perímetro torácico en perros, con un nivel de precisión cercano al 84%. A partir de esto se construyó una tabla que permite predecir de forma aproximada el peso de los perros a partir de dos de sus medidas corporales. También se construyó un aplicativo web y una app para dispositivos

móviles que integra la formula lo cual facilita aún más la obtención aproximada del peso del animal.

Palabras clave: Peso, medidas anatómicas, caninos, bascula.

Determination of the body mass of dogs from an indirect measurement instrument

Abstract

The estimation of the weight in the domestic animals is the essential element in the construction of the clinical history and the essential component in the formulation and dosage of medicines. There are cases in which veterinary medical attention is required in canine patients, but the moment is not taken into account with tools for obtaining the weight. In order to determine the body mass of a canine, scales or dynamometers can be imported, an indirect instrument for predicting the weight of the animal can be constructed from the body measurements. For this it was necessary to establish the anatomical measures to be used and their relationship with the weight. For this, the morphological information of 600 canines was collected; this information was subjected to a statistical analysis through a multiple linear regression model. For the development of the regression model, tests were developed for body measurements where two of these are used for weight prediction. It could be established that the variables of body length and thoracic perimeter (independent variables) had a more accurate prediction ($r^2 = 0.76$) with respect to those that used other body measurements. That is to say, the model that allows predicting the weight can be determined using the measurements of the corporal length and the thoracic perimeter in dogs, with a level of precision close to 84%. From this a table was constructed that allows predicting in an approximate way the weight of the dogs from the corporal measurements. A web application was also built and an application for mobile devices that integrates the formula, which further facilitates the approximation of the weight of the animal.

Keywords: Weight, anatomical measurements, canines, weighing machine.



Bienestar animal en equinos durante el transporte en los municipios de Tabio, Tenjo y Villette (Cundinamarca, Colombia)

Nicolás Cardona Villada¹, Est MV; Israel García Herrera¹, Est MV; Ericka Peña Zapata¹, Est MV; Mariana A Romero Rincón¹, Est MV; Víctor M Acero Plazas², MV, MSc(c).

¹Programa de Medicina Veterinaria, Facultad de Ciencias Agrarias, Fundación Universitaria Agraria de Colombia, Bogotá, Colombia. ²Asociación Nacional de Médicos Veterinarios de Colombia (AMEVEC). E-mail:

sepulvic@hotmail.com

Resumen

El bienestar animal en equinos, especialmente en el transporte, es un tema actual muy importante donde se tienen en cuenta los diferentes factores que pueden causar dificultades a la hora de transportar los caballos. Actualmente, los equinos participan en diferentes eventos y competencias en los que se hace necesario proveer la seguridad y bienestar del animal, previniendo lesiones en el transporte. El objetivo fue describir el bienestar animal equino durante el transporte en los municipios de Tabio, Tenjo y Villette en el departamento de Cundinamarca (Colombia). Se realizaron encuestas a transportadores de equinos en cada municipio para identificar los conocimientos acerca del bienestar animal. La encuesta constaba de nueve preguntas directamente relacionadas con el bienestar en el transporte de caballos. Se realizaron 20 encuestas en Villette, tres en Tenjo y tres en Tabio. Adicionalmente se documentó el transporte de los equinos en una feria equina en uno de los municipios. El 69% de los encuestados no tienen en cuenta ningún método preventivo al momento de subir al equino al transporte, así mismo el 69% de los transportadores sólo hidrata al equino entre las 4 a 6 h de viaje. De igual manera, el 46% de los encuestados no realiza un período de descanso antes de transportar los equinos. El 53% menciona no tener claro el concepto de bienestar animal, aunque el 80% menciona conocer que el transporte sí afecta de alguna manera a los equinos. Finalmente, el 92% asegura tener un vehículo adecuado para el transporte, lo cual no concuerda con lo visto en la práctica, ya que sólo el 30% utiliza remolques adecuados. Se evidencia

la importancia de realizar capacitaciones al personal que trabaja y maneja equinos, para de esta manera no afectar el bienestar animal. Así mismo, los propietarios de los caballos deben hacer un seguimiento de las prácticas realizadas con los animales durante su manejo.

Palabras clave: Bienestar, equinos, transporte.



Animal welfare in horses while transport in the municipalities of Tabio, Tenjo and Villeta (Cundinamarca, Colombia)

Abstract

Animal welfare in horses, especially in transport, is a very important current issue where the different factors that can cause difficulties when transporting horses are taken into account. Currently, equines participate in different events and competitions in which it is necessary to provide the safety and welfare of the animal, preventing injuries in transport. The objective was to describe equine animal welfare during transport in the municipalities of Tabio, Tenjo and Villeta in the department of Cundinamarca (Colombia). Surveys were carried out on horse transporters in each municipality to identify knowledge about animal welfare. The survey consisted of nine questions directly related to welfare in the transportation of horses. Twenty surveys were conducted in Villeta, three in Tenjo and three in Tabio. Additionally, the transportation of equines was documented at an equine fair in one of the municipalities. 69% of respondents do not take into account any preventive method when going to the equine to transport, likewise 69% of transporters only hydrates the equine between 4 to 6 h of travel. Similarly, 46% of respondents do not take a rest period before transporting horses. 53% mentions not being clear about the concept of animal welfare, although 80% mentions that transportation does affect equines in some way. Finally, 92% say they have a suitable vehicle for transport, which does not agree with what is seen in practice, since only 30% use suitable trailers. There is evidence of the importance of carrying out trainings for personnel who work and manage equines, so as not to affect animal welfare. Likewise, the owners of the horses must follow up on the practices carried out with the animals during their management.

Keywords: Horses, transportation, welfare.

Determinación de lactato sérico y glicemia como biomarcadores de estrés en *Cebus albifrons* en cautiverio

Andrea Carolina Peña López¹, Viviana Gómez-Carrillo², Ana Consuelo González Patiño³

¹Estudiante X semestre MV. Grupo IRABI, Fundación Universitaria Juan de Castellanos, acpl9420@hotmail.com.

²MSc. Docente MV. Grupo IRABI, Fundación Universitaria Juan de Castellanos, rgomez@jdc.edu.co. ³Docente MV. Grupo IRABI, Fundación Universitaria Juan de Castellanos, acgonzalez@jdc.edu.co.

Resumen

Los biomarcadores en Medicina Veterinaria son una herramienta médica porque facilitan el monitoreo de algunas condiciones en pacientes. En medicina zoológica estos biomarcadores no se emplean rutinariamente por ausencia de información, dificultad en la obtención de la muestra y el alto costo de los laboratorios. En ese sentido se determinaron los niveles de lactato sérico y glicemia como biomarcadores de estrés en primates cariblanos (*Cebus albifrons*) que se encuentran en el Hogar de paso de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos – Corpoboyacá, en el municipio de Soracá, Boyacá. Se tomaron muestras de cuatro primates con muestreo y remuestreo al mes, obteniendo ocho muestras. Para la manipulación de los animales se realizó restricción física y química, en la que se empleó Ketamina a dosis de 6 mg/kg y Xilacina a dosis de 0,6 mg/kg de peso. Se tomaron 3ml de sangre de la vena femoral e inmediatamente se midió el lactato sérico con el equipo Accutrend Plus® y la glicemia con un glucómetro digital Accu-Chek Active®. Por último, se hizo el seguimiento etológico con un etograma por animal, del que se obtuvo un catálogo comportamental para determinar la frecuencia de presentación de cada comportamiento, luego se agruparon en conductas cooperativas (comportamientos grupales y filiales) y conductas competitivas (comportamientos agresivos). El lactato sérico obtenido fue de $5,7 \pm 2,8$ mmol/l y de glicemia de $129,29 \pm 16,93$ g/dl, no hubo evidencia de diferencia entre los dos muestreos ($P > 0,05$). Se revisaron 106 comportamientos, encontrando mayor frecuencia en las conductas cooperativas sobre las competitivas ($P < 0,05$). Se halló

correlación positiva entre lactato sérico y glicemia ($r = 0,669$) y entre los comportamientos agónicos y glicemia ($r = 0,615$). Lo anterior muestra que la glicemia parece variar ante conductas competitivas y comportamientos agónicos, pudiendo ser un biomarcador agudo ante los cambios comportamentales. El lactato sérico no parece correlacionarse con los comportamientos, pudiendo ser un biomarcador efectivo para seguimiento de pacientes críticos como lo es en humanos y en otras especies animales.

Palabras clave: Bienestar, cautiverio, comportamiento, marcador biológico, primates.

Determination of blood lactate and glycaemia as stress biomarkers in *Cebus albifrons* in captivity

Abstract

The biomarkers in Veterinary Medicine are a medical tool because they facilitate the monitoring of some conditions in patients. In zoological medicine these biomarkers are not used routinely due to lack of information, difficulty in obtaining the sample and the high cost of laboratories. In this sense, serum lactate and glycaemia levels were determined as biomarkers of stress in white-faced primates (*Cebus albifrons*) found in the Paso home of the Juan de Castellanos University - Corpoboyacá, in the municipality of Soracá, Boyacá. Samples were taken from four primates with sampling and resampling per month, obtaining eight samples. For the handling of the animals, physical and chemical restraint was carried out, in which Ketamine was used at a dose of 6 mg / kg and Xylazine at a dose of 0.6 mg / kg of weight. 3ml of blood was taken from the femoral vein and immediately the serum lactate was measured with the Accutrend Plus® equipment and the glycaemia with an Accu-Chek Active® digital glucometer. Finally, the ethological follow-up was done with an ethogram per animal, from which a behavioral catalog was obtained to determine the frequency of presentation of each behavior, then grouped into cooperative behaviors (group and subsidiary behaviors) and competitive behaviors (aggressive behaviors). . The serum lactate obtained was 5.7 ± 2.8 mmol / l and glycaemia of 129.29 ± 16.93 g / dl, there was no evidence of difference between the two samples ($P > 0.05$). 106 behaviors were reviewed, finding greater frequency in cooperative behaviors over competitive ones ($P < 0.05$). A positive correlation was found between serum lactate and glycaemia ($r = 0.669$) and between agonistic behavior and glycaemia ($r = 0.615$). The above shows that the glycaemia seems to vary before competitive behaviors and agonizing behaviors, being able to be an acute biomarker in the face of behavioral changes. The serum lactate does not seem to correlate with the behaviors, being able to be an effective biomarker for

monitoring critical patients as it is in humans and in other animal species.

Keywords: Behavior, biological marker, captivity, primate, welfare.

Bienestar de 4 monos *Cebus spp* en cautiverio en el hogar de paso Francisco de Asís de la FUJDC

Álvaro Ernesto Mendivelso Gómez¹, Ángela Cristina Ariza Súarez², Viviana Gómez- Carrillo³

¹Estudiante X semestre M.V. Grupo IRABI, Fundación Universitaria Juan de Castellanos, amendivelso@jdc.edu.co. ²MV, PhD. Grupo IRABI, Docente Fundación Universitaria Juan de Castellanos, ariza@jdc.edu.co. ³MV, MSc., Grupo IRABI, Docente Fundación Universitaria Juan de Castellanos, rgomez@jdc.edu.co

Resumen

El mantenimiento de animales silvestres en cautiverio afronta varios desafíos dentro de los cuales está el cuestionamiento ético relacionado al bienestar animal. Esto debido a que la vida silvestre bajo estas condiciones puede afectarlo, al limitar la expresión de ciertas conductas. La comparación de comportamientos naturales de la especie con aquellos expresados por animales en cautiverio puede permitir evaluar la normalidad y funcionalidad del actuar de la especie con relación su bienestar. Por lo anterior el objetivo del presente estudio radica en la observación y evaluación positiva o negativa de los cinco dominios (alimentación, entorno, salud física, dominio mental y conducta) en los primates de genero *Cebus* en condiciones de cautiverio en el hogar de paso de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos en convenio con la Corporación Autónoma de Boyacá (CORPOBOYACÁ). Inicialmente, cada conducta expresada será evaluada y codificada mediante una etograma como evaluación complementaria de los 5 dominios, cada uno de ellos será valorado de acuerdo a un formato elaborado para este fin. Los datos serán analizados de forma porcentual para determinar las frecuencias de presentación de las conductas. La relación entre las conductas evaluadas y el bienestar animal, se organizó en una tabla de contingencia a la que se le aplicó Odds Ratio y se obtuvo los intervalos de confianza al 95%. Para revisar la correlación de las conductas medidas en el etograma, se usó la Correlación de Spearman, previamente usando una prueba de normalidad Anderson Darling, donde se obtuvieron no paramétricos los datos de

conductas. Estos análisis se realizaron en el programa R 3.0.1. Como resultados se evidenció que al evaluar los 5 dominios, en su mayoría (77%), hubo un predominio de las experiencias positivas y se observaron conductas propias de la especie como forrajeo y vocalizaciones; sin embargo aunque en menor proporción se evidenciaron estados negativos relacionados a movimientos circulares estacionarios. Lo anterior demuestra que las condiciones actuales del hogar de paso brindan un ambiente de bienestar óptimo para la especie, pero sería necesario diversificar los enriquecimientos y evaluarlos mediante etogramas con cierta periodicidad y ampliar el tamaño de los encierros.

Palabras clave: Estereotipias, cautiverio, conducta, cinco dominios, primates, *Cebus*, estrés.

**Welfare of monkeys *Cebus* spp in captivity at the home of way for wildlife Francisco de Asis of the FUJDC****Abstract**

The care of wild animals in captivity faces several challenges, among which is the ethical questioning related to animal welfare. This is because wildlife under these conditions can affect it, by limiting the expression of certain behaviors. The comparison of natural behaviors of the species with those expressed by animals in captivity can allow to evaluate the normality and functionality of the act of the species in relation to their welfare. Therefore, the objective of this study lies in the observation and positive or negative evaluation of the five domains (diet, environment, physical health, mental domain and behavior) in the primates of the *Cebus* genus in captivity conditions in the home of passage of the Juan de Castellanos University in agreement with the Autonomous Corporation of Boyacá (CORPOBOYACÁ). Initially, each behavior expressed will be evaluated and codified by means of an etogram as a complementary evaluation of the 5 domains, each of them will be evaluated according to a format developed for this purpose. The data will be analyzed in a percentage to determine the frequency of presentation of behaviors. The relationship between the evaluated behaviors and animal welfare was organized in a contingency table to which Odds Ratio was applied and the 95% confidence intervals were obtained. To revise the correlation of the behaviors measured in the ethogram, the Spearman Correlation was used, previously using a Anderson Darling normality test, where non-parametric behavior data were obtained. These analyzes were performed in the R 3.0.1 program. As results it was evidenced that when evaluating the 5 domains, mostly (77%), there was a predominance of positive experiences and behaviors characteristic of the species were observed as foraging and vocalizations; However, although in a smaller proportion, negative states related to stationary circular movements were evident. The foregoing demonstrates that the current conditions of the home of passage provide an optimum welfare environment for the species, but it would be necessary to diversify the

enrichments and evaluate them by means of etograms with certain periodicity and expand the size of the enclosures.

Keywords: Stereotypies, captivity, behavior, five domains, primates, *Cebus*, stress.

Influencia de dos sistemas de producción de gallinas ponedoras sobre libertad de dolor, lesión, enfermedad

Yazmin Andrea Calvo Rodríguez¹, Mvz. Esp; Claudia Liliana Santos León², Mvz. Esp; Ana Leonor Silvera³ Mvz; Ricci Terraza Martínez⁴, Bacteriólogo; Darwin Antonio García Rojas⁵, Mvz. Esp; Jorge Humberto Contreras Castro⁶, Biólogo Msc; Jorge Eliecer Franco Rodríguez⁷, Mvz. Esp.

Docente Escuela de M.V.Z, Instituto Universitario De La Paz, Barrancabermeja-Santander.
yazmin.calvo@unipaz.edu.co, MV, Esp, ²Docente Escuela de M.V.Z, Instituto Universitario De La Paz, Barrancabermeja-Santander. claudia.santos@unipaz.edu.co, MV, Esp, ³M.V.Z. anysilver@gmail.com, Docente Escuela de M.V.Z, Instituto Universitario De La Paz, Barrancabermeja-Santander. ricci.terraza@unipaz.edu.co, Bacteriólogo, ⁵Docente Escuela de M.V.Z, Instituto Universitario De La Paz, Barrancabermeja-Santander. darwin.garcia@unipaz.edu.co, MV, Esp, ⁶Docente Escuela de M.V.Z, Instituto Universitario De La Paz, Barrancabermeja-Santander. jorge.contreras@unipaz.edu.co, MV, Msc, ⁷Docente Escuela de M.V.Z, Instituto Universitario De La Paz, Barrancabermeja-Santander. dir.mvz@unipaz.edu.co, MV, Esp.

Resumen

El bienestar animal es un factor importante en la actividad pecuaria, la implementación de este debe generar un aumento en la producción y confort en los animales disminuyendo la frecuencia de lesiones, enfermedades o signos de dolor. El objetivo del estudio es evaluar el bienestar animal en la libertad de dolor lesión, enfermedad, en dos sistemas (piso y pastoreo). Se seleccionarán al azar 240 gallinas de la línea criolla del género *Gallus domesticus* por subespecie *morus*, *Gallus domesticus* por subespecie *ecaudatus*, divididos en 2 tratamientos de 120 animales cada uno, a su vez se dividirán en tres replicas de 40 gallinas cada una. Para comparar los resultados de la evaluación de las variables se realizará estadística inferencial (ANAVA), estadística descriptiva la cual busca establecer la relación entre la libertad de dolor, lesión, enfermedad, con un nivel de significancia del 95%, se utilizará el programa SPSS 21.0 para el análisis estadístico de los datos. Los animales estarán en un periodo de tiempo de 60 días; el

grupo 1 estará en un sistema de producción de pastoreo durante 4 horas diarias, distribuidos en tres potreros adaptados para este sistema cuya área será de 13,33 m² con una densidad de 3 gallinas/m², se alimentaran con predominio de grama natural, leguminosas y arvenses; el grupo 2 estará confinado en un sistema de producción de piso, con tres corrales de 6,6 m² y una densidad de 6 gallinas/m², se alimentaran a base de concentrado a ración de acuerdo a la tabla de alimento según peso por animal y agua a voluntad. Las variables de libertad de dolor lesión y/o enfermedad se medirán así: la evaluación de los indicadores como lesiones en patas y heridas por canibalismo se medirán mediante la observación diaria del 10% de animales de cada replica; para el indicador de condición de plumaje se medirá mediante la observación semanal y la mortalidad la medición será diaria; llevando el registro por replica, el cual se evaluará semanalmente sacando el porcentaje de mortalidad. Se espera encontrar como resultado la disminución de manifestación de lesión, dolor, enfermedad en los animales sometidos a pastoreo.

Palabras clave: Bienestar animal, *Gallus gallus*, libertad, piso, pastoreo

**Influence of two systems of production of
painterly hens on freedom of pain, injury,
disease****Abstract**

Animal welfare is an important factor in livestock activity, the implementation of this should generate an increase in production and comfort in animals decreasing the frequency of injuries, diseases or signs of pain. The objective of the study is to evaluate animal welfare in the freedom of pain, injury, disease, in two systems (floor and grazing). 240 chickens from the Creole line of the genus *Gallus domesticus* will be selected at random by subspecies *morus*, *Gallus domesticus* by subspecies *ecaudatus*, divided into 2 treatments of 120 animals each, in turn will be divided into three replicates of 40 chickens each. To compare the results of the evaluation of the variables inferential statistics (ANAVA), descriptive statistics which seeks to establish the relationship between freedom of pain, freedom of injury, freedom of disease, with a level of significance of 95%, the SPSS program will be used. 21.0 For the statistical analysis of the data. The animals will be in a period of 60 days; group 1 will be in a system of grazing production for 4 hours a day, distributed in three pastures adapted for this system whose area will be 13.33 m² with a density of 3 hens / m², will be fed with predominance of natural grass, legumes and weeds; group 2 will be confined in a floor production system, with three pens of 6.6 m² and a density of 6 hens / m², they will be fed with concentrate by ration according to the food table according to weight per animal and water at will. The variables of freedom of pain, injury and / or disease will be measured as follows: the evaluation of the indicators such as leg injuries and cannibalism injuries will be measured by daily observation of 10% of animals of each replica; for plumage condition indicator will be measured by weekly observation and mortality the measurement will be daily; taking the record by replica, which will be evaluated weekly taking the percentage of mortality. It is expected to find as a result the decrease of manifestation of injury, pain, disease in animals forced to grazing.

Keywords: Animal welfare, *Gallus gallus*, freedom, floor, grazing.